Kẽm và i-ốt trong chế độ ăn chay

Kẽm

Nhu cầu

Nam trưởng thành cần khoảng 11 mg kẽm mỗi ngày, nữ khoảng 8 mg; phụ nữ mang thai khoảng 11 mg và cho con bú khoảng 12 mg. Kẽm thực vật hấp thu kém hơn do phytate, nên người ăn chay có thể cần nhiều hơn mức này.

Nguồn kẽm

Đậu các loại, đậu phụ, tempeh, hạt bí, hạt mè, hạt điều, yến mạch, ngũ cốc nguyên hạt và sữa chua. Người ăn lacto/ovo còn nhận kẽm từ sữa và trứng.

Tăng hấp thu

Ngâm, ủ mầm, lên men đậu và ngũ cốc để giảm phytate.

Dấu hiệu thiếu

Vết thương lâu lành, rụng tóc, giảm vị giác, hay nhiễm trùng. Cần xét nghiệm trước khi bổ sung, vì thừa kẽm gây rối loạn hấp thu đồng.

I-ốt

Nhu cầu

Người trưởng thành cần khoảng 150 µg i-ốt mỗi ngày, phụ nữ mang thai khoảng 220 µg và cho con bú khoảng 290 µg.

Nguồn i-ốt

Muối ăn có bổ sung i-ốt là nguồn quan trọng. Người thuần chay không ăn sữa, trứng, hải sản có nguy cơ thiếu i-ốt cao hơn, nhất là khi dùng muối biển hay muối hồng không bổ sung i-ốt. Rong biển chứa i-ốt nhưng hàm lượng thay đổi rất lớn giữa các loại (kombu rất cao), nên không dùng thường xuyên với lượng lớn.

Lưu ý

Một nửa thìa cà phê muối có i-ốt mỗi ngày có thể đóng góp một phần đáng kể nhu cầu, nhưng cần cân nhắc giới hạn natri. Người có bệnh tuyến giáp cần hỏi bác sĩ về lượng i-ốt.

Nguồn tham chiếu

• NIH Office of Dietary Supplements. Zinc Fact Sheet for Health Professionals

• NIH Office of Dietary Supplements. Iodine Fact Sheet for Health Professionals

Khuyến nghị mang tính chất tham khảo dinh dưỡng, vui lòng tham vấn ý kiến bác sĩ chuyên khoa đối với các bệnh lý nền.