Giảm cân và tăng cân lành mạnh với chế độ ăn chay

Nguyên tắc năng lượng

Cân nặng thay đổi khi năng lượng nạp vào khác với năng lượng tiêu hao. VeggieLife ước tính BMR bằng công thức Mifflin-St Jeor, nhân hệ số 1,2 để ra TDEE, rồi đặt mục tiêu: giảm cân bằng TDEE trừ 400 kcal, giữ cân bằng TDEE, tăng cơ bằng TDEE cộng 400 kcal. Mức sàn năng lượng là 1.200 kcal với nữ và 1.500 kcal với nam. Đây là ước lượng, không thay thế đánh giá của bác sĩ.

Giảm cân

1. Chọn thực phẩm nguyên bản, giàu xơ: rau, đậu, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây.
2. Mỗi bữa có nguồn đạm (đậu phụ, đậu, tempeh) để no lâu.
3. Hạn chế đồ uống có đường, đồ chiên rán, bánh kẹo, vì "chay" không có nghĩa là ít calo.
4. Tốc độ giảm hợp lý khoảng 0,25–0,5 kg mỗi tuần; giảm quá nhanh làm mất cơ và dễ tăng lại.
5. Kết hợp vận động đều đặn.

Tăng cân và tăng cơ

1. Thêm năng lượng dần từ thực phẩm đậm đặc: bơ hạt, hạt, bơ, dầu ô liu, chuối, trái cây sấy.
2. Ăn đủ đạm, kết hợp tập kháng lực để phần tăng là cơ.
3. Chia 4–6 bữa trong ngày nếu ăn không nhiều mỗi lần.
4. Uống sinh tố hoặc sữa đậu nành tăng cường để bổ sung calo dễ hơn.

Cảnh báo

• Không dùng chế độ quá hạn chế hoặc nhịn ăn kéo dài khi chưa có tư vấn.

• Phụ nữ mang thai, trẻ em, thanh thiếu niên và người có rối loạn ăn uống không tự áp dụng giảm cân.

• BMI chỉ là chỉ số tham khảo (theo chuẩn WHO châu Á, người Việt có thể có nguy cơ ở mức BMI thấp hơn chuẩn quốc tế).

Khi nào cần đi khám

Sụt cân không chủ ý, tăng cân nhanh bất thường, mệt kéo dài, hoặc nghi ngờ bệnh tuyến giáp, tiểu đường.

Nguồn tham chiếu

• WHO. Healthy diet, Fact sheet (2020)

• Academy of Nutrition and Dietetics. Position of the Academy: Vegetarian Diets (J Acad Nutr Diet 2016;116:1970-80)

• Mifflin MD, et al. A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals (Am J Clin Nutr 1990;51:241-7)

Khuyến nghị mang tính chất tham khảo dinh dưỡng, vui lòng tham vấn ý kiến bác sĩ chuyên khoa đối với các bệnh lý nền.