Thay thế thịt, trứng, sữa trong nấu ăn chay

Thay thế thịt

• Đậu phụ chiên, đậu phụ khô, tàu hũ ky: làm món kho, xào, chiên giòn.

• Tempeh: giàu đạm, vị bùi, dùng nướng hoặc xào.

• Nấm (hương, kim châm, bào ngư, đùi gà): tạo vị umami và độ dai.

• Mít non, chuối xanh, thân cây chuối: dùng thay thịt trong món kho, nấu cà ri.

• Seitan và đạm đậu nành khô (textured soy protein): kết cấu giống thịt. Seitan không dùng cho người dị ứng gluten.

• Đậu lăng, đậu gà: làm chả, nem, viên.

Tăng vị đậm đà bằng nước tương, nấm khô, rong biển, miso, dầu mè, gia vị nướng; món chay thường cần nêm kỹ hơn.

Thay thế trứng

• Trứng hạt lanh: 1 muỗng canh hạt lanh xay trộn 3 muỗng canh nước, để vài phút, thay một quả trứng trong bánh.

• Nước đậu gà (aquafaba): khoảng 3 muỗng canh thay một quả trứng, đánh bông được.

• Chuối chín nghiền hoặc sốt táo: tạo độ ẩm trong bánh.

• Đậu phụ non nghiền: làm trứng bác chay (thêm nghệ để có màu vàng).

Thay thế sữa và sản phẩm sữa

• Sữa đậu nành, yến mạch, hạnh nhân, gạo. Với người thuần chay, chọn loại tăng cường canxi, vitamin D và B12.

• Sữa dừa: béo, dùng nấu cà ri, chè.

• Bơ thực vật, dầu ô liu hoặc dầu dừa thay bơ.

• Hạt điều xay thay kem hoặc phô mai mềm.

Món Việt dễ chuyển thành chay

Phở, bún riêu, bún mọc, bánh xèo, gỏi cuốn, cơm tấm, hủ tiếu, canh chua đều làm được với đậu phụ, nấm, rau củ và nước dùng nấu từ rau củ.

Lưu ý dinh dưỡng

Chế phẩm "thịt chay" chế biến sẵn có thể chứa nhiều natri, chất béo bão hòa và phụ gia; nên dùng vừa phải và đọc nhãn. Ưu tiên thực phẩm nguyên bản như đậu, nấm và rau củ.

Nguồn tham chiếu

• Academy of Nutrition and Dietetics. Position of the Academy: Vegetarian Diets (J Acad Nutr Diet 2016;116:1970-80)

• Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam (2017)

Khuyến nghị mang tính chất tham khảo dinh dưỡng, vui lòng tham vấn ý kiến bác sĩ chuyên khoa đối với các bệnh lý nền.