Dị ứng thực phẩm thường gặp trong chế độ ăn chay

Nhiều thực phẩm chay giàu đạm cũng là nguồn gây dị ứng thường gặp. Người dị ứng cần thay thế phù hợp để vẫn đủ dinh dưỡng.

Đậu nành

Gặp trong đậu phụ, sữa đậu nành, tempeh, miso, nước tương, đạm đậu nành khô, và nhiều thực phẩm chế biến (lecithin đậu nành). Thay thế: đậu lăng, đậu gà, đậu Hà Lan, sữa yến mạch hoặc sữa gạo tăng cường, hạt bí.

Gluten (lúa mì)

Có trong bánh mì, mì, seitan, nhiều loại nước tương, nước sốt. Người bệnh celiac phải tránh hoàn toàn gluten. Thay thế: gạo, ngô, quinoa, kê, khoai, yến mạch được chứng nhận không gluten.

Đậu phộng

Gặp trong bơ đậu phộng, dầu đậu phộng chưa tinh luyện, nhiều món xào, nước chấm, kẹo, bánh. Phản ứng có thể nặng. Cần tránh nhiễm chéo; đọc nhãn "có thể chứa vết đậu phộng".

Quả hạch

Hạnh nhân, óc chó, hạt điều, hạt phỉ, hồ đào, hồ trăn. Người dị ứng một loại hạch có thể phản ứng với loại khác. Hạt mè, hạt bí, hạt hướng dương là các lựa chọn khác, nhưng cần xác nhận với bác sĩ dị ứng.

Mè

Mè là một dị ứng ngày càng được ghi nhận. Có trong dầu mè, tahini, gia vị.

Sữa và trứng (người ăn lacto/ovo)

Cần tránh cả thành phần ẩn như casein, whey, albumin.

Thay thế an toàn

Sau khi loại bỏ một nhóm thực phẩm, hãy chắc chắn vẫn đủ đạm, canxi, sắt, B12. Cân nhắc trao đổi với chuyên gia dinh dưỡng.

Dấu hiệu dị ứng cần xử trí khẩn cấp

Nổi mề đay lan rộng, sưng môi hoặc mặt, khó thở, thở khò khè, đau bụng dữ dội, nôn, choáng. Gọi cấp cứu ngay. Không tự thử lại thực phẩm nghi ngờ khi chưa có tư vấn.

Chẩn đoán

Dị ứng cần được xác nhận bằng bác sĩ chuyên khoa dị ứng (thử nghiệm da, xét nghiệm IgE, thử thách thực phẩm có giám sát). Không tự loại bỏ nhiều nhóm thực phẩm kéo dài chỉ dựa trên nghi ngờ.

Nguồn tham chiếu

• Codex Alimentarius. General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods (CXS 1-1985): danh mục thực phẩm gây dị ứng

• VeggieLife. Business Rules BR-SCI-04

Khuyến nghị mang tính chất tham khảo dinh dưỡng, vui lòng tham vấn ý kiến bác sĩ chuyên khoa đối với các bệnh lý nền.