Sắt từ thực phẩm chay và cách tăng hấp thu

Nhu cầu

Theo IOM/NIH, nam giới trưởng thành cần khoảng 8 mg sắt mỗi ngày, phụ nữ 19–50 tuổi khoảng 18 mg, phụ nữ mang thai khoảng 27 mg. Vì sắt thực vật (sắt không heme) hấp thu kém hơn sắt heme từ thịt, IOM ước tính người ăn chay cần nhiều hơn khoảng 1,8 lần so với mức khuyến nghị thông thường.

Nguồn sắt thực vật

• Đậu lăng, đậu gà, đậu nành, đậu phụ, tempeh.

• Rau lá xanh đậm (cải bó xôi, cải xoăn), hạt bí, mè, hạt điều.

• Ngũ cốc tăng cường sắt, yến mạch, quinoa.

• Mận sấy, nho khô, mật mía đen.

Tăng hấp thu sắt

1. Ăn kèm thực phẩm giàu vitamin C (cam, ổi, ớt chuông, cà chua, chanh) trong cùng bữa.

2. Ngâm đậu, ngũ cốc và hạt trước khi nấu, hoặc dùng thực phẩm lên men để giảm phytate.

3. Nấu bằng nồi gang có thể tăng nhẹ lượng sắt trong món ăn, nhất là món chua.

Hạn chế hấp thu

Trà, cà phê và canxi liều cao ức chế hấp thu sắt. Nên uống trà hoặc cà phê cách bữa ăn ít nhất một giờ, và không uống viên canxi cùng lúc với bữa giàu sắt.

Dấu hiệu thiếu sắt

Mệt mỏi, chóng mặt, da xanh, móng giòn, khó tập trung, hụt hơi khi vận động. Cần xét nghiệm (ferritin, huyết sắc tố) để xác nhận.

Bổ sung sắt

Không tự uống viên sắt khi chưa có chỉ định, vì thừa sắt có thể gây hại và gây táo bón, buồn nôn. Phụ nữ mang thai, trẻ em và người có kinh nguyệt ra nhiều nên được bác sĩ theo dõi.

Nguồn tham chiếu

• NIH Office of Dietary Supplements. Iron Fact Sheet for Health Professionals

• Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc (2001)

Khuyến nghị mang tính chất tham khảo dinh dưỡng, vui lòng tham vấn ý kiến bác sĩ chuyên khoa đối với các bệnh lý nền.