

Macroeconomía Internacional Cuantitativa

Francisco Roldán*

September 2026
a entregar no después del 16 de octubre

1. Modelos de búsqueda

En clase vimos el modelo de búsqueda de McCall construido alrededor del siguiente problema

$$v(w) = \max \left\{ \frac{u(w)}{1 - \beta}, u(b) + \beta \int v(z) dF(z) \right\}$$

para dados β , b , u , y una distribución F para los salarios.

1.1 Estáticas comparadas

Para investigar el efecto de cada parámetro, vamos a graficar una serie de estáticas comparadas en las que vamos a cambiar el valor de β y b . **El objetivo es producir dos gráficos que muestren el salario de reserva w^* como función de β y b .**

Método recomendado

1. Elegir una cota inferior $\underline{b}$ y una cota superior $\bar{b}$ (por ejemplo, 0.5 y 1.5), y una cantidad de elementos N_b (por ejemplo, 25).
2. Crear un vector $\mathcal{B}$ con los valores para b usando la función `range`. Inicializar otro vector $\mathcal{V}$ para guardar los valores de w^* (con el mismo largo que $\mathcal{B}$!). Por ejemplo podés usar `similar` para eso.
3. Looppear sobre el vector $\mathcal{B}$ y, para cada valor $x \in \mathcal{B}$, inicializar un objeto `McCall` con `b = x`. Usar la función `vfi!` para resolver ese modelo. Finalmente, guardar el salario de reserva w^* en el elemento correspondiente de $\mathcal{V}$.

*email: froldan6@gmail.com

4. Usar la función `scatter` para crear un gráfico con $\mathcal{B}$ en el eje horizontal y $\mathcal{V}$ en el eje vertical. Finalmente, usar `plot` y `savefig` para dibujar y guardar el gráfico.¹
 - Podés usar `Layout` y `title` para darle un título al gráfico y `xaxis_title` para indicar que b se mueve en el eje horizontal.
5. Repetir el mismo proceso para la estática comparada de β .

Dos preguntas cortas ¿Cuál es el efecto de aumentar el consumo en desempleo? ¿Cuál es el efecto de hacer al agente más impaciente? ¿El efecto es siempre igual? Cuando por ejemplo b es muy grande o muy chico, tiene un efecto distinto que cuando es intermedio? Comente.

Recomendación Podés experimentar con la resolución del modelo de McCall (me refiero al argumento N_w del constructor, que controla cuántos puntos tiene la grilla de w) hasta encontrar un valor que te sirva. Si N_w es muy chico, w^* en función de b (o β) te va a quedar una escalera (por qué?) y, lógicamente, si N_w es muy grande el modelo puede tardar más en resolverse.

1.2 Simulaciones

En los códigos también hay una función `simul` que toma como argumento una instancia `mc` de tipo `McCall`, simula el modelo sacando ofertas de salario w con distribución F y devuelve la cantidad de ofertas hasta que una fue aceptada. Esta función tiene dos argumentos opcionales nombrados, `maxiter` y `verbose`. La opción `verbose: :Bool` permite controlar si el simulador escupe detalles a la terminal (esto es práctico si querés simular una vez pero no tanto si vas a hacer 10000 simulaciones), la opción `maxiter` controla el máximo de tiempo que va a simular si nunca se acepta un salario para evitar que el código corra para siempre, pero la idea es que no debería alcanzarse en la práctica.

El objetivo de esta sección es entender mejor la distribución del tiempo de parada T (cuántas ofertas voy a sacar antes de aceptar una). Para esto vamos a simular el mismo modelo una cantidad grande de veces y dibujar la distribución “empírica” de T en un histograma.

Método recomendado

1. Inicializar y resolver una instancia de `McCall`.

¹Esto necesita un poco de experimentación pero si hacés `p1 = plot(args)` después podés guardarlo haciendo `savefig(p1, "grafico.pdf")`. Un buen recurso para mirar la sintaxis de cómo hacer gráficos es <http://juliaplots.org/PlotlyJS.jl/stable/> que tiene una sección con un montón de ejemplos.

2. Elegir una cantidad K de repeticiones (por ejemplo, 10000)
3. Preasignar un vector $\mathcal{T}$ para guardar los K valores de T que vamos a obtener de la simulación
4. Loopear sobre $\mathcal{T}$ y, en cada iteración, usar la función `simul` con `verbose=false`. Guardar el T resultante como el elemento correspondiente de $\mathcal{T}$.
5. Usar la función `histogram` para crear un histograma con las frecuencias de los T s. Como antes, `plot` y `savefig` para guardar.
 - Las funciones `mean` y `quantile` permiten calcular la media y los cuantiles de un vector. Ojo que `quantile` toma dos argumentos, el vector y el cuantil deseado. Podés usar `?quantile` para ver cómo elegirlo.

Nota Es muy buena idea meter los puntos 2–4 en una función que tome como argumentos K y el modelo y devuelva el vector $\mathcal{T}$ para poder reusarla en los siguientes puntos.

1.3 *Cómo cambia $E[T]$ con la paciencia? – opcional*

Como antes, vamos a empezar por crear un vector $\mathcal{B}$ de valores para el factor de descuento β (entre, digamos, 0.9 y 0.99) y otro vector (vacío) $\mathcal{T}$ para guardar los valores de $E[T]$ como función de β . Para cada $x \in \mathcal{B}$, crear un objeto `McCall` con $\beta = x$, resolverlo usando `vfi!`, usar la función del punto anterior (la que devuelve el vector de todos los T en cada simulación) para calcular la media de T en 10000 simulaciones, y guardar el resultado en el lugar correspondiente del vector $\mathcal{T}$. Finalmente, usar `scatter` para mostrar $E[T]$ como función de β .

Nota Este ejercicio sólo se puede resolver si de verdad hacés que cada paso lógico sea una función, cosa de que puedas reutilizar las funciones que vas definiendo en este loop ($\mathcal{B}$) de loops (simulaciones) de loops (tiempo en cada simulación).