

Mathematik 2

Kapitel 1

Integralrechnung (Nachtrag)



Ulrich H. Becker

Frankfurt University of Applied Sciences

SS 2024

Wiederholung: Integralrechnung

- ▶ Beschreibe krummlinig Flächenberandung durch eine Funktion. Versuche, die Flächenmaßzahl einzugrenzen.
- ▶ Eine Folge von Flächen, die gegen die gesuchte Flächenmaßzahl von unten streben.
- ▶ Konstruiere eine Folge von Flächen, die gegen die gesuchte Flächenmaßzahl von oben streben.
- ▶ Wenn die beiden Folgen den gleichen Grenzwert annehmen, ist das die Flächenmaßzahl der krummlinigen Fläche.



Wiederholung: Integrationsregeln

► Es gilt:

▷ gleiche Integrationsgrenzen

$$\int_a^a f(x) dx = 0$$

▷ vertauschte Integrationsgrenzen

$$\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$$

▷ Summe d. Integrationsgrenzen

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$$

▷ Integral der Eins

$$\int_a^b 1 dx = b - a$$

Wiederholung: Integrationsregeln

► Es gilt:

- ▷ konstanter Faktor $c \in \mathbb{R}$ im Integranden

$$\int_a^b c f(x) dx = c \int_a^b f(x) dx$$

- ▷ Summe d. Integranden

$$\int_a^b f(x) + g(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

- ▷ Größenrelation der Integranden überträgt sich auf das Integral.

$$f(x) \leq g(x) \quad \Rightarrow \quad \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

Wiederholung: Hauptsatz der Infinitesimalrechnung

- Ist eine Funktion f stetig im Intervall $[a,b]$, so ist jede Integralfunktion

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

in $[a,b]$ differenzierbar und es gilt für alle $x \in [a,b]$

$$F'(x) = f(x)$$

- M.a.W.:

$$\left(\int_a^x f(t) dt \right)' = f(x)$$

- In diesem Sinne ist die Integration die Umkehrung der Differentiation.

Wiederholung: Substitutionsregel und Differentiale

- ▶ Betrachte die Substitution $x = \varphi(z)$
- ▶ Dann ist $dx = \varphi'(z) dz$
- ▶ Mit $f(x)$ multiplizieren: $f(x) dx = f(\varphi(z)) \varphi'(z) dz$
- ▶ Und integrieren

$$\int f(x) dx = \int \underbrace{f(\varphi(z))}_{f(x)} \underbrace{\varphi'(z) dz}_{dx}$$

- ▶ Die Substitutionsregel ist letztlich die Motivation für das dx in der Integralnotation.

Wiederholung: Substitutionsregel und Integrationsgrenzen

- ▶ Integrationsgrenzen bei bestimmten Integralen
 - ▷ Entweder: Nachdem man im Ergebnis nach der Rücksubstitution wieder bei der ursprünglichen Variable ist, verwendet man die ursprünglichen Integrationsgrenzen.
 - ▷ Oder: Nach der eigentlichen Integration führt man die Rücksubstitution nicht aus. Dann muss man auch die Integrationsgrenzen substituieren und so verwenden.

Wiederholung: Spezialfälle

- ▶ ... bei denen man sich die formelle Anwendung der Substitutionsregel sparen kann.
- ▶ Eine reelle Funktion f sei auf $[a,b]$ stetig und $\int f(x)dx = F(x)+c$. Seien $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha \neq 0$. Dann ist für alle x mit $\alpha x + \beta \in [a,b]$

$$\int f(\alpha x + \beta) dx = \frac{1}{\alpha} F(\alpha x + \beta) + c$$

Wiederholung: Spezialfälle

- Eine reelle Funktion f sei auf $[a,b]$ stetig differenzierbar. Es sei $\alpha \in \mathbb{R}$ und f^α sei auf $[a,b]$ definiert.

Dann ist für $\alpha \neq -1$

$$\int f'(x) [f(x)]^\alpha dx = \frac{1}{\alpha+1} [f(x)]^{\alpha+1} + c$$

Und für $\alpha = -1$ gilt:

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + c$$

Wiederholung: Partielle Integration

- ▶ Wir wollen die Produktregel für Ableitung ausnutzen, um eine Integrationsmethode zu erhalten.
- ▶ Betrachte $[u(x) \cdot v(x)]' = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$
- ▶ Unbestimmte Integration liefert

$$\begin{aligned} u(x) \cdot v(x) &= \int [u(x) \cdot v(x)]' dx \\ &= \int u'(x) \cdot v(x) dx + \int u(x) \cdot v'(x) dx \end{aligned}$$

- ▶ Damit

$$\int u(x) \cdot v'(x) dx = u(x) \cdot v(x) - \int u'(x) \cdot v(x) dx$$

Wiederholung: Partielle Integration


- ▶ Beachte: Die Regel trägt es schon im Namen, dass man nur zum Teil integriert, und ein Rest noch zu integrieren bleibt.
- ▶ Ziel ist es natürlich, diesen Rest so zu bekommen, dass sich das verbleibende Integral leicht finden lässt.

Flächenberechnung

- ▶ Einer Fläche wird eine Maßzahl zugeordnet, mit folgenden Eigenschaften:
 - ◆ Jede Flächenmaßzahl ist nicht negativ: $A_F \geq 0$
 - ◆ Das Einheitsquadrat hat die Flächenmaßzahl 1.
 - ◆ Sind zwei Figuren F_1 und F_2 kongruent, so haben sie die gleiche Flächenmaßzahl: $A_{F_1} = A_{F_2}$
 - ◆ Ist eine Figur F in zwei Figuren F_1 und F_2 zerlegt, so gilt für die zugehörigen Flächenmaßzahlen:
$$A_F = A_{F_1} + A_{F_2}$$
- ▶ Idee: Man beschreibe die Umrandung von ebenen Flächen durch Funktionen. Integrieren liefert dann die Fläche ... wenn man ein Detail beachtet!

Flächenberechnung

- ▶ Wir wissen: $f(x) \leq 0 \Rightarrow \int f(x) dx \leq 0$.
 - ▷ Kann man also nicht direkt als Flächenmaßzahl verwenden.
- ▶ Um also die Fläche zw. einer Kurve und der x-Achse zu bestimmen, teilt man das Intervall auf der x-Achse in Abschnitte gleichen Vorzeichens von $f(x)$ ein.
- ▶ Die Beträge der Integrale über die einzelnen Abschnitte sind dann das gesuchte Flächenmaß.



Flächenberechnung


- Beschränkung auf x-Achse als Flächenrand zu einschränkend!
- Wie bestimmt man die Fläche zwischen zwei Kurven? So:

$$\int_a^b f_1(x) dx - \int_a^b f_2(x) dx = \int_a^b f_1(x) - f_2(x) dx$$

mit $f_1(x) \geq f_2(x)$ für $a \leq x \leq b$

- Dies ersetzt $f(x) \geq 0$.

- Beispiel $f_1(x) = \frac{x}{2} + 4$
 $f_2(x) = \frac{1}{2}x^2 + 1$




Volumenberechnung

- ▶ Für einen Quader mit Kantenlängen a , b und c :
 $V = a*b*c$
- ▶ Für einen Quader sind die Kanten konstante Funktionen. Die Faktoren in $a*b*c$ sind das Ergebnis einer Integration der jeweils konstanten Funktion.
 - ▷ $f(x)=b$: $\int_0^a f(x) dx = a*b$ = Grundfläche
 - ▷ $g(z)=a*b$: $\int_0^c g(z) dz = a*b*c$ = Volumen
- ▶ Eine beliebige krummlinige Begrenzung erfordert die Integration in 3 Raumrichtungen.
 - ▷ ... können wir noch nicht.
- ▶ Aber für *spezielle* Körper kann man auch mit gewöhnlichen Integralen das Volumen berechnen.


Volumenberechnung Rotationskörper

- ▶ Rotationskörper sind rotationssymmetrisch bzgl. einer Achse.
 - ◆ Wir legen diese so, dass dies die x-Achse ist.
- ▶ Beispiele
 - ▷ Kugel
 - ▷ Kegel
 - ▷ Zylinder
 - ▷ Produkte von der Drehbank




Volumenberechnung Rotationskörper

- ▶ Variables Profil senkrecht zur Rotationsachse.
- ▶ Kann mit dem Folgenden nicht direkt behandelt werden!



Volumenberechnung Rotationskörper

- ▶ Überdecke Volumen mit Kreisscheiben konstanter Höhe h_k , $k=1,\dots,n$
- ▶ Radius der Kreisscheiben ist $f(x_k)$.
- ▶ Volumen der Kreisscheiben ist $\pi f(x_k)^2 * h_k$.
- ▶ Man kann wieder Ober- und Untersummen konstruieren. Gemeinsamer Grenzwert ist das Integral.
- ▶ Volumen eines Rotationskörpers:



$$V = \pi \int_a^b f(x)^2 dx$$

Volumenberechnung Rotationskörper

- ▶ Beispiele
 - ▷ Kugelabschnitt
 - ▷ Hohlkörper

Bogenlänge

- ▶ Betrachte Funktionsgraph über einem Intervall $[a,b]$.
- ▶ Approximation durch Sekanten für eine Zerlegung Z_n von $[a,b]$.

- ▶ Länge einer Sekante folgt aus


$$\begin{aligned}\Delta s_k^2 &= (x_{k+1} - x_k)^2 + (f(x_{k+1}) - f(x_k))^2 \\ &= \Delta x_k^2 + \Delta f_k^2 \\ &= (1 + (\Delta f_k / \Delta x_k)^2) \Delta x_k^2\end{aligned}$$

- ▶ Länge des Sekantenzuges:

$$L_n = \sum \Delta s_k = \sum \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta f_k}{\Delta x_k} \right)^2} \Delta x_k$$

- ▶ Länge der Kurve ist Limes $n \rightarrow \infty$, $\Delta x_k \rightarrow 0$:

$$L = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} L_n = \int_a^b \sqrt{1 + f'^2} dx$$



Numerische Integration

- ▶ Prinzipiell gilt es, Aufwand gegen Genauigkeit abzuwägen.
- ▶ „Einfache“ Integranden kann man gut mit einfachen Verfahren integrieren.
- ▶ Integranden mit Polstellen oder uneigentliche Integrale erfordern i.d.R. spezielle Methoden.
 - ▷ Numerikvorlesung
- ▶ Lange Tradition = viel Literatur
- ▶ Stichwort: Quadraturformeln

Numerische Integration: Trapezformel


- Ansatz: Approximiere Kurve durch Sekanten.

- Integral im Intervall $[x_{k-1}, x_k]$:

$$A_k = \frac{1}{2} (f(x_k) + f(x_{k-1})) * (x_k - x_{k-1})$$

- Typischerweise für alle $k=1, \dots, n$

$$h = x_k - x_{k-1} = \frac{b-a}{n}$$



- Summe:

$$A_n = h \left(\frac{f(a)}{2} + \frac{f(b)}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) \right)$$

- Fehler:

$$\Delta A_n = (b-a) \frac{h^2}{12} \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|$$

Numerische Integration: Simpson Formel

► Ansatz: Approximiere Kurve durch Parabeln.

► Teile Interval $[a,b]$ in **2n** Intervalle: $h = (b-a)/2n$

► Integral im Intervall zu x_{2k} :

$$\begin{aligned} A_k &= \frac{(x_{2k} - x_{2k-2})}{6} (f(x_{2k-2}) + 4f(x_{2k-1}) + f(x_{2k})) \\ &= \frac{(b-a)}{6n} (f(x_{2k-2}) + 4f(x_{2k-1}) + f(x_{2k})) \end{aligned}$$

► Summe:

$$A_n = \frac{h}{3} \left(f(a) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_{2k}) + 4 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_{2k-1}) + f(b) \right)$$

► Fehler:

$$\Delta A_n = \frac{b-a}{180} h^4 \max_{a \leq x \leq b} |f^{(4)}(x)|$$

