



CLÍNICA
DA FACE

CONSULTA PÓS-OPERATÓRIA 08/07/2013

NOTA DE ALTA

DATA 06 - 07 - 2013

DOENTE ANA ISABEL MOURA GONÇALVES

HOSPITAL BRITISH HOSPITAL LISBON

DATA DA CIRURGIA 5 JULHO 2013

DATA INTERNAMENTO 05/07/2013

DIAGNÓSTICO

Doente de 32 anos que apresentava uma deformidade dentofacial caracterizada por:

- Discrepância esquelética sagital devida a excesso de crescimento sagital da mandíbula e retrusão do maxilar superior, o que condicionava a existência de uma classe III esquelética com perfil côncavo e impossibilidade de mastigar correctamente por falta de contacto dentário adequado.
- Discrepância esquelética transversal maxilo-mandibular por défice maxilar
- Assimetria do mento.

CIRURGIA

Sob anestesia geral, procedemos a:

- osteotomia de LeFort I. Septoplastia simultânea por desvio e remoção de mucocelos dos seios maxilares.
 - reposicionamento tridimensional do maxilar superior, com avanço. O maxilar foi fixado com placas e parafusos de titânio em distal dos laterais.
 - osteotomias sagitais dos ramos ascendentes da mandíbula com preservação do pedículo vascular-nervoso. Fixação rígida bilateral com uma placa de BSSO e 4 parafusos.
 - mentoplastia com osteotomias. Fixação com duas placas lateralizadas devido ao défice de altura central (para evitar conflito com as raízes).
 - Suturas com pontos reabsorvíveis.
- A intervenção decorreu sem complicações.

PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO

O período pós-operatório imediato decorreu sem complicações.

Foi colocado um sistema de arrefecimento facial com máscara (Hilotherm) nos pós-operatório.

Foi fornecido ao doente orientação pós-operatória terapêutica e alimentar.

A doente foi medicada com antibióticos, anti-inflamatórios não esteróides, analgésicos e frio local.

RESUMO

Doente adulta jovem que foi sujeita a cirurgia ortognática bimaxilar complementada com mentoplastia e septoplastia.

O maxilar superior foi segmentado em três partes para se poder corrigir os problemas verticais e transversais.

Intervenção cirúrgica de elevada dificuldade técnica.

Internamento de 24 horas.

Pós-operatório imediato sem complicações.

Vai iniciar tracção elástica interdentária no pós-operatório imediato e deverá mantê-la segundo as indicações ortodôntica.

A. Matos da Fonseca
(Médico - Cirurgião Maxilo-Facial)

Relatório ao abrigo do Artigo 70, alínea a) do Código Deontológico da Ordem dos Médicos.

Relatório assinado digitalmente. Esta é uma impressão do original que está disponível para consulta, nos termos da Lei.

Complexo Hospitalar das Torres de Lisboa
Telefone +351 21 721 09 00 - +351 93 721 09 00

Rua Tomás da Fonseca, Torre F, Piso 1 1600-209
<http://www.clinicadaface.com>

Lisboa – Portugal
clinica@clinicadaface.com