D. Atsa ratsas

Puntos	100	**Límite de memoria**	32 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	**Límite de tiempo (total)**	1m0s
Entrada/Salida	Consola	**Tamaño límite de entrada (bytes)**	10 KiB

Descripción

Como medida extra de seguridad durante esta pandemia, Atsa decidió mudarse a su cabaña en el bosque, donde hizo un descubrimiento muy interesante. Durante una de sus exploraciones encontró una nueva especie de insectos invernantes (es decir, que duermen durante largos periodos y resurgen cada determinado tiempo), a los cuales decidió llamar ratsas.

Tras su hallazgo, Atsa pasó semanas estudiando a estos magníficos seres y descubrió un par de hechos bastante interesantes que se enlistan a continuación:

1. Los ciclos de hibernación de las ratsas son regulares (siempre resurgen cada T unidades de tiempo)
2. Los depredadores de las ratsas tienen un ciclo de caza regular (siempre cazan cada x unidades de tiempo), pero aún se desconoce cuál es la duración de este ciclo.
3. Los depredadores tienen un promedio de vida de N unidades y sus descendientes continuarán con sus mismos patrones de caza (es decir, el ciclo permanecerá inmutable)
4. Si el día de resurgimiento de las ratsas coincide con el día de caza de los depredadores, estos se las comerán.
5. La duración del ciclo de hibernación de las ratsas siempre es menor o igual al promedio de vida de los depredadores.

Atsa tiene curiosidad por saber cuál es el ciclo de hibernación ideal para las ratsas, de tal manera que minimicen sus probabilidades de ser devorados por los depredadores, y ha solicitado tu ayuda para descubrirlo.

Se te dará como entrada un entero positivo N, que representa el tiempo promedio de vida de los depredadores. Tu tarea consistirá en calcular T, la duración ideal del ciclo de hibernación de las ratsas, de tal manera que minimices las posibilidades de que estas sean devoradas por los depredadores.

Notas

- Se desconoce cuál es la duración promedio del ciclo de caza de los depredadores, pero se asegura que estos cazan al menos una vez en su vida.
- Puedes asumir que tanto las ratsas como los depredadores nacieron/surgieron por primera vez el mismo día en este escenario.
- Los depredadores no se comerán a las ratsas el primer día del experimento porque aún son muy pequeños (pero ten mucho cuidado, porque este es el único día en el que no pueden hacerlo).

Entrada

La entrada consiste en un único entero positivo N, representando la cantidad promedio de vida de los depredadores.

Salida

La salida deberá consistir en una línea que contenga un único entero positivo T, que represente la duración ideal del ciclo de hibernación de las ratsas.

Ejemplo

Entrada	Salida
5	5
6	5

Límites

- $2 \leq T \leq N \leq 10^9$

Fuente: undefined

code cases

Main.cpp

```cpp
#include <iostream>

int main() {
  std::cin.tie(nullptr);
  std::ios_base::sync_with_stdio(false);

  // TODO: fixme.

  return 0;
}
```

compiler.out/err logs.txt files.zip

Envíos

Enviado	GUID	Estatus	Porcentaje	Lenguaje	Memoria	Tiempo	Accio
Nuevo envío							

INCREMENTANDO EL NÚMERO DE INGENIEROS DE SOFTWARE TALENTOSOS EN AMÉRICA LATINA.

Patrocinadores

amazon

Sitio

Concursos

Cursos

Problemas

Ranking

Blog

Organización

Acerca de omegaUp

Equipo

Desarrolladores

Ayúdanos

Reporta un problema

Contacto

hello@omegaup.com

GitHub | Facebook | Discord

Copyright © 2021 omegaUp, Inc. Todos los derechos reservados.

Código de Conducta

Políticas de privacidad