

COGNOME _____ NOME _____ MATRICOLA _____ LAUREA CIV AMB GEST INF ELN TLC MEC	NON SCRIVERE QUI <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;">1</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">2</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">3</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">4</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">5</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 20px auto;"></div>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5		

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
 ESAME DI ANALISI MATEMATICA 2 — SOLUZIONI
 A.A. 2021-2022 — PARMA, 18 LUGLIO 2022

Compilete l'intestazione in alto a sinistra e scrivete cognome e nome in stampatello anche su ogni altro foglio.
 Il tempo massimo per svolgere la prova è di due ore e mezza. Al momento della consegna, inserite tutti i fogli dentro a questo foglio.

Esercizio 1. Calcolate l'integrale curvilineo

$$I = \int_{\gamma} x \, dl(x, y, z)$$

ove $\gamma: [0, \sqrt{6/5}] \rightarrow \mathbb{R}^3$ è la curva parametrica definita da

$$\gamma(t) = te_1 + t^2e_2 + 3t^2e_3, \quad t \in [0, \sqrt{6/5}].$$

Soluzione. Poiché la curva γ è liscia e la funzione $f(x, y, z) = x$, $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ è continua, risulta

$$\begin{aligned}
 I &= \int_{\gamma} f \, dl = \int_0^{\sqrt{6/5}} f(t, t^2, 3t^2) \|\gamma'(t)\| \, dt = \\
 &= \int_0^{\sqrt{6/5}} t \sqrt{1 + 4t^2 + 36t^2} \, dt = \frac{1}{120} (1 + 40t^2)^{3/2} \Big|_0^{\sqrt{6/5}} = \frac{1}{120} (7^3 - 1) = \frac{342}{120} = \frac{171}{60}.
 \end{aligned}$$

Esercizio 2. Determinate tutte le soluzioni $x(t)$ dell'equazione differenziale

$$x''(t) - x(t) = 1$$

che verificano $x(0) = 0$ e $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = -1$.

Soluzione. Le soluzioni dell'equazione caratteristica sono i numeri reali $\lambda_{\pm} = \pm 1$ e una soluzione dell'equazione completa è evidentemente data dalla funzione costante

$$x_p(t) = -1, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Pertanto tutte le soluzioni dell'equazione completa sono le funzioni

$$x(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^t - 1, \quad t \in \mathbb{R},$$

con $C_i \in \mathbb{R}$ ($i = 1, 2$) costanti arbitrarie. Affinché il limite di $x(t)$ per $t \rightarrow +\infty$ sia finito deve essere $C_2 = 0$ e per avere $x(0) = 0$ deve poi essere $C - 1 = 1$. Pertanto, l'unica soluzione dell'equazione differenziale proposta che verifica le condizioni richieste è la funzione

$$x(t) = e^{-t} - 1, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Esercizio 3. Sia

$$f(x, y, z) = x^4 - 4x^2 + y^2 + 4z^2 - 8xz, \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3.$$

- (a) Determinate gli eventuali punti critici di f e stabilite la natura.
(b) Determinate l'immagine $f(\mathbb{R}^3)$.

Soluzione. (a) La funzione f è un polinomio e quindi è di classe $C^\infty(\mathbb{R}^3)$. Le derivate parziali di f sono date da

$$f_x(x, y, z) = 4x^3 - 8x - 8z; \quad f_y(x, y, z) = 2y; \quad f_z(x, y, z) = 8z - 8x;$$

per ogni (x, y, z) e quindi i punti critici sono le soluzioni del sistema formato dalle equazioni

$$\begin{cases} 4x^3 - 8x - 8z = 0 \\ 2y = 0 \\ 8z - 8x = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x^3 - 2x - 2z = 0 \\ y = 0 \\ z = x \end{cases} \iff \begin{cases} x(x^2 - 4) = 0 \\ y = 0 \\ z = x \end{cases}$$

cui corrispondono i punti di coordinate

$$P = (0, 0, 0); \quad Q_\pm = (\pm 2, 0, \pm 2).$$

La funzione f ha dunque tre punti critici. Poiché risulta $f(-x, y, -z) = f(x, y, z)$ per ogni (x, y, z) , i due punti Q_+ e Q_- hanno la stessa natura.

Per determinare la natura dei punti critici, calcoliamo la matrice hessiana di f che è

$$D^2f(x, y, z) = \begin{pmatrix} 12x^2 - 8 & 0 & -8 \\ 0 & 2 & 0 \\ -8 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

per ogni (x, y, z) . Posto

$$\Delta_m = \det \left((D^2f)_h^k \right)_{1 \leq h, k \leq m}, \quad m = 1, 2, 3,$$

per il criterio di Sylvester si ha

$$\begin{aligned} D^2f(P) &= \begin{pmatrix} -8 & 0 & -8 \\ 0 & 2 & 0 \\ -8 & 0 & 8 \end{pmatrix} & \Delta_1 = -8, \Delta_2 = -16 \text{ e } \Delta_3 = -256 & \implies \text{punto di sella;} \\ D^2f(Q_\pm) &= \begin{pmatrix} 40 & 0 & -8 \\ 0 & 2 & 0 \\ -8 & 0 & 8 \end{pmatrix} & \Delta_1 = 40, \Delta_2 = 80 \text{ e } \Delta_3 = 512 & \implies \text{punti di minimo.} \end{aligned}$$

- (b) Dalla disuguaglianza $ab \geq -(a^2 + b^2)/2$ con $a = 4x$ e $b = 2z$ segue

$$f(x, y, z) \geq x^4 - 12x^2 + y^2 + 2z^2 = (x^4 - 18x^2) + 6x^2 + y^2 + 2z^2$$

per ogni (x, y, z) . Poiché risulta

$$\min_{x \in \mathbb{R}} (x^4 - 18x^2) = (x^4 - 18x^2)|_{x^2=9} = -81,$$

si ha

$$f(x, y, z) \geq 6x^2 + y^2 + 2z^2 - 81 \geq x^2 + y^2 + z^2 - 81, \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3.$$

Risulta quindi $f(x, y, z) \rightarrow +\infty$ per $(x, y, z) \rightarrow \infty$ e dunque f ammette minimo globale per il teorema di Weierstrass generalizzato. Per (a) il minimo globale è assunto nei punti di coordinate Q_\pm da cui segue

$$f(\mathbb{R}^3) = [f(Q_\pm), +\infty) = [-16, +\infty)$$

per il teorema dei valori intermedi.


Esercizio 4. Sia

$$K = \left\{ (x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 4 \text{ e } \sqrt{x^2 + y^2} \leq \sqrt{3}z \leq 3 \right\}.$$

(a) Descrivete e disegnate l'insieme K .

(b) Calcolate $I = \int_K z d(x, y, z)$.

Soluzione. L'insieme K è la parte della palla di centro nell'origine e raggio $R = 2$ che sta al di sopra del cono di equazione $z = \sqrt{(x^2 + y^2)/3}$ e al di sotto del piano di equazione $z = \sqrt{3}$. L'insieme K è il solido di rotazione che si ottiene facendo ruotare attorno all'asse z la figura contenuta nel primo quadrante del piano rz (con $r = \sqrt{x^2 + y^2}$) compresa tra la circonferenza di equazione $r^2 + z^2 = 4$ e le rette di equazione $z = r/\sqrt{3}$ e $z = \sqrt{3}$ come illustrato nella figura seguente.



L'insieme K è compatto perché è limitato ed è intersezione di controimmagini di intervalli chiusi mediante funzioni continue e quindi è (Lebesgue) misurabile. La funzione f definita da

$$f(x, y, z) = z, \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3,$$

è lineare e quindi è integrabile in K .

Calcoliamo I mediante la formula di riduzione per strati. La proiezione di K sull'asse z è l'intervallo $\pi_z(K) = [0, 2]$ e per ogni z siffatto la corrispondente sezione è l'insieme

$$K^z = \begin{cases} \left\{ (x, y) : \sqrt{x^2 + y^2} \leq \sqrt{3}z \right\}, & \text{se } 0 \leq z \leq 1 \\ \left\{ (x, y) : \sqrt{x^2 + y^2} \leq \sqrt{4 - z^2} \right\}, & \text{se } 1 \leq z \leq \sqrt{3}. \end{cases}$$

Per la formula di riduzione si ha allora

$$\begin{aligned} I &= \int_K z d(x, y, z) = \int_0^1 \left(\int_{K^z} z d(x, y) \right) dz + \int_1^{\sqrt{3}} \left(\int_{K^z} z d(x, y) \right) dz = \\ &= \int_0^1 z |K^z| dz + \int_1^{\sqrt{3}} |K^z| dz = \\ &= \int_0^1 3\pi z^3 dz + \int_1^{\sqrt{3}} \pi z (4 - z^2) dz = \\ &= \frac{3}{4}\pi + \left[-\frac{\pi}{4} (4 - z^2)^2 \right]_1^{\sqrt{3}} = \frac{3}{4}\pi - \frac{\pi}{4} + \frac{9}{4}\pi = \frac{11}{4}\pi. \end{aligned}$$

Esercizio 5. Determinate la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = [x(t)]^4 + \frac{1}{[x(t)]^2} \\ x(0) = 1. \end{cases}$$

Soluzione. L'equazione differenziale proposta è un'equazione a variabili separabili. La funzione a secondo membro è $f(t, x) = g(t)h(x)$ con

$$g(t) = 1, \quad t \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad h(x) = x^4 + \frac{1}{x^2} = \frac{x^6 + 1}{x^2}, \quad x \neq 0$$

e, tenuto conto della condizione iniziale $x(0) = 1$, non è restrittivo considerare h definita nell'intervallo $(0, +\infty)$. In tale intervallo la funzione h è infinite volte derivabile e quindi il problema di Cauchy considerato ha soluzione massimale $x \in C^\infty(\alpha, \beta)$ con $-\infty \leq \alpha < 0 < \beta \leq +\infty$. Tale soluzione è prolungamento di ogni altra soluzione del medesimo problema di Cauchy.

Essendo $h(x)$ definita per $(x) > 0$, la soluzione massimale verifica $x(t) > 0$ per ogni $\alpha < t < \beta$. Ponendo

$$H(y) = \int_1^y \frac{z^2}{z^6 + 1} dz = \frac{1}{3} \int_1^{y^3} \frac{1}{u^2 + 1} du = \frac{1}{3} \arctan z \Big|_1^{y^3} = \frac{1}{3} \arctan y^3 - \frac{\pi}{12}$$

per ogni $y > 0$, si deduce che la funzione composta $H \circ x$ è in $C^\infty(\alpha, \beta)$ e verifica $(H \circ x)'(t) = 1$ per $\alpha < t < \beta$ e $H \circ x(0) = 0$. Dunque, per il teorema fondamentale del calcolo, deve essere $(H \circ x)(t) = t$ per $\alpha < t < \beta$ da cui segue con semplici calcoli

$$x(t) = \sqrt[3]{\tan\left(3t + \frac{\pi}{4}\right)}, \quad \alpha < t < \beta.$$

Poiché si ha

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} H(y) = -\frac{\pi}{12} \quad \text{e} \quad \lim_{y \rightarrow +\infty} H(y) = \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{12},$$

si conclude che risulta

$$\alpha = -\frac{\pi}{12} \quad \text{e} \quad \beta = \frac{\pi}{12}.$$

La soluzione massimale è dunque

$$x(t) = \sqrt[3]{\tan\left(3t + \frac{\pi}{4}\right)}, \quad |t| < \frac{\pi}{12}.$$
