

Matemática 4 - 2026

TP3 - Números

1. Demostrar las siguientes propiedades para a, b, c números enteros :
 - (a) $a(a + 1)$ es par
 - (b) $a|b$ entonces $a|bc$
 - (c) $a|b + c$ y $a|b$ entonces $a|c$
2. El resto de la división de un número por 7 es 2; si se lo divide por 3, su resto es 1. ¿Cuál es el resto si se lo divide por 21?
3. Sean a y b dos números enteros que tienen restos 4 y 7 respectivamente en la división por 11. Hallar los restos de la división por 11 de $(a + b^2)$
4. Convertir los siguientes números de base 10 a base 8:
 - (a) 98
 - (b) 44
 - (c) 20
5. Hallar, si existe, el menor número entero q tal que $7290q$ es el cubo de un entero.
6. Calcular el máximo común divisor entre:
 - (i) $(16, 24)$
 - (ii) $(70, 50)$
 - (iii) $(121, 88)$
 - (iv) $(-90, 90)$
 - (v) $(980, 224)$
7. Demostrar que para cualquier entero a vale que $(a, a + 1) = 1$
8. Probar que si a y b son enteros:
 - (a) si a es no nulo, $(a, 0) = |a|$
 - (b) $(a, b) = (a - b, b)$
 - (c) si además a y b son coprimos
 - $a + b$ es coprimo con a
 - $a + b$ y ab son coprimos
9. Dados a y b son enteros probar que si $(a, b) = 1$ entonces $(2a - 3b, 5a + 2b) = 1$ ó 19

10. Hallar $(2^n - 7^n, 2^n + 7^n)$, para cualquier n natural
11. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ y sea p primo. Demostrar que si $p|ab$ entonces $p|a$ ó $p|b$
Mostrar que ésto no se cumple si p no es primo.
12. Demostrar que dados a y b en $\mathbb{Q}$ tales que $a < b$, existe otro número racional x tal que $a < x < b$.
13. Hallar dos fracciones distintas que representen al mismo número racional.
14. Probar que no existe un número racional cuyo cubo sea igual a 2.
15. Probar que el cuadrado de un número racional es siempre un número racional.
16. Indique la parte real $\text{Re}(z)$ y la parte imaginaria $\text{Im}(z)$ de los siguientes complejos:
a) $\sqrt{-49}$ b) $\sqrt{-20}$ c) $\sqrt{-\frac{9}{16}}$ d) $z = -8$ h) $z = 7i$
f) $z = (3 + i) + (5 - 4i)$ g) $z = 3i - (5 - 2i)$ h) $\frac{1+3i}{3-i}$ i) $\frac{1-i}{(1+i)^2}$
17. La suma de un número complejo y su conjugado es -8 y la suma de sus módulos es 10. De qué números complejos se trata?
18. Encuentre x e y tales que:
a) $x - 15i = 9 + 5yi$; b) $2x + 3yi = 6 + yi$;
19. Hallar, si existe, x real tal que $\text{Re}(z) = \text{Im}(z)$ siendo $z = \frac{x+2i}{4-3i}$
20. Encontrar, si existe, un valor de k real para que el complejo $\frac{2-(1+k)i}{1-ki}$ sea un número real.
21. Calcular las siguientes potencias:
a) i^{489} b) $-i^{1026}$ c) $(3i)^{168}$
22. Dados los siguientes números complejos, encontrar la forma más adecuada para realizar las operaciones pedidas:
 $z_1 = 3 + 3i$ $z_2 = -1 + i$ $z_3 = 5 + 4i$ $z_4 = 9$ $z_5 = 5i$ $z_6 = -7$
 $z_7 = -4 - 4i$ $z_8 = -8i$ $z_9 = 2 - 2i$ $z_{10} = 3 - 4i$
a) $z_1 + z_7$ b) $z_5 - z_3$ c) $z_9 \cdot z_6$ d) z_8/z_{10} e) $z_3 + z_6$ f) $z_2 - z_6$
g) $z_3 \cdot z_{10}$ h) z_1^3 i) z_9^9 j) z_5^{15} k) z_{10}^3
l) hallar las raíces cuartas de z_2
m) hallar las raíces cúbicas de z_4
n) hallar las raíces séptimas de i

Ejercicios Adicionales

1. Probar que no hay enteros simultáneamente pares e impares.
2. Si a un número se lo divide por 5, el resto es 3 y si se lo divide por 7, el resto es 4. ¿Cuál es el resto si se lo divide por 35 ?
3. Demostrar que dados a, b enteros, Si $a|b$ y $b \neq 0$ entonces $|a| \leq |b|$
4. Analizar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
 - (a) Si $a|1$ entonces $a = 1$ o $a = -1$
 - (b) $a|b$ y $b|c$ entonces $a|c$
 - (c) $a(a-1)$ es par
 - (d) $x|y$ y $y|z$ entonces $x|yz$
 - (e) $a|b+c$ entonces $a|c$ ó $a|b$
5. Sean a y b dos enteros coprimos, demostrar que :
 - (a) $(a, b) = (a-b, b)$
 - (b) $a|c$ y $b|c$ entonces $ab|c$
6. Hallar $(5k+3, 3k+2)$, para cualquier k entero
7. Demostrar que : Si $(a, b) = d$; $a|c$ y $b|c$ entonces $ab|cd$
8. * Intente codificar (en el lenguaje que Ud prefiera) el *algoritmo de Euclides*. Pruebe que funciona con alguno de los ejercicios
9. * Investigue que dice *La criba de Eratóstenes* y trate de escribir un código que realice el procedimiento.
10. Sean u y v números racionales. Probar que:
 - (a) $u+v \in Q$ y $u-v \in Q$
 - (b) $u.v \in Q$
 - (c) Si u es no nulo, $u^{-1} \in Q$
11. Dados $a, b, c, d \in Z$, suponiendo que los denominadores no se anulen y que $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ no es cero, probar:
 - (a) $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$ y $\frac{b}{a} = \frac{d}{c}$
 - (b) $\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$
 - (c) $\frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d}$
12. Demostrar que si p es primo y $n \in N$, entonces $\sqrt[n]{p}$ es irracional

13. La suma de dos números complejos es 6, el módulo del primero es $\sqrt{13}$ y el del segundo es 5. De qué números complejos se trata?
14. Demostrar que para cualquier complejo z vale que
- $z \cdot \bar{z} = |z|^2$
 - $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$
 - $z - \bar{z} = 2\operatorname{Im}(z)i$
15. Encontrar el valor de h para que el complejo $\frac{1+3hi}{7+(h-2)i}$ sea un imaginario puro.
16. Realizar las operaciones con los complejos del último ejercicio (antes de los adicionales):
- *) hallar las raíces cúbicas de z_5
 - **) hallar las raíces quintas de z_6
 - ***) hallar las raíces séptimas de z_8