

# Análisis Estadístico Multivariante

Francisco Javier Mercader Martínez

## Índice

<b>1</b>	<b>Vectores aleatorios</b>	<b>1</b>
1.1	Introducción . . . . .	1
1.2	Independencia de las variables aleatorias . . . . .	1
1.3	Distribuciones marginales . . . . .	1
1.4	Vector aleatorio absolutamente continuo . . . . .	2
1.5	Vector aleatorio discreto . . . . .	2
1.6	Distribuciones marginales . . . . .	2
1.6.1	Caso continuo . . . . .	2
1.6.2	Caso discreto . . . . .	3
1.7	Distribuciones condicionadas . . . . .	3
1.7.1	Caso continuo . . . . .	3
1.7.2	Caso discreto . . . . .	4

# Tema 1: Vectores aleatorios

## 1.1) Introducción

**Objetivo:** estudiar  $k$  variables sobre una población de individuos (objetos).

Algunos ejemplos:

- Las variables meteorológicas como temperatura, humedad y velocidad del viento.
- La intensidad y la fase de una señal aleatoria que se miden en los canales de comunicación.
- Los parámetros clínicos de los pacientes (como presión arterial, niveles de glucosa, etc.)

Habitualmente estas variables cualitativas o discretas que nos indicarán grupos de individuos.

Estas variables se representarán mediante vectores aleatorios sobre un espacio de probabilidad.

### 1) Definiciones

Un **vector aleatorio** (v.a.)  $k$ -dimensional sobre un espacio de probabilidad  $(\Omega, \mathcal{S}, \mathcal{P})$  es  $X = (X_1, \dots, X_k)$  tal que

$$X_i^{-1}(-\infty, x] \in \mathcal{S}$$

para todo  $x \in \mathbb{R}$ ,  $i = 1, \dots, k$

### • Función de distribución conjunta

$$F : \mathbb{R}^k \longrightarrow [0, 1],$$

$$F(x_1, \dots, x_k) := P[X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_k \leq x_k],$$

para todo  $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}$ .

## 1.2) Independencia de las variables aleatorias

### • Definición

Las variables aleatorias  $X_1, \dots, X_k$  son **independientes** si los sucesos

$$\{x_1 \leq x_1\}, \{X_2 \leq x_2\}, \dots, \{X_k \leq x_k\}$$

son independientes para todo  $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}$ .

Esto es equivalente a que

$$F(x_1, \dots, x_k) = P[X_1 \leq x_1] \cdot P[X_2 \leq x_2] \cdots P[X_k \leq x_k]$$

para todo  $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}$ .

## 1.3) Distribuciones marginales

La función  $F_{X_i}(x_i) = P[X_i \leq x_i]$  se denomina **función de distribución marginal**  $i$ -ésima y corresponde con la función de distribución de la variable aleatoria  $X_i$

Las **distribuciones marginales** pueden obtenerse a partir de la distribución conjunta:

$$F_{X_i}(x_i) = F(+\infty, \dots, +\infty, x_i, +\infty, \dots, +\infty)$$

Análogamente, la **función de distribución marginal del subvector aleatorio**  $(X_{i_1}, \dots, X_{i_m})$  vendrá dada por

$$F_{X_{i_1}, \dots, X_{i_m}}(x_{i_1}, \dots, x_{i_m}) = F(+\infty, \dots, +\infty, x_{i_1}, +\infty, \dots, +\infty, x_{i_m}, +\infty, \dots, +\infty).$$

## 1.4) Vector aleatorio absolutamente continuo

Un vector aleatorio  $X$  es **absolutamente continuo** si existe una función  $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  no negativa (llamada **función de densidad**) tal que

$$F(x) = F(x_1, \dots, x_k) = \int_{-\infty}^{x_1} \cdots \int_{-\infty}^{x_k} f(z_1, \dots, z_k) dz_k, \dots, dz_1,$$

para todo  $x = (x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{R}^k$

Usando el **teorema fundamental del cálculo**, se tiene que en cada punto de continuidad  $(x_1, \dots, x_k)$  de  $f$ :

$$\frac{\partial^k F(x_1, \dots, x_k)}{\partial x_1, \dots, \partial x_k} = f(x_1, \dots, x_k).$$

Existen variables aleatorias cuya función de distribución es continua pero que no son absolutamente continuas (tienen una parte singular) y puede ocurrir que  $X_1, \dots, X_k$  sean absolutamente continuas y que  $(X_1, \dots, X_k)$  no lo sea.

→ Ejemplo: Si  $X_1$  es una variable aleatoria absolutamente continua, entonces el vector aleatorio  $X = (X_1, X_2)$  es continuo pero no absolutamente continuo.

→ De hecho, es completamente singular ya que está contenido en la recta  $y = x$  que tiene medida cero en  $\mathbb{R}^2$ .

Esto ocurre si consideramos las notas de unos alumnos y sus medidas. En estos casos deberemos eliminar estas variables dependientes del vector.

## 1.5) Vector aleatorio discreto

Un vector aleatorio  $X$  se dice que es **discreto** si existe un conjunto numerable  $\mathcal{S} \in \mathbb{R}^k$  tal que  $P(X \in \mathcal{S}) = 1$ .

**Función masa de probabilidad** de un vector aleatorio discreto:

$$P[X = x] = P[X_1 = x_1, \dots, X_k = x_k]$$

para todo  $x = (x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{R}^k$ , satisfaciendo:

$$\rightarrow P[X = x] \geq 0, \forall x \in \mathcal{S}$$

$$\rightarrow \sum_{x \in \mathcal{S}} P[X = x] = 1$$

**Función de distribución** de un vector aleatorio discreto:

$$F(x) = P[X \leq x] = \sum_{\substack{z \in \mathcal{S} \\ z \leq x}} P[X = z],$$

para todo  $x \in \mathbb{R}^k$ .

## 1.6) Distribuciones marginales

### 1.6.1) Caso continuo

- **Distribución marginal** de la variable aleatoria  $X_i$

Sea  $X = (X_1, \dots, X_k)$  un vector aleatorio continuo con función de densidad  $f$  entonces cada componente  $X_i$  es de tipo continuo y su función de distribución es;

$$F_{X_i}(x_i) = P[X_i \leq x_i] = \int_{-\infty}^{x_i} f_{X_i}(z_i) dz_i,$$

con

$$f_{X_i} = \int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} f(z_1, \dots, z_k) dz_1, \dots, dz_{i-1} \cdot dz_{i+1}, \dots, dz_k,$$

para todo  $z_i \in \mathbb{R}$ .

La función de densidad marginal de cualquier subvector se calcularía de igual forma.

$X_1, \dots, X_k$  son independientes  $\longleftrightarrow f(x_1, \dots, x_k) = f_{X_1}(x_1) \cdots f_{X_k}(x_k)$ .

## 1.6.2) Caso discreto

- Distribución marginal de la variable aleatoria  $X_i$

Sea  $X = (X_1, \dots, X_l)$  un vector aleatorio discreto con  $P[X \in \mathcal{S}] = 1$  y función masa de probabilidad  $P[X = x]$ , para todo  $x \in \mathcal{S}$ .

Si  $X_i$  es una componente arbitraria y por tanto discreta con valores en  $\mathcal{S}_i$ , entonces su función masa de probabilidad puede obtenerse a partir de la conjunta:

$$P[X_i = x_i] = \sum_{\substack{x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_k \\ (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) \in \mathcal{S}}} P[X_1 = x_1, \dots, X_{i-1} = x_{i-1}, X_i = x_i, X_{i+1} = x_{i+1}, \dots, X_k = x_k].$$

La función masa de probabilidad marginal de cualquier subvector se calcularía de igual forma.

$X_1, \dots, X_k$  son independientes  $\longleftrightarrow$  para todo  $(x_1, \dots, x_k) \in \mathcal{S}$ ,

$$P[X_1 = x_1, \dots, X_k = x_k] = P[X_1 = x_1] \cdots P[X_k = x_k].$$

Nota:

$A$  y  $B$  independientes  $\longleftrightarrow P(A|B) = P(A)$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A) \longrightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

## 1.7) Distribuciones condicionadas

### 1.7.1) Caso continuo

- Distribución condicionada al valor de una variable

Sea  $X = (X_1, \dots, X_k)$  un vector aleatorio continuo con función de densidad  $f$ .

Sea  $X_i$  una componente arbitraria y  $x_i^* \in \mathbb{R}$  tal que  $f_{X_i}(x_i^*) > 0$ .

Se define la **distribución condicionada** de  $(X_1, \dots, X_{i-1}, X_{i+1}, \dots, X_k)$  a  $(X_i = x_i^*)$  como la determinada por la función de densidad:

$$f_{X_1, \dots, X_{i-1}, \dots, X_k | X_i = x_i^*}(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_k | x_i^*) = \frac{f(x_1, \dots, x_i^*, \dots, x_k)}{f_{X_i}(x_i^*)}.$$

- Distribución condicionada a valores de varias variables

Sea  $X = (X_1, \dots, X_k)$  un vector aleatorio continuo con función de densidad  $f$ .

Sea  $(X_{i_1}, \dots, X_{i_m})$  un subvector arbitrario y  $(x_{i_1}^*, \dots, x_{i_m}^*) \in \mathbb{R}^m$  tal que:

$$f_{X_{i_1}, \dots, X_{i_m}}(x_{i_1}^*, \dots, x_{i_m}^*) > 0.$$

Se define la **distribución condicionada** de  $(X_1, \dots, X_{i_1-1}, X_{i_1+1}, \dots, X_{i_m-1}; X_{i_m+1}, \dots, X_k)$  a  $(X_{i_1} = x_{i_1}^*, \dots, X_{i_m} = x_{i_m}^*)$  como la determinada por la función de densidad:

$$f_{X_1, \dots, X_{i_1-1}, X_{i_1+1}, \dots, X_{i_m-1}, \dots, X_k | X_{i_1} = x_{i_1}^*, \dots, X_{i_m} = x_{i_m}^*}(x_1, \dots, x_{i_1-1}, x_{i_1+1}, \dots, x_{i_m-1}, x_{i_m+1}, \dots, x_k | x_i^*) = \frac{f(x_1, \dots, x_{i_1}, \dots, x_{i_m}, \dots, x_k)}{f_{X_{i_1}, \dots, X_{i_m}}(x_{i_1}^*, \dots, x_{i_m}^*)}$$

## 1.7.2) Caso discreto

### • Distribución condicionada al valor de una variable

Sea  $X = (X_1, \dots, X_k)$  un vector aleatorio discreto.

Sea  $X_i$  una componente arbitraria y  $x_i^* \in \mathbb{R}$  tal que

$$P[X_i = x_i^*] > 0.$$

Se define la **distribución condicionada** de  $(X_1, \dots, X_{i-1}, X_{i+1}, \dots, X_k)$  a  $(X_i = x_i^*)$  como la determinada por la función masa de probabilidad:

$$\frac{P[X_1 = x_1, \dots, X_{i-1} = x_{i-1}, X_{i+1} = x_{i+1}, \dots, X_k = x_k | X_i = x_i^*]}{P[X_1 = x_1, \dots, X_{i-1} = x_{i-1}, X_i = x_i^*, X_{i+1} = x_{i+1}, \dots, X_k = x_k]} = \frac{P[X_1 = x_1, \dots, X_{i-1} = x_{i-1}, X_{i+1} = x_{i+1}, \dots, X_k = x_k | X_i = x_i^*]}{P[X_i = x_i^*]}$$

para todo  $(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_k)$  tal que  $x_1, \dots, x_{i-1}, x_i^*, x_{i+1}, \dots, x_k \in \mathcal{S}$ .

### • Distribución condicionada a valores de varias variables

Sea  $X = (X_1, \dots, X_k)$  un vector aleatorio discreto.

Sea  $X_{i_1}, \dots, X_{i_m}$  un subvector arbitrario y  $(x_{i_1}^*, \dots, x_{i_m}^*) \in \mathbb{R}^m$  tal que

$$P[X_{i_1} = x_{i_1}^*, \dots, X_{i_m} = x_{i_m}^*] > 0.$$

Se define la **distribución condicionada** de  $(X_1, \dots, X_{i_1-1}, X_{i_1+1}, \dots, X_{i_m-1}, X_{i_m+1}, \dots, X_k)$  a  $(X_{i_1} = x_{i_1}^*, \dots, X_{i_m} = x_{i_m}^*)$  como la determinada por la función masa de probabilidad:

$$P[X_1, \dots, X_{i_1-1}, X_{i_1+1}, \dots, X_{i_m-1}; X_{i_m+1}, \dots, X_k | X_{i_1} = x_{i_1}^*, \dots, X_{i_m} = x_{i_m}^*] =$$

**RELACIÓN DE PROBLEMAS: VECTORES ALEATORIOS**  
ANÁLISIS ESTADÍSTICO MULTIVARIANTE  
GRADO EN CIENCIA E INGENIERÍA DE DATOS

1. Sea  $(X, Y)$  un vector aleatorio con función de densidad conjunta

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Hallar las distribuciones marginales y condicionadas.

2. Obtener las distribuciones marginales y condicionadas asociadas al vector aleatorio  $(X, Y)$  con función de densidad

$$f(x, y) = \begin{cases} 2 & \text{si } 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

3. Sea  $(X, Y)$  un vector aleatorio con función de densidad

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{4} \left[ xy + \frac{x^2}{2} \right] & \text{si } 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Hallar la distribución marginal de  $X$  y la distribución de  $Y$  condicionada a  $X = \frac{1}{2}$ .

4. Sea  $\mathbf{X} = (X_1, X_2)$  un vector aleatorio con función masa de probabilidad

$$P[X_1 = x_1, X_2 = x_2] = \frac{k}{2^{x_1+x_2}}, x_1, x_2 \in \mathbb{N},$$

donde  $k$  es una constante. Obtener las distribuciones marginales y condicionadas.

5. Calcular la función de densidad de una distribución normal bidimensional en  $(1, 1)$  si las medias son cero, las varianzas 1 y 4, y la covarianza 1.
6. Sea  $(X, Y)$  un vector aleatorio con distribución uniforme en el cuadrado unidad,  $[0, 1] \times [0, 1]$ , con función de densidad conjunta

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Calcular el valor esperado de  $g(X, Y) = XY^2$ , es decir,  $E[XY^2]$ .

7.  $(X, Y)$  vector aleatorio discreto con función masa de probabilidad conjunta:

$X \backslash Y$	1	2
1	1/9	2/9
2	2/9	4/9

- a) Calcular  $E[X + Y]$ ,  $E[2X + 3Y]$ .
- b) Obtener el vector de medias, la matriz de covarianzas y la matriz de correlaciones del vector  $(X, Y)$ .
- c) ¿Son independientes? ¿Están incorreladas?
8. Demostrar que el vector de medias muestral es el punto de  $\mathbb{R}^k$  que minimiza la suma de las distancias al cuadrado (error cuadrático medio, MSE).

1) Sea  $(X, Y)$  un vector aleatorio con función de densidad conjunta

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Hallar las distribuciones marginales y condicionadas

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_{-\infty}^0 0 dy + \int_0^1 1 dy + \int_1^{+\infty} 0 dy = [y]_{y=0}^{y=1} = 1 \quad f_X(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_0^1 1 dx = [x]_{x=0}^{x=1} = 1 \quad f_Y(y) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 < y < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$f_{y|x=x^*} = \frac{f(x^*, y)}{f_X(x^*)} = \begin{cases} 1 & 0 < y < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) \quad X \text{ e } Y \text{ independientes}$$

2) Obtener las distribuciones marginales y condicionadas asociadas al vector aleatorio  $(X, Y)$  con función de densidad

$$f(x, y) = \begin{cases} 2 & \text{si } 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^x 2 dy = [2y]_{y=0}^{y=x} = 2x \rightarrow \begin{cases} 2x & \text{si } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_y^1 2 dx = [2x]_{x=y}^{x=1} = 2 - 2y \rightarrow \begin{cases} 2 - 2y & \text{si } 0 < y < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Los recintos son dependientes.

$$y|x = x^*$$


$$f_X(x^*) > 0$$

$$f_{y|x=x^*}(y|x^*) = \frac{f(x^*, y)}{f_X(x^*)} = \begin{cases} \frac{2}{2x^*} & 0 < y < x^* \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{x^*} & 0 < y < x^* \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$x|y = y^*$$

$$f_Y(y^*) > 0$$

$$f_{x|y=y^*}(x|y^*) = \frac{f(x, y^*)}{f_Y(y^*)} = \begin{cases} \frac{2}{2 - 2y^*} & \text{si } y^* < x < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{1 - y^*} & \text{si } y^* < x < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$



3) Sea  $(X, Y)$  un vector aleatorio con función de densidad

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{4} \left[ xy + \frac{x^2}{2} \right] & \text{si } 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Hallar la distribución marginal de  $X$  y la distribución de  $Y$  condicionada a  $X = \frac{1}{2}$ .

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^2 \frac{3}{4} \left[ xy + \frac{x^2}{2} \right] dy = \frac{3}{4} \left[ \frac{xy^2}{2} + \frac{x^2}{2} y \right]_{y=0}^{y=2} = \frac{3}{4} \left( 2x + \frac{x^2}{2} \right) \rightarrow \begin{cases} \frac{3}{4} \left( 2x + \frac{x^2}{2} \right) & \text{si } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$y|x = x^*$$

$$f_{y|x=x^*}(y|x^*) = \frac{f(x^*, y)}{f(x^*)} = \frac{\frac{3}{4} \left( x^* y + \frac{(x^*)^2}{2} \right)}{\frac{3}{4} \left( 2x^* + \frac{(x^*)^2}{2} \right)} = \frac{x^* y + \frac{(x^*)^2}{2}}{2x^* + \frac{(x^*)^2}{2}} = \frac{2x^* y + (x^*)^2}{4x^* + (x^*)^2} \xrightarrow{x^* = \frac{1}{2}} \frac{y + \frac{1}{4}}{2 + \frac{1}{4}} = \frac{4y + 1}{9}$$

$$\begin{cases} \frac{4y + 1}{9} & \text{si } 0 < y < 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

4) Sea  $X = (X_1, X_2)$  un vector aleatorio con función masa de probabilidad

$$P[X_1 = x_1, X_2 = x_2] = \frac{k}{2^{x_1 + x_2}}, x_1, x_2 \in \mathbb{N}$$

donde  $k$  es una constante. Obtener las distribuciones marginales y condicionadas.