

DGL IIa

SoSe 2017

## Vorlesung 1: 18.04.2017

Dozent: Dr. Raphael Kruse

Mitschrift: Frank Rehfeld

# 1 Verallgemeinerte Ableitungen im Eindimensionalen

## Motivation

$u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  gesucht mit

$$\begin{aligned} -u''(x) &= f(x) \forall x \in \Omega \\ u(a) &= u(b) = 0 \forall x \in \partial\Omega \end{aligned}$$

für ein gegebenes  $f$

## Ziel

Lösungsbegriff abschwächen um unstetige  $f$  umzusetzen. Idee hierfür ist die Multiplikation mit Testfunktionen und anschließende partielle Integration.

$$\int_a^b u'(x) v'(x) + \cancel{[u'(x)v(x)]_a^b} = \int_a^b f(x) v(x)$$

Somit ist nicht mehr nötig, dass  $u \in \mathcal{C}^2$ . Dafür zusätzliche Forderung:  $u'v', fv \in L^1$

DGL IIa

SoSe 2017

## Vorlesung 2: 19.04.2017

Dozent: Dr. Raphael Kruse

Mitschrift: Frank Rehfeld

## Wiederholung

1. 
$$\begin{cases} u: \Omega = (a, b) \rightarrow \mathbb{R} \\ \int_{\Omega} u'(x) v'(x) \, dx = \int_{\Omega} f(x) v(x) \, dx \\ u(a) = u(b) \end{cases}$$
2. Eigenschaften  $L^p$ :
  - $1 \leq p < \infty \Rightarrow L^p$  separabel
  - $L^{\infty}$  nicht separabel
  - $1 < p < \infty, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \Rightarrow (L^p)' \equiv L^q$   
 $T: L^q \rightarrow (L^p)', (Tg)f = \int_{\Omega} f(x) g(x) \, dx$
  - $(L^1)' \equiv L^{\infty}, L^1 \subsetneq (L^{\infty})'$   
 $\Rightarrow L^1, L^{\infty}$  sind nicht reflexiv

## Definition

$L^1_{\text{loc}}(\Omega) := \{u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}: u|_K \in L^1(K) \forall K \subset \Omega \text{ kompakt}\}$   
Raum der lokal integrierbaren Abbildungen

## Definition

$\mathcal{C}_c^{\infty}(\Omega) := \{f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}: f \in \mathcal{C}^{\infty}, \text{supp}(f) \subset \Omega \text{ kompakt}\}$   
Raum der unendlich oft differenzierbaren Funktionen mit kompakten Träger  
 $\text{supp}(f) := \overline{\{x \in \Omega: f(x) \neq 0\}}$   
 $\mathcal{C}_c^{\infty} \neq \mathcal{C}_0^{\infty}$

## Beispiel

$\Omega = \mathbb{R}^d, d \in \mathbb{N}$

Glättungskern  $J(x) = \begin{cases} \exp\left(-\frac{1}{1-|x|^2}\right) & , |x| < 1 \\ 0 & , |x| \geq 1 \end{cases}$

## Definition

$u, v \in L^1_{\text{loc}}$ . Es gelte

$$\int_{\Omega} u(x) \phi(x) \, dx = - \int_{\Omega} v(x) \phi'(x) \, dx \forall \phi \in \mathcal{C}_c^{\infty}$$

$u$  heißt schwache Ableitung von  $v$ ,  $v$  heißt schwach differenzierbar

**Beispiel**

1.  $u(x) = |x|$  schwach differenzierbar auf  $(-1, 1)$

$$u'(x) = \begin{cases} -1 & , x < 0 \\ 1 & , x > 0 \end{cases}$$

2. Heaviside-Funktion auf  $\Omega = (-1, 1)$

$$H: \Omega \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} 1 & , x > 0 \\ 0 & , x \leq 0 \end{cases} \text{ ist nicht schwach differenzierbar}$$

**Eigenschaften:**

- klassisch differenzierbar  $\Rightarrow$  schwach differenzierbar
- schwache Ableitung ist eindeutig im  $L^1$ -Sinne
- übliche Eigenschaften (Linearität,...) bleiben erhalten

**Fundamentallemma der Variationsrechnung**

Sei  $u \in L^1_{\text{loc}}$  und

$$\int_{\Omega} u(x) \phi(x) \, dx = 0 \, \forall \phi \in \mathcal{C}_c^{\infty}$$

so folgt  $u = 0 \in L^1_{\text{loc}}$ .


**Definition**

$$J_{\epsilon}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, J_{\epsilon}(x) = \begin{cases} c_{\epsilon} \exp\left(-\frac{\epsilon^2}{\epsilon^2 - x^2}\right) & , x \in (-\epsilon, \epsilon) \\ 0 & , \text{sonst} \end{cases}$$

$c_{\epsilon} := \left(\int_{-\epsilon}^{\epsilon} \exp\left(-\frac{\epsilon^2}{\epsilon^2 - x^2}\right) dx\right)^{-1}$   $J_{\epsilon}$  ist der Standard-Glättungskern mit Träger  $[-\epsilon, \epsilon]$

- $J_{\epsilon} \in \mathcal{C}_c^{\infty}(\Omega)$
- $\int_{\mathbb{R}} J_{\epsilon}(x) \, dx = 1$
- $J_{\epsilon}(x) \geq 0 \, \forall x \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow J_{\epsilon}$  ist Wahrscheinlichkeits-Dichte



DGL IIa

SoSe 2017

## Vorlesung 3: 25.04.2017

Dozent: Dr. Raphael Kruse

Mitschrift: Frank Rehfeld

**Definition** $u: \Omega = (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  außerhalb von  $\Omega$  mit 0 fortgesetzt

$$u_\epsilon := (J_\epsilon \star u)(x) = \int_{\mathbb{R}} J_\epsilon(x-y) u(y) dy = \int_{\mathbb{R}} J_\epsilon(y) u(x-y) dy$$

heißt Glättung oder Regularisierung.**Eigenschaften** $u \in L^p(\Omega)$ ,  $\Omega \subset \mathbb{R}$  offenes Intervall,  $p \in [1, \infty)$ 

1. für  $\epsilon > 0$  ist  $u_\epsilon$  wohldefiniert
2.  $u_\epsilon \in C^\infty(\mathbb{R})$
3.  $\text{supp}(u) \subset \Omega$  kompakt,  $\epsilon$  klein genug  $\Rightarrow u_\epsilon \in C_c^\infty$
4.  $\|u_\epsilon\|_{0,p} \leq \|u\|_{0,p}$
5.  $\|u - u_\epsilon\|_{0,p} \rightarrow 0$  für  $\epsilon \rightarrow 0$
6.  $u_\epsilon(x) \rightarrow u(x)$  fast überall
7.  $u \in C(\Omega) \Rightarrow \|u - u_\epsilon\|_\infty \rightarrow 0$  auf jeder kompakten Teilmenge

**Fundamentallemma der Variationsrechnung**Sei  $u \in L^1_{\text{loc}}$  und

$$\int_{\Omega} u(x) \phi(x) dx = 0 \forall \phi \in C_c^\infty$$

so folgt  $u = 0 \in L^1_{\text{loc}}$ .**Beweis**Sei  $K \subset \Omega$  beliebig und kompakt und  $w = \text{sgn}(u) \mathbb{1}_K$ . Wäre  $w \in C_c^\infty(\Omega)$ , dann würde gelten

$$0 = \int_{\Omega} uw = \int_{\Omega} |u| \Rightarrow u = 0.$$

Im Allgemeinen ist  $w$  jedoch nicht glatt und wir müssen den Übergang zu  $w_\epsilon$  vollziehen. Wähle hierfür  $\epsilon_0 < \text{dist}(K, \partial\Omega)$ . Es gilt  $w_\epsilon \in C_c^\infty \forall \epsilon \in (0, \epsilon_0)$  da  $\text{supp}(w)$  kompakt. Somit gilt

$$\int_{\Omega} uw_\epsilon = 0 \forall \epsilon \in (0, \epsilon_0)$$

und somit  $(uw_\epsilon)(x) \rightarrow |u(x)|$  fast überall.Weiterhin gilt  $\forall x \in \Omega$ 

$$\begin{aligned} |u(x) w_\epsilon(x)| &= |u(x)| \left| \int_{\mathbb{R}} J_\epsilon(x-y) w(y) dy \right| \\ &\leq |u(x)| \int_{\mathbb{R}} J_\epsilon(x-y) \underbrace{|w(y)|}_{\leq 1} dy \\ &\leq |u(x)| \end{aligned}$$

Somit hat  $|u(x)| \mathbb{1}_{\text{supp}(w_{\epsilon_0})}$  kompakten Träger und ist Majorante für  $uw_\epsilon$ . Es folgt

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} u(x) w_\epsilon(x) \, dx = \int_{\mathbb{R}} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} u(x) w_\epsilon(x) \, dx \\ &= \int_{\Omega} u(x) w(x) \, dx = \int_{\Omega} |u(x)| \, dx. \end{aligned}$$

Somit folgt  $u = 0$  auf  $K$ . □

### Beweis der Eigenschaften der Glättung

1. Übung
2. Übung
3.  $1 = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}, p \in [1, \infty], x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} |u_\epsilon(x)| &\leq \int_{\mathbb{R}} J_\epsilon(x-y)^{\frac{1}{p}+1q} |u(y)| \, dy \\ &\stackrel{\text{Hölder}}{\leq} \underbrace{\left( \int_{\mathbb{R}} J_\epsilon(x-y) \, dy \right)^{\frac{1}{q}}}_{=1} \left( \int_{\mathbb{R}} J_\epsilon(x-y) |u(y)|^p \, dy \right)^{\frac{1}{p}} \\ \Rightarrow \|u_\epsilon\|_{0,p}^p &= \int_{\Omega} |u_\epsilon(x)|^p \, dx \leq \int_{\mathbb{R}} |u_\epsilon(x)|^p \, dx \\ &\leq \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} J_\epsilon(x-y) |u(y)|^p \, dy \, dx \\ &\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}} |u(y)|^p \underbrace{\int_{\mathbb{R}} J_\epsilon(x-y) \, dx}_{=1} \, dy \\ &= \int_{\mathbb{R}} |u(y)|^p \, dy = \int_{\Omega} |u(y)|^p \, dy = \|u\|_{0,p}^p \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned} |(u_\epsilon - u)(x)| &= \left| \int_{\mathbb{R}} J_\epsilon(y) (u(x-y) - u(x)) \, dy \right| \\ &\leq \dots \stackrel{\text{Hölder}}{\dots} \leq \left( \int_{\mathbb{R}} J_\epsilon(y) |u(x-y) - u(x)|^p \, dy \right)^{\frac{1}{p}} \\ \Rightarrow \|u_\epsilon - u\|_{0,p}^p &\leq \int_{\Omega} \int_{-\epsilon}^{\epsilon} J_\epsilon(y) |u(x-y) - u(x)|^p \, dy \, dx \\ &\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{-\epsilon}^{\epsilon} J_\epsilon(y) \int_{\Omega} |u(x-y) - u(x)|^p \, dx \, dy \\ &\leq \sup_{y \in [-\epsilon, \epsilon]} \int_{\Omega} |u(x-y) - u(x)|^p \, dx \end{aligned}$$

Die Behauptung folgt, da  $\forall u \in L^p(\Omega)$  gilt  $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \sup_{y \in [-\epsilon, \epsilon]} \int_{\Omega} |u(x-y) - u(x)|^p \, dx = 0$

5. analog

6.  $u \in \mathcal{C}(\Omega)$ ,  $K \subset \Omega$  kompakt. Wähle  $\epsilon_0 < \text{dist}(K, \partial\Omega)$ .

$K_0 = [\inf K - \epsilon_0, \sup K + \epsilon_0]$  bleibt kompakt und somit  $u$  gleichmäßig stetig auf  $K_0$ .

$\Rightarrow \forall \epsilon < \min \{ \delta, \epsilon_0 \}, x \in K$  gilt

$$\begin{aligned} |u_\epsilon(x) - u(x)| &\leq \int_{-\epsilon}^{\epsilon} J_\epsilon(y) \underbrace{|u(x-y) - u(x)|}_{\leq \eta} dy \\ &\leq \eta \int_{-\epsilon}^{\epsilon} J_\epsilon(y) dy = \eta \end{aligned}$$

□

---

— **Korollar** —

$u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$  schwach differenzierbar,  $v, w$  schwache Ableitungen von  $u$ . Dann gilt

$$v = w \text{ fast überall}$$


---

---

— **Satz** —

$\Omega = (a, b), u \in L^1(\Omega), u' \in L^1(\Omega)$  schwache Ableitung von  $u$   
 $\Rightarrow u$  auf  $\bar{\Omega}$  fast überall gleich einer absolut stetigen Funktion

$$\|u\|_\infty \leq \frac{\max(1, b-a)}{b-a} \|u\|_{1,1} = \frac{\max(1, b-a)}{b-a} (\|u\|_{0,1} + \|u'\|_{0,1})$$


---

DGL IIa

SoSe 2017

## Vorlesung 3: 26.04.2017

Dozent: Dr. Raphael Kruse

Mitschrift: Frank Rehfeld

**Beweis**

$$v(x) = \int_a^x u'(y) \, dy$$

mit  $u \in L^1(\Omega)$ . Somit ist  $v$  absolut stetig für klassisch differenzierbare  $u$  mit  $u^{prime} = v'$

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} v(x) \phi(x) \, dx &= - \int_{\Omega} v'(x) \phi(x) \, dx \\ &= - \int_{\Omega} u'(x) \phi(x) \, dx = \int_{\Omega} u(x) \phi(x) \, dx \end{aligned}$$

Mit dem vorigen Korollar erhält man somit

$$\exists c \in \mathbb{R}: u(x) = v(x) + c \text{ fast überall in } \Omega$$

Mit dem Mittelwertsatz erhält man

$$\begin{aligned} \Rightarrow \exists x_0 \in [a, b] = \bar{\Omega}: \int_a^b u(\xi) \, d\xi &= (b-a) u(x_0) \\ \Rightarrow u(x) &= u(x_0) + \int_{x_0}^x u'(\xi) \, d\xi \\ &= \frac{1}{b-a} \int_a^b u(\xi) \, d\xi + \int_{x_0}^x u'(\xi) \, d\xi \\ \Rightarrow \|u\|_{\infty} &\leq \frac{\max(1, b-a)}{b-a} (\|u\|_{0,1} + \|u'\|_{0,1}) \end{aligned}$$

□

– Dieser Satz gilt nur im Eindimensionalen!

– Fast überall gleich einer absolut stetigen Funktion  $\neq$  Fast überall absolut stetig

**Definition**

$u, v \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n$ -te schwache Ableitung von  $u$

$$\int_{\Omega} v(x) \phi(x) \, dx = (-1)^n \int_{\Omega} u(x) \phi^{(n)}(x) \, dx \quad \forall \phi \in \mathcal{C}_c^{\infty}(\Omega)$$

Im höherdimensionalen ist das Fehlen von Ableitungen niedrigerer Ordnung möglich.

**Satz**

$u \in L^1(\Omega)$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\Omega = (a, b)$

$\exists n$ -te schwache Ableitung  $u^{(n)} \in L^1(\Omega) \Rightarrow \exists k$ -te schwache Ableitung für  $k = 1, \dots, n-1$  und  $u^{(k)}$  ist

fast überall gleich einer absolut stetigen Funktion.

---

### Beweis

$v_{n-1}(x) = \int_a^x u^{(n)}(y) dy$  und somit ist  $v_{n-1}$  absolut stetig und damit  $v'_{n-1} = u^{(n)}$  fast überall gleich einer absolut stetigen Funktion.

Rekursiv erhält man  $v_{k-1}(x) = \int_a^x v_k(y) dy \Rightarrow v_{k-1}$  absolut stetig und somit  $v'_{k-1} = v_k$  fast überall gleich einer absolut stetigen Funktion.

Und somit:

$$\begin{aligned} (-1)^n \int_a^b u(x) \phi^{(n)}(x) dx &= \int_a^b u^{(n)}(x) \phi(x) dx \\ &= \int_a^b v'_{n-1}(x) \phi(x) dx \\ &= \dots = (-1)^n \int_a^b v_0(x) \phi^{(n)}(x) dx \end{aligned}$$

Außerdem lässt sich das Korollar verallgemeinern

$$\int_{\Omega} w \phi^{(n)} dx = 0 \forall \phi \in \mathcal{C}_c^{\infty}(\Omega) \Rightarrow w(x) = p(x) \text{ fast überall, } p \in \mathbb{P}_{n-1}[x]$$

Und somit  $u(x) = v_0(x) + p(x)$  ist fast überall gleich einer absolut stetigen Funktion. Da  $u'$  existiert (im klassischen Sinne falls  $n \geq 2$ ) ist  $u'$  absolut stetig. Diese Erkenntnis kann iteriert werden.  $\square$

## 2 Die Sobolew-Räume $H^1(\Omega)$ , $H_0^1(\Omega)$ , $H^{-1}(\Omega)$

### Definition

$$W^{k,p}(\Omega) := \left( u \in L^p : \exists u^{(k)} \in L^p \right)$$

ist mit

$$\|u\|_{k,p} = \left( \sum_{j=0}^k \|u^{(j)}\|_{0,p}^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

ein Banachraum, genannt Sobolewraum.

### Definition

$$W^{1,2}(\Omega) = H^1(\Omega)$$

ist ein Hilbertraum.

---

### Satz

$$\|u\|_{1,2} = (u, u)_{1,2}^{\frac{1}{2}}$$

mit

$$(u, v)_{1,2} = (u, v)_{0,2} + (u', v')_{0,2} = \int uv + u'v' dx$$



definiert eine Norm, bzw ein Skalarprodukt.  $\left(H^1(\Omega), \|\cdot\|_{1,2}, (\cdot, \cdot)_{1,2}\right)$  ist ein separabler Hilbertraum.

---