Microeconomia 1 (Lista 1)

Frederico Fonseca Ribeiro

Questão 1

- 1. COMPLETUDE: O indivíduo consegue formar uma relação de preferência entre todas as cestas. $(\forall x, y \in X, x \succeq y \text{ ou } y \succeq x)$
- 2. TRANSITIVIDADE: A relação de preferência entre as cestas consumidas é coerente. $(\forall x, y, z \in X, \quad x \succeq y \land y \succeq z \Rightarrow x \succeq z)$
- 3. DESEJABILIDADE/MONOTONICIDADE: Também tido como Não-Saciedade: quanto
- mais, melhor. $(\forall x,y\in X,\quad \left[x_i\geq y_i\;\forall i\;\mathrm{e}\;\exists j:x_j>y_j\right]\Rightarrow x\succ y)$ 4. CONVEXIDADE: A média é preferível aos extremos. $(\forall x,y\in X,\quad x\succeq y\;\mathrm{e}\;x\succeq z\Rightarrow x)$ $x \succeq \lambda y + (1 - \lambda)z, \quad \forall \lambda \in [0, 1]$
- 5. CONTINUIDADE: Permite traçar relações de utilidade. (Para todo $x \in X$, os conjuntos $\{y \in X\}$ $X: y \succeq x$ } e $\{y \in X: x \succeq y\}$ são fechados.)

Questão 2

a)

$$UMg_1 = \frac{\partial u}{\partial x_1} = x_2$$

De forma semelhante, , encontramos a utilidade maginal de x_2 e temos que a $TMgS = \frac{UMg_1}{UMg_2} =$

b)

De forma semelhante, temos que:

$$TMgS = \frac{2x_1x^2}{2x_1^2x_2}$$

c)

$$TMgS = \frac{1/x_1}{1/x_2}$$

Questão 3

a)

Demonstrando homogeneidade de grau zero:

$$x_1(p,w) = x(kp,kw) \tag{1}$$

$$\left(\frac{2w}{2p_1+p_2}\right) = \left(\frac{k2w}{k2p_1+kp_2}\right) \tag{2}$$

$$= \left(\frac{k(ww)}{k(2p_1 + p_2)}\right) \tag{3}$$

$$= \left(\frac{2w}{2p_1 + p_2}\right) \tag{4}$$

Demonstrando Lei de Walras:

$$px = w \tag{5}$$

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 = w (6)$$

$$p_1 \left(\frac{2w}{2p_1 + p_2} \right) + p_2 \left(\frac{w}{2p_1 + p_2} \right) = w \tag{7}$$

$$w\left(\frac{2p_1 + p_2}{2p_1 + p_2}\right) = w \tag{8}$$

$$w = w \tag{9}$$

b)

Demonstrando grau de homogeneidade 0 para x_1 , sendo os outros casos análogos:

$$x_1(p, w) = x(kp, kw) \tag{10}$$

$$\left(\frac{p_2w}{(p_1+p_2+p_3)p_1}\right) = \left(\frac{kp_2kw}{(kp_1+kp_2+kp_3)kp_1}\right) \tag{11}$$

$$= \left(\frac{k^2 p_2 w}{k^2 (p_1 + p_2 + p_3) p_1}\right) \tag{12}$$

$$= \left(\frac{p_2 w}{(p_1 + p_2 + p_3)p_1}\right) \tag{13}$$

Demonstrando Lei de Walras

$$w = px (14)$$

$$=p_1\left(\frac{p_2w}{(p_1+p_2+p_3)p_1}\right)+p_2\left(\frac{p_3w}{(p_1+p_2+p_3)p_2}\right)+p_3\left(\frac{\beta p_1w}{(p_1+p_2+p_3)p_3}\right) \tag{15}$$

$$= \left(\frac{p_2 w + p_3 w + \beta p_1 w}{p_1 + p_2 + p_3}\right) \tag{16}$$

$$=\frac{w(\beta p_1 + p_2 + p_3)}{p_1 + p_2 + p_3} \tag{17}$$

$$= w, \text{ se } \beta = 1 \tag{18}$$

Questão 4

Provando homogeneidade de grau zero:

$$x_1(kp,kw) = \frac{kp_2}{kp_3} = \frac{p_2}{p_3} = x_1(p,w) \tag{19}$$

$$x_2(kp,kw) = -\frac{kp_1}{kp_3} = -\frac{p_1}{p_3} = x_2(p,w) \eqno(20)$$

$$x_3(kp, kw) = \frac{kw}{kp_3} = \frac{w}{p_3} = x_3(p, w)$$
 (21)

Provando Lei de Walras:

$$p_1\left(\frac{p_2}{p_3}\right) + p_2\left(-\frac{p_1}{p_3}\right) + p_3\left(\frac{w}{p3}\right) = w$$

Os dois primeiros termos se anulam e os p_3 também se anulam no terceiro termo, sendo assim:

$$w = w$$

Questão 5

Cobb-Douglas

a)

Para mostrar que que é homotética, deve-se provar a homogeneidade de grau 1:

$$tu(x_1, x_2) = u(tx_1, tx_2) (22)$$

$$= u(K(tx_1)^{\alpha}(tx_2)^{1-\alpha}) \tag{23}$$

$$=Kt^{\alpha}x_1^{\alpha}t^{1-\alpha}x_2^{1-\alpha} \tag{24}$$

$$=tKx_1^{\alpha}x_2^{1-\alpha} \tag{25}$$

b)

Para encontrar a demanda Walrasiana, ou seja, em função de p e de w, devemos maximizar a função sujeita à restrição orçamentária, sendo assim temos o seguinte lagrangeano:

$$\mathcal{L} = Kx_1^{\alpha}x_2^{1-\alpha} + \lambda(w - p_1x_1 - p_2x_2)$$
 (26)

Sendo assim, temos as seguintes condições de primeira ordem:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = \alpha K x_1^{\alpha - 1} x_2^{1 - \alpha} - \lambda p_1 = 0 \tag{27}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = (1-\alpha)Kx_1^{\alpha}x_2^{-\alpha} - \lambda p_2 = 0 \tag{28}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = w - p_1 x_1 - p_2 x_2 = 0 \tag{29}$$

Isolando λ e substituindo dentro de Equação ??, temos que:

$$K\alpha x_1^{\alpha - 1} x_2^{1 - \alpha} = p_1 \left(\frac{(1 - \alpha) K x_1^{\alpha} x_2^{-\alpha}}{p_2} \right)$$

Podemos eliminar K dos dois lados. Além disso, para isolar x_2 , dividimos ambos os lados por $x_1^{\alpha-1}$ e multiplicamos por x_2^{α} , restando:

$$x_2 = \frac{p_1}{p_2} \frac{(1 - \alpha)}{\alpha} x_1 \tag{30}$$

Substituindo na Equação ??, temos que:

$$\begin{aligned} w - p_1 x_1 - p_2 \left(\frac{p_1}{p_2} \frac{(1 - \alpha)}{\alpha} x_1 \right) \\ p_1 x_1 + \left(p_1 \frac{(1 - \alpha)}{\alpha} x_1 \right) &= w \\ p_1 x_1 \left(1 + \frac{(1 - \alpha)}{\alpha} \right) &= w \\ p_1 x_1 \frac{1}{\alpha} &= w \end{aligned}$$

E chegamos à demanda Walrasiana de x_1 :

$$x_1^*(p, w) = \frac{w\alpha}{p_1} \tag{31}$$

Similarmente, encontramos $x_2^*(p, w)$:

$$x_2^*(p,w) = \frac{w(1-\alpha)}{p_2} \tag{32}$$

c)

Para encontrarmos a função de utilidade indireta, precisamos substituir a demanda Walrasiana dentro da função utilidade:

$$v(p,w) = Kw \left(\frac{w\alpha}{p_1}\right)^{\alpha} \left(\frac{w(1-\alpha)}{p_2}\right)^{1-\alpha}$$

d)

e)

Para acharmos a demanda Hicksiana, devemos minimizar o gasto em função da utilidade, sendo assim, temos:

$$\mathcal{L} = p_1x_1 + p_2x_2 + \lambda(u - Kx_1^{\alpha}x_2^{-\alpha})$$

Condições de primeira ordem:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = p_1 + \lambda K \alpha x_1^{\alpha - 1} x_2^{1 - \alpha} = 0 \tag{33}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = p_2 + \lambda K (1 - \alpha) x_1^{\alpha} x_2^{-\alpha} = 0 \tag{34} \label{eq:34}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = u - K x_1^{\alpha} x_2^{-\alpha}) = 0 \tag{35}$$

Isolando λ na Equação ?? e substituindo na Equação ??, temos:

$$p_1 - \frac{p_2 h K \alpha x_1^{\alpha - 1} x_2^{1 - \alpha}}{K(1 - \alpha) x_1^{\alpha} x_2^{-\alpha}} = p_1 - \frac{p_2 \alpha x_1^{-1} x_2^1}{(1 - \alpha)} = 0$$

Isolando x_2 :

$$x_2 = \frac{p_1}{p_2} \frac{(1 - \alpha)}{\alpha} x_1 \tag{36}$$

Substituindo a Equação ?? na Equação ??:

$$u - Kx_1^{\alpha} \left(\frac{p_1}{p_2} \frac{1 - \alpha}{\alpha} x_1 \right)^{1 - \alpha} = 0$$

Isolando x_1 :

$$x_1 = \frac{u}{K} \left(\frac{p_2}{p_1} \frac{\alpha}{1 - \alpha} \right)^{1 - \alpha} = h_1^*(p, u) \tag{37}$$

Semelhantemente, encontra-se $h_2^* = \frac{u}{K} \left(\frac{p_1}{p_2} \frac{1-\alpha}{\alpha} \right)^{\alpha}$

f)

Para achar a função dispêndio, basta substituir a demanda Hicksiana dentro:

$$e(p,u) = p_1 \frac{u}{K} \left[\frac{\alpha}{1-\alpha} \frac{p_2}{p_1} \right]^{1-\alpha} + p_2 \frac{u}{K} \left[\frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{p_1}{p_2} \right]^{\alpha}$$
(38)

$$= \frac{u}{K} p_1^{\alpha} p_2^{1-\alpha} \left[\frac{\alpha^{1-\alpha}}{(1-\alpha)^{1-\alpha}} + \frac{(1-\alpha)^{\alpha}}{\alpha^{\alpha}} \right]$$
 (39)

$$= \frac{u}{\kappa} p_1^{\alpha} p_2^{1-\alpha} \left[\alpha^{-\alpha} (1-\alpha)^{-(1-\alpha)} \right]$$
 (40)

g)

Aplicando o Lema de Shephard, basta derivar a função dispêndio em relação ao preço:

$$\frac{\partial e(p,u)}{\partial p_1} = \frac{u}{K} \left(\frac{p_2}{p_1} \frac{\alpha}{1-\alpha} \right)^{1-\alpha} = h_1^*(p,u)$$

Nota: o expoente α que desce multiplicando ajuda na simplificação ao evidenciar o expoente dos parênteses dos termos à direita.

h)

Para encontrar os efeitos Renda, Substituição e Total, devemos usar a Equação de Slutsky.

CES

Questão 6

Podemos definir a renda real como $R = w - p_0 x$. A partir da Equação ??, temos que:

$$x-x_0=\frac{R\alpha}{p_x}=\frac{(w-px_0)\alpha}{p_x}$$

Ou seja, como se gasta primeiro com x_0 , há uma redução da reta orçamentária real.

Questão 7

a)

Para resolver a questão, devemos utilizar a Identidade de Roy, sendo assim:

$$x_1^*(p, w) = -\frac{-\alpha/p_1}{(\alpha + \beta)/w} = \frac{\alpha}{(\alpha + \beta)} \frac{w}{p_1}$$

Similarmente, para x_2 :

$$x_2^*(p,w) = \frac{\beta}{(\alpha+\beta)} \frac{w}{p_2}$$

b)

Para encontrar a função dispêndio, basta isolar w:

$$\ln w = \frac{\alpha \ln p_1 + \beta \ln p_2 - K + u}{(\alpha + \beta)}$$

Usando propriedades logarítimicas e depois usando função exponencial, tem-se que:

$$e(p,u) = e^{\frac{u-K}{\alpha+\beta}} p_1^{\frac{\alpha}{\alpha+\beta}} p_2^{\frac{\beta}{\alpha+\beta}}$$

Para chegar à Demanda Hicksiana, aplica-se o Lema de Shephard, que é a derivação da função dispêndio pelo preço:

$$h_1(p, u) = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} e^{\frac{u - K}{\alpha + \beta}} \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\beta}{\alpha + \beta}}$$

Semelhantemente, para o outro bem:

$$h_2(p,u) = \frac{\beta}{\alpha+\beta} \, e^{\frac{u-K}{\alpha+\beta}} \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha+\beta}}$$

Questão 8

a)

Para esta questão, considere $\alpha = 1/2$

Logo, a fim de maximizar a utilidade dada uma restrição orçamentária, temos as seguintes CPOs:

$$\alpha x_1^{\alpha-1} + \lambda p_1 = 0$$

$$(1-\alpha)x_2^{-\alpha} + \lambda p_2 = 0$$

$$w - p_1 x_1 - p_2 x_2 = 0$$

Igualando as equações, temos que:

$$\frac{(1-\alpha)x_2^{-\alpha}}{p_2} = \frac{\alpha x_1^{\alpha-1}}{p_1}$$

Isolando:

$$\begin{split} x_2^\alpha &= \frac{p_1}{p_2} \frac{\alpha}{(1-\alpha)} x_1^{\alpha-1} \\ x_2 &= \left(\frac{p_1}{p_2} \frac{\alpha}{(1-\alpha) x_1^{1-\alpha}} \right)^{\frac{1}{\alpha}} \end{split}$$

Reduzindo ao substituir α :

$$x_2 = \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^2 x_1$$

Substituindo na restrição orçamentária:

$$\begin{split} w &= p_1 x_1 + p_2 \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^2 x_1 \\ x_1^* &= \frac{w}{p_1 + \frac{p_1^2}{p_2}} \\ x_1^* &= \frac{p_2 w}{p_1 p_2 + p_1^2} \end{split}$$

Similarmente:

$$x_2^* = \frac{p_1 w}{p_1 p_2 + p_2^2}$$

Substituindo na função utilidade:

$$\begin{split} v(p^*,w) &= \left(\frac{p_1 w}{p_1 p_2 + p_2^2}\right)^{1/2} + \left(\frac{p_2 w}{p_1 p_2 + p_1^2}\right)^{1/2} \\ v(p^*,w) &= w^{1/2} \left(\frac{p_1^2 + p_2^2}{p_1 p_2 (p_1 + p_2)}\right)^{1/2} \end{split}$$

Para achar a função dispêndio, deve-se isolar w:

$$w=u^2\left(\frac{p_1p_2(p_1+p_2)}{(p_1+p_2)^2}\right)$$

$$w = u^2 \left(\frac{p_1 p_2}{(p_1 + p_2)} \right)$$

Da função dispêndio, derivando em relação aos preços, encontra-se a Demanda Hicksiana:

Dica: Em vez de usar regra do quociente, bote a expressão em baixo elevado a -1 para usar a regra do produto.

$$u^2 \left[p_2 (p_1 + p_2)^{-1} - p_1 p_2 (p_1 + p_2)^{-2} \right] = u^2 \frac{p_2^2}{(p_1 + p_2)^2} = h_1(p, u)$$

Semelhantemente para o bem 2:

$$u^2 \frac{p_1^2}{(p_1 + p_2)^2} = h_2(p, u)$$

b)

Para responder, devemos utilizar a Equação de Slutsky:

Para achar ET, basta a diferença de x_2 com os diferentes preços:

$$\frac{1 \cdot 10}{2 \cdot 1 + 2^2} - \frac{1 \cdot 10}{1 \cdot 1 + 1^2}$$
$$\frac{10}{6} - \frac{10}{2} = \frac{-10}{3} = ET$$

Efeito renda, sendo a derivada da demanda walrasiana em relação a w:

$$-\frac{p_2}{p_1p_2+p_2^2}x_1$$

Sendo assim, temos:

$$-\frac{1}{2 \cdot 1 + 1^2} \cdot \frac{1 \cdot 10}{2 \cdot 1 + 2^2} = -\frac{1}{3} \frac{10}{6} = -\frac{5}{9} = ER$$

Sendo assim, o ES = ET - ER é igual a:


$$-\frac{10}{3} - \left(-\frac{5}{9}\right)$$
$$\frac{5}{9} - \frac{30}{9} = -\frac{25}{9} = ES$$

Questão 9


a)

Dado um aumento de renda, a demanda do bem x aumentará se for um bem normal e o oposto, caso for um bem inferior.


Em relação à TMgS, caso a renda aumente, o valor continuará o mesmo, apenas mudando a curva de indiferença em que a escolha ótima está, mas com a inclinação da reta constante.



Já para as Curvas de Engel, tem-se:



Quanto maior a renda, maior a demanda de x.



Para um bem inferior, após certo ponto da renda, a demanda diminui.

b)

Ao aumentar o preço, há o efeito substituição e o efeito renda. O de substituição se refere ao aumento da demanda de outro bem, vide a relação cruzada de demanda e preço. Já o efeito renda, se refere ao impacto do preço na renda real.

Questão 10

O resultado esperado de cada loteria se dá por:

$$\begin{split} L_1 &= \left(0 \cdot \frac{1}{3} + 100 \cdot \frac{1}{3} + 200 \cdot \frac{1}{3}\right) = 100 \\ L_2 &= \left(0 \cdot \frac{1}{2} + 100 \cdot 0 + 200 \cdot \frac{1}{2}\right) = 100 \\ L_3 &= \left(0 \cdot 0 + 100 \cdot \frac{3}{4} + 200 \cdot \frac{1}{4}\right) = 125 \end{split}$$

Assumindo uma relação linear tal qual u(x)=x, tanto o valor esperado de L_2 quanto de L_3 são maiores que L_1 , logo há contradição.

Questão 11

a)

$$r_A(x) = -\frac{-\frac{1}{4}x^{-3/2}}{\frac{1}{2}x^{-1/2}}$$

$$r_A(x) = \frac{1}{2x}$$

Substituindo x:

$$\frac{1}{2\cdot 5} = 0, 1$$

Relativa:

$$R_R = 5 \cdot 0, 1 = 0, 5$$