



1

引言

- ❖ 集合是数学中最为基本的概念，又是数学各分支、自然科学及社会科学各领域的最普遍采用的描述工具。
- ❖ 集合论是以集合概念为基础，研究集合的一般性质的数学分支学科，是现代数学的理论基础。
 - 由于集合论的语言适合于描述和研究离散对象及其关系，所以是计算机科学与工程的理论基础。
 - 集合的元素已由数学的“数集”和“点集”拓展成包含文字、符号、图形、图表和声音等多媒体的信息，构成了可以包含各种数据类型集合。
- ❖ 与计算机科学的联系
 - 在程序设计、数据库、形式语言和自动机理论等学科领域中都有重要的应用。

2

集合论的创立

- ❖ 1874年，德国数学家康托尔（G. Cantor, 1845年—1918年）创立了朴素集合论，为数学的统一提供了基础。
- ❖ 正当集合论被誉为绝对严格的数学基础时，1900年前后，集合论的悖论相继发现，尤其是罗素悖论的提出，动摇了整个数学的基础。使人们对数学的严密可靠性产生了怀疑，从而触发了极为严重的第三次数学危机。
- ❖ 为了排除悖论，克服危机，恢复数学的“绝对严格性”，数学家和逻辑学家做了大量工作，展开了激烈的论战。于是在20世纪初，便产生了一个新的数学领域——数学基础，并逐步形成了三大学派，即布劳威尔的直觉主义、罗素的逻辑主义以及希尔伯特的形式主义。同时，数学家对集合论也进行了公理化改造，建立了各种形式的公理集合论。

3

集合论的争议 (有关集合论的悖论)

- ❖ (1) “理发师悖论”

一天，萨维尔村理发师挂出一块招牌：“村里所有不自己理发的人都由我给他们理发，我也只给这些人理发。”于是有人问他：“您的头发由谁理呢？”理发师顿时哑口无言。

因为，如果他给自己理发，那么他就属于自己给自己理发的那类人。但是，招牌上说明他不给这类人理发，因此他不能自己理。

如果由另外一个人给他理发，他就不给自己理发的人，而招牌上明明说他要给所有不自己理发的人理发，因此，他应该自己理。

由此可见，不管怎样的推论，理发师所说的话总是自相矛盾的。

4

集合论的争议(续) (有关集合论的悖论)

- ❖ (2) 罗素悖论

1902年，英国数学家罗素提出了这样一个理论：以M表示是其自身成员的集合的集合，N表示不是其自身成员的集合的集合。然后问N是否为其自身的成员？

如果N是它自身的成员，则N属于M而不属于N，也就是说N不是它自身的成员；另一方面，如果N不是它自身的成员，则N属于N而不属于M，也就是说N是它自身的成员。无论出现哪一种情况都将导出矛盾的结论，这就是著名的罗素悖论。

为了避免出现悖论，我们应该避免使用诸如“所有的集合组成的集合”这一类的术语。

5

集合论的知识体系


集合论

- 第3章集合
 - 集合的基本概念
 - 集合的运算与性质
 - 有限集合的计数
- 第4章二元关系
 - 关系的定义及表示方法
 - 关系的运算
 - 关系的性质及其判断方法
 - 等价关系、等价类与划分
 - 相容关系、相容类与覆盖
 - 偏序关系
- 第5章函数
 - 函数的基本概念
 - 函数的运算
- 第6章集合的基数


6




7




8




9



10



11



12

3.1.1 集合的基本概念

- ❖ 元素和集合之间的关系是隶属关系，即属于或不属于。
 - 若元素 a 是集合 A 的元素时，记作 $a \in A$ ，读作“ a 属于 A ”；
 - 反之，写成 $a \notin A$ ，读作“ a 不属于 A ”。
 - 例如， $A = \{1, 2, \{3\}, \{1, 2\}\}$ ，这里 $2 \in A$ ， $\{3\} \in A$ ，但 $3 \notin A$ 。



13

3.1.2 集合的表示法

- ❖ 表示一个集合通常有两种方法：列举法和谓词表示法。
- 1) **列举法（或枚举法）**：将集合的元素全部写在一对**花括号**内，元素之间用逗号分开。例如，
 - (1) $A = \{a, b, c, d\}$
 - (2) $B = \{1, 2, 3\}$
 - (3) $C = \{\text{张, 王, 李, 赵}\}$ 等。
- ❖ 列举法一般用于有限集合和有规律的无限集合。
- ❖ 例如，
 - (1) $A = \{1, 3, 5, 7, \dots\}$
 - (2) $B = \{10, 20, 30, \dots\}$
 - (3) $Z = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ 等。



14

3.1.2 集合的表示法

- 2) **描述法（谓词公式法）**：用 $A = \{x \mid P(x)\}$ 来表示所有具有性质 P 的一些对象组成的集合，其中 $P(x)$ 是谓词。
- ❖ 例如：
 - (1) $A = \{x \mid x \in \mathbb{R} \wedge x^2 - 1 = 0\}$ 表示方程 $x^2 - 1 = 0$ 的实数解集，也可以表示成 $A = \{-1, 1\}$ 。
 - (2) $B = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \wedge 3 < x \leq 6\}$ ，即 $B = \{4, 5, 6\}$ 。
 - (3) $C = \{x \mid x \text{ 是本校在校学生}\}$ 等。



15

3.1.2 集合的表示法

- ❖ 集合是多种多样的，我们可以根据集合中元素的个数对其进行分类。
- 定义3.1** 集合 S 中元素的个数有限时，称 S 为**有限集合**；否则，称 S 为**无限集合**。若 S 为有限集， S 中元素的个数称为 S 的**基数**，记为 $|S|$ 。（关于集合基数的定义将在第6章详细讨论）
- ❖ 例如：
 - (1) $A = \{a, \{b, c\}, d, \{\{d\}\}\}$ 是有限集，且 $|A| = 4$ 。
 - (2) 令 S 为英语字母集，那么 $|S| = 26$ 。
 - (3) 全体正偶数的集合 $\{2, 4, 6, \dots\}$ 是无限集。



16

3.1.2 集合的表示法

- ❖ 下面介绍两个特殊集合。
- 定义3.2** 不包含任何元素的集合叫做**空集**，记作 \emptyset 。符号化表示为：

$$\emptyset = \{x \mid P(x) \wedge \neg P(x)\}$$
 其中 $P(x)$ 是任意谓词。空集是不包含任何元素的集合，所以， $|\emptyset| = 0$ 。
- ❖ 说明：
 - (1) $\emptyset \neq \{\emptyset\}$ ，前者是空集，是没有元素的集合；后者是以 \emptyset 作为元素的集合。
 - (2) 空集是客观存在的，例如， $\{x \mid x \in \mathbb{R} \wedge x^2 + 1 = 0\}$ ，即方程 $x^2 + 1 = 0$ 的实数解的集合是空集。



17

3.1.2 集合的表示法

- 定义3.3** 如果一个集合包含了所要讨论的每一个元素，则称该集合为**全集**，记作 E 。全集的符号化表示为：

$$E = \{x \mid P(x) \vee \neg P(x)\}$$
 其中 $P(x)$ 是任意谓词。
- ❖ **全集是一个相对的概念**。由于所研究的问题不同，所取的全集也不同。
- ❖ 例如，
 - 在研究整数间的问题时，可把整数集 \mathbb{Z} 取作全集。
 - 在研究平面几何的问题时，可把整个坐标平面取作全集。



18

3.1.3 集合之间的关系

❖ 包含与相等是集合间的两种基本关系，也是集合论中的两个基本概念。

外延公理 两个集合 A 与 B 相等当且仅当其元素相同，记作 $A = B$ 。

❖ 即 $A = B \Leftrightarrow \forall x(x \in A \Leftrightarrow x \in B)$

❖ 例如，

若 $A = \{2, 3\}$, $B = \{\text{小于4的素数}\}$, 则 $A = B$ 。

❖ 外延公理事实上刻画了集合元素的“相异性”、“无序性”，以及集合表示形式的“不唯一性”。



19

3.1.3 集合之间的关系

定义3.4 设 A 和 B 是任意两个集合，如果集合 A 的每个元素都是集合 B 的元素，则称 A 为 B 的一个子集。这时也称 A 被 B 包含或 B 包含 A 。记作 $A \subseteq B$ 或 $B \supseteq A$ 。如果 A 不是 B 的子集，即 A 至少有一个元素不属于 B ，则记作 $A \not\subseteq B$ 。

❖ $A \subseteq B$ 用谓词公式表示为：

$$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$$

❖ $A \not\subseteq B$ 用谓词公式表示为：

$$A \not\subseteq B \Leftrightarrow \exists x(x \in A \wedge x \notin B)$$

❖ 例如：

(1) 若 $A = \{a, b, c\}$, $B = \{a, e, i, o, u\}$, $D = \{a, c\}$, 则有 $D \subseteq A$, $D \not\subseteq B$ 。

(2) 若 $A = \{a, b, c\}$, $B = \{c, a, b\}$, 则有 $B \subseteq A$, $A \subseteq B$ 。

(3) $N \subseteq Z \subseteq Q \subseteq R \subseteq C$ 。



20

3.1.3 集合之间的关系

❖ 根据子集的定义可以证明，包含关系具有下列一些性质。

定理3.1 设 A , B 和 C 是任意集合，则：

$$(1) \emptyset \subseteq A$$

$$(2) A \subseteq A$$

$$(3) A \subseteq B \wedge B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$$

证：(1)、(2) 由定义显然成立。

$$(3) (A \subseteq B) \wedge (B \subseteq C)$$

$$\Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \forall x(x \in B \rightarrow x \in C)$$

$$\Leftrightarrow \forall x((x \in A \rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \rightarrow x \in C))$$

$$\Rightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in C)$$

$$\Leftrightarrow A \subseteq C$$



21

3.1.3 集合之间的关系

❖ 平凡子集：

由定理3.1的 (1)、(2)，任意一个非空集合 A 至少有两个子集，一个是空集 \emptyset ，另一个是它本身 A ，称为 A 的平凡子集。

❖ 一般而言， A 的每个元素都能确定 A 的一个子集。即若 $a \in A$ ，则 $\{a\} \subseteq A$ 。



22

3.1.3 集合之间的关系

定理3.2 集合 A 和集合 B 相等的充分必要条件是这两个集合互为子集。如果 A 和 B 不相等，则记作 $A \neq B$ 。

证：集合相等可用谓词公式表示为，

$$A \subseteq B \wedge B \subseteq A$$

$$\Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \forall x(x \in B \rightarrow x \in A)$$

$$\Leftrightarrow \forall x((x \in A \rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \rightarrow x \in A))$$

$$\Leftrightarrow \forall x(x \in A \Leftrightarrow x \in B)$$

由外延公理可得， $A \subseteq B \wedge B \subseteq A \Leftrightarrow A = B$

❖ 例如：

(1) 若 $A = \{a, b, c\}$, $B = \{c, a, b\}$, 有 $B \subseteq A$ 且 $A \subseteq B$, 则有 $A = B$ 。

(2) 设 $A = \{\{1, 2\}, 4\}$, $B = \{1, 2, 4\}$, 则 $A \neq B$



23

3.1.3 集合之间的关系

定理3.3 空集是唯一的。

证：设有两个空集 \emptyset_1 和 \emptyset_2 ，由定理3.1的 (1) 有，

$$\emptyset_1 \subseteq \emptyset_2 \text{ 且 } \emptyset_2 \subseteq \emptyset_1$$

根据定理3.2，得 $\emptyset_1 = \emptyset_2$ 。

定义3.5 设 A , B 是集合，如果 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$ ，则称 A 为 B 的真子集，记作 $A \subset B$ 或 $B \supset A$ 。如果 A 不是 B 的真子集，记为 $A \not\subset B$ 。

真子集用谓词公式表示为：

$$A \subset B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge A \neq B$$

例如：

(1) $N \subset Z \subset Q \subset R$ ，但 $N \not\subset N$ 。

(2) 若 $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{b, c\}$ ，则 $B \subset A$ ，但 $A \not\subset A$ 。



24

3.1.3 集合之间的关系

例3.1 确定下列命题是否为真。

- (1) $\emptyset \subseteq \emptyset$
- (2) $\emptyset \in \emptyset$
- (3) $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$
- (4) $\emptyset \in \{\emptyset\}$

解:

由定理3.1有, (1)、(3) 为真,

由空集的定义, (2) 为假。 (4) 为真。



25

3.1.4 幂集和集族

❖ 含有 n 个元素的集合简称 **n 元集**, 它的含有 $m(m \leq n)$ 个元素的子集叫做它的 **m 元子集**。

❖ 任给一个 n 元集, 怎样求出它的全部子集呢? 举例说明如下。

例3.2 求 $A = \{a, b, c\}$ 的全部子集。

解: 将 A 的子集按基数从小到大分类,

0元子集: 有 $C_3^0 = 1$ 个, 即空集 \emptyset ;

1元子集: 有 $C_3^1 = 3$ 个, $\{a\}$, $\{b\}$ 和 $\{c\}$;

2元子集: 有 $C_3^2 = 3$ 个, $\{a, b\}$, $\{a, c\}$ 和 $\{b, c\}$;

3元子集: 有 $C_3^3 = 1$ 个, $\{a, b, c\}$ 。

集合 A 共有8个子集。



26

3.1.4 幂集和集族

定义3.6 给定集合 A , 由集合 A 的**所有子集为元素组成的集合**, 称为集合 A 的**幂集**, 记为 $P(A)$ (或 2^A)。幂集的符号化表示为,

$$P(A) = \{x \mid x \subseteq A\}$$

如例3.2中, $P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$ 。

对任意集合 A , 因为 $\emptyset \subseteq A$, $A \subseteq A$, 所以一定有 $A \in P(A)$, $\emptyset \in P(A)$ 。

例3.3 令 $A = \emptyset$, $B = \{\emptyset, a, \{a\}\}$, 求 $P(A)$ 、 $P(B)$ 和 $P(P(A))$ 。

解:

$$P(A) = \{\emptyset\}$$

$$P(P(A)) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\},$$

$$P(B) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{a\}, \{\{a\}\}, \{\emptyset, a\}, \{\emptyset, \{a\}\}, \{a, \{a\}\}, \{\emptyset, a, \{a\}\}\}.$$



27

3.1.4 幂集和集族

定理3.4 如果 $|A| = n$, 则 $|P(A)| = 2^n$ 。

证: A 的 $k(k=1, 2, \dots, n)$ 元子集的个数为 C_n^k , 所以

$$|P(A)| = C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n = 2^n$$

根据此定理, 当集合 A 的基数逐渐增长时, 幂集 $P(A)$ 的基数将以指数形式增长。



28

3.1.4 幂集和集族

定理3.5 设 A, B 为任意集合, 则 $A \subseteq B$ 当且仅当 $P(A) \subseteq P(B)$ 。

证: 必要性: 对任意的 x ,

$$x \in P(A)$$

$$\Leftrightarrow x \subseteq A, \text{ 因为 } A \subseteq B,$$

$$\Rightarrow x \subseteq B$$

$$\Leftrightarrow x \in P(B)$$

所以 $P(A) \subseteq P(B)$ 。

充分性:

假设 $A \not\subseteq B$, 那么至少有一元素 $a \in A$ 且 $a \notin B$, 考虑集合 $\{a\}$, 有 $\{a\} \in P(A)$ 且 $\{a\} \notin P(B)$, 与 $P(A) \subseteq P(B)$ 矛盾, 故 $A \subseteq B$ 。

定理得证。



29

3.1.4 幂集和集族

定义3.7 以集合为元素的集合称为**集族**。

例如,

$A = \{\{a, b, c\}, \{a, d, e\}, \{f\}, \{1, 2, 3\}\}$, $B = \{\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}\}$ 为集族。

定义3.8 给定集合 A , 由集合 A 的子集为元素组成的集合, 称为**集合 A 的子集族**。

由定义3.8, A 的所有子集族都是其幂集 $P(A)$ 的子集。

如例3.2中, $A = \{a, b, c\}$,

$$P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\},$$

则 $B = \{\emptyset\}$, $C = \{\{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$, $D = \{\{a\}, \{b, c\}\}$ 等都是 A 的子集族。



30

3.1.5 文氏图


- ❖ 还可以用文氏图 (Venn Diagram) 形象地表示集合。
- ❖ 表示方法:
 - 在文氏图中全集 E 用长方形表示。
 - 在长方形内部, 其他集合由各自不同的圆 (或任何其他的适当的闭曲线) 表示, 圆的内部表示集合。
 - 有时用点来表示集合中特定的元素。
 - 如果没有关于集合不交的说明, 任何两个圆应彼此相交。



31

3.1.5 文氏图

- ❖ 文氏图常用于表示集合之间的关系。设 A 、 B 为任意两个集合, 具体表示方法如下:
 - (1) 如果 $B \subset A$, 则表示 B 的圆在表示 A 的圆内, 如图 (a) 所示。
 - (2) 如果 A 与 B 不交, 即它们没有公共元素, 则表示 A 和 B 的两个圆在图中是分离的, 如图 (b) 所示。
 - (3) 如果 A 与 B 相交却不包含, 即有某些元素在 A 中但不在 B 中, 某些元素在 B 中但不在 A 中, 而有些元素可能同时属于 A 与 B , 有些元素可能既不在 A 中也不在 B 中。表示方法如图 (c) 所示。



32

小结

- 集合
- 集合的特征: 元素的确定性、相异性、无序性
 - 元素与集合的关系: \in 、 \notin
 - 集合与集合的关系
 - 包含: $A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$
 - 相等: $A=B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge B \subseteq A$
 - 集合的文氏图表示



33

作业

- ❖ 补充习题3.1



34

3.2 集合的运算与性质

集合运算是指用已知的集合去生成新的集合。



35

3.2.1 集合的运算

定义3.9 设 A 和 B 是任意两个集合,

- (1) A 和 B 的所有公共元素组成的集合称为 A 和 B 的交集, 记为 $A \cap B$, 即:

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$
- (2) 将 A 和 B 的所有元素合在一起构成的集合称为 A 和 B 的并集, 记为 $A \cup B$,

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$
- (3) 从集合 A 中去掉集合 B 的元素得到的集合称为 A 和 B 的差集, 也称作 B 对 A 的相对补集, 记为 $A - B$, 即:

$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

例3.4 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 3, 5\}$, 求 $A \cap B$ 、 $A \cup B$ 、 $A - B$ 和 $B - A$ 。

解: $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A \cap B = \{2, 3\}$
 $A - B = \{1, 4\}$, $B - A = \{5\}$



36

3.2.1 集合的运算

例3.6 设 $A \subseteq B$, 求证: $A \cap C \subseteq B \cap C$.

证:

对任意的 x ,

$$x \in A \cap C$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in C$$

$$\Rightarrow x \in B \wedge x \in C \quad (\text{因为 } A \subseteq B)$$

$$\Leftrightarrow x \in B \cap C$$

因此, $A \cap C \subseteq B \cap C$.



3.2.1 集合的运算

定义3.10 若集合A和B没有公共元素, 即 $A \cap B = \emptyset$, 则称A和B不相交。

如令 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5\}$, 则 $A \cap B = \emptyset$.

定义3.11 设A为任意集合, A的绝对补集简称补集, 记作 $\sim A$ (或 A^c), 定义为:

$$\sim A = E - A = \{x \mid x \in E \wedge x \notin A\}$$

因为E是全集, $x \in E$ 是真命题, 所以 $\sim A$ 可以定义为:

$$\sim A = \{x \mid x \notin A\}$$

它是一元运算, 是差运算的特例。

例如, $E = \{a, b, c, d\}$, $A = \{a, c\}$, 则

$$\sim A = \{b, d\}.$$



37

38

3.2.1 集合的运算

定义3.12 设A和B是任意两个集合, A与B的对称差记作 $A \oplus B$, 定义为:

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$$

例如, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{4, 5, 6, 7, 8\}$, 则

$$A - B = \{1, 2, 3\}, \quad B - A = \{6, 7, 8\},$$

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) = \{1, 2, 3, 6, 7, 8\}.$$

集合的基本运算可以用文氏图给予形象的描述。(具体见教材图3.4)

说明: 在以上讨论的各种运算中, 幂集、绝对补运算的优先级要高于并、交、相对补、对称差等二元运算。



3.2.2 集合的运算性质

下面的恒等式给出了集合运算的主要算律。

定理3.6 设A, B, C为任意的集合, 集合运算满足以下所列规律。

- (1) 双重否定律 $\sim(\sim A) = A$
- (2) 幂等律 $A \cup A = A, A \cap A = A$
- (3) 交换律 $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$
- (4) 结合律 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
- (5) 分配律 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C), A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- (6) 吸收律 $A \cap (A \cup B) = A, A \cup (A \cap B) = A$
- (7) 德摩根律 $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C), A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$
 $\sim(A \cup B) = \sim A \cap \sim B, \sim(A \cap B) = \sim A \cup \sim B$
 $\sim E = \emptyset, \sim \emptyset = E$



39

40

3.2.2 集合的运算性质

(8) 同一律 $A \cap E = A, A \cup \emptyset = A$;

(9) 零律 $A \cap \emptyset = \emptyset, A \cup E = E$

(10) 排中律 $A \cup \sim A = E$

(11) 矛盾律 $A \cap \sim A = \emptyset$

不难看出, 集合运算的规律和谓词演算的规律是一致的, 所以谓词演算的方法是证明集合恒等式的基本方法。



3.2.2 集合的运算性质

例3.8 证明 $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$, 即定理3.6的(7)。

证: 对任意的 x ,

$$x \in A - (B \cup C) \Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin (B \cup C)$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(x \in (B \cup C))$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(x \in B \vee x \in C)$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge \neg x \in B \wedge \neg x \in C$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A - B) \wedge (x \in A - C)$$

$$\Leftrightarrow x \in (A - B) \cap (A - C)$$

$$\text{故 } A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C).$$



41

42

3.2.2 集合的运算性质

例3.9 求证 $A \cap (A \cup B) = A$ ，即定理3.6的 (6)。

证：假设定理3.6中的其它恒等式均成立，则

$$\begin{aligned} A \cap (A \cup B) &= (A \cup \emptyset) \cap (A \cup B) \quad (\text{同一律}) \\ &= A \cup (\emptyset \cap B) \quad (\text{分配律}) \\ &= A \cup \emptyset \quad (\text{零律}) \\ &= A \quad (\text{同一律}) \end{aligned}$$




43


3.2.2 集合的运算性质

说明：证明集合恒等式的方法有两种：

(1) 根据定义进行证明，在叙述中采用半形式化的方法，证明中大量用到数理逻辑的等式及推理规则。如例3.8。思维形式记图如下。



(2) 恒等演算，利用已有的集合恒等式证明新的恒等式，如例3.9。思维形式记图如下。



44

3.2.2 集合的运算性质

定理3.7 设 A, B, C 是任意集合，则

- (1) $A \subseteq A \cup B, B \subseteq A \cup B$
 - 2 $A \cap B \subseteq A, A \cap B \subseteq B$
 - 3 $A - B = A \cap \sim B$
 - 4 $A - B \subseteq A$
 - (5) $(A - B) \cup B = A \cup B, (A \cup B) - B = A - B$
 - (6) 若 $A \subseteq C, B \subseteq C$ ，则 $A \cup B \subseteq C$
 - (7) 若 $A \subseteq B, A \subseteq C$ ，则 $A \subseteq B \cap C$
 - (8) 若 $A \subseteq B$ ，则 $\sim B \subseteq \sim A$
- 证明略，见教材。



45

3.2.2 集合的运算性质

定理3.8 对于任意集合 A, B, C ，

- (1) $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$
- (2) $A \oplus B = B \oplus A$
- (3) $A \oplus A = \emptyset$
- (4) $A \oplus \emptyset = A$
- (5) $\sim(A \oplus B) = A \oplus B$
- (6) $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$

可根据定义或用恒等演算法证明，证明略。



46

3.2.2 集合的运算性质

例3.10 已知 $A \oplus B = A \oplus C$ ，证明 $B = C$ 。

证：已知 $A \oplus B = A \oplus C$ ，则

$$\begin{aligned} A \oplus (A \oplus B) &= A \oplus (A \oplus C) \\ (A \oplus A) \oplus B &= (A \oplus A) \oplus C \quad (\text{由定理3.8 (6)}) \\ \emptyset \oplus B &= \emptyset \oplus C \quad (\text{由定理3.8 (3)}) \\ \text{所以, } B &= C \quad (\text{由定理3.8 (4)}) \end{aligned}$$

并与交运算可以推广到多个集合的情形：

$$\begin{aligned} \bigcap_{i=1}^n A_i &= A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n = \{x \mid x \in A_1 \wedge x \in A_2 \wedge \dots \wedge x \in A_n\} \\ \bigcup_{i=1}^n A_i &= A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \{x \mid x \in A_1 \vee x \in A_2 \vee \dots \vee x \in A_n\} \end{aligned}$$



47

3.2.2 集合的运算性质

例3.11 化简集合表达式： $(B - (A \cap C)) \cup (A \cap B \cap C)$

$$\begin{aligned} \text{解: } (B - (A \cap C)) \cup (A \cap B \cap C) &= (B \cap \sim(A \cap C)) \cup (B \cap (A \cap C)) \quad (\text{由定理3.7 (3), 交换律, 结合律}) \\ &= B \cap (\sim(A \cap C) \cup (A \cap C)) \quad (\text{分配律}) \\ &= B \cap E \quad (\text{排中律}) \\ &= B \quad (\text{同一律}) \end{aligned}$$

例3.12 已知 $A \cup B = A \cup C, A \cap B = A \cap C$ ，试证 $B = C$ 。

$$\begin{aligned} \text{证: } B &= B \cap (A \cup B) = B \cap (A \cup C) \\ &= (B \cap A) \cup (B \cap C) = (A \cap C) \cup (B \cap C) \\ &= (A \cup B) \cap C = (A \cup C) \cap C \\ &= C \end{aligned}$$



48

3.2.3 有序对与笛卡儿积

定义3.14 由两个元素 x 和 y 按一定的顺序排列成的二元组叫做一个**有序对**，也称**序偶**，记作 $\langle x, y \rangle$ ，其中 x 是它的第一元素， y 是它的第二元素。

例如，平面直角坐标系中点的坐标就是有序对， $\langle 1, 3 \rangle$, $\langle 3, 1 \rangle$, $\langle 2, 0 \rangle$ 等代表平面中不同的点。

由定义可知，有序对具有如下性质：

- (1) 当 $x \neq y$ 时， $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$ ，即与顺序有关。
- (2) 给定两个有序对 $\langle x, y \rangle$ 和 $\langle u, v \rangle$ ， $\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle$ 的充分必要条件是 $x=u$ 且 $y=v$ 。
- (3) 有序对 $\langle x, y \rangle$ 与集合 $\{x, y\}$ 不同，后者中的元素是无次序的。如当 $x \neq y$ 时， $\{x, y\} = \{y, x\}$ 。



49

3.2.3 有序对与笛卡儿积

定义3.16 设 A, B 为集合，用 A 中元素为第一元素， B 中元素为第二元素构成有序对，所有这样的有序对组成的集合叫做 A 和 B 的**笛卡儿积**，记作 $A \times B$ 。笛卡儿积的符号化表示为：

$$A \times B = \{\langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B\}$$

例如， $A = \{a, b\}$ ， $B = \{0, 1, 2\}$ ，则

$$A \times B = \{\langle a, 0 \rangle, \langle a, 1 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle\}$$

$$B \times A = \{\langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 2, b \rangle\}$$

可见，在一般情况下， $A \times B \neq B \times A$ 。

从笛卡儿积的定义和逻辑演算的知识可得：

- (1) 若 $\langle x, y \rangle \in A \times B$ ，则有 $x \in A$ 和 $y \in B$ 。
- (2) 若 $\langle x, y \rangle \notin A \times B$ ，则有 $x \notin A$ 或 $y \notin B$ 。
- (3) 由排列组合的知识易得，如果 $|A|=m$ ， $|B|=n$ ，则 $|A \times B| = |B \times A| = m \times n$ 。



50

3.2.3 有序对与笛卡儿积

作为集合的一种二元运算，笛卡儿积运算具有如下性质：

- (1) 对任意集合 A ，有 $\emptyset \times A = A \times \emptyset = \emptyset$
- (2) 当 $A \neq B \wedge A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset$ 时，有 $A \times B \neq B \times A$ ，即笛卡儿积运算不适合交换律。
- (3) 当 A, B, C 都不是空集时，有 $(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C)$ ，即笛卡儿积运算不满足结合律。
- (4) 笛卡儿积运算对 \cup 和 \cap 运算满足分配律。即对任意的集合 A, B, C 有，

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$$

$$(B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A)$$

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$

$$(B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A)$$



51

3.2.3 有序对与笛卡儿积

例如，设 $A = \{1\}$ ， $B = \{1, 2\}$ ， $C = \{2, 3\}$ ，则

$$A \times (B \cup C) = \{1\} \times \{1, 2, 3\} = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$$

$$(A \times B) \cup (A \times C) = \{1\} \times \{1, 2\} \cup \{1\} \times \{2, 3\} = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$$

$$A \times (B \cap C) = \{1\} \times \{2\} = \{\langle 1, 2 \rangle\}$$

$$(A \times B) \cap (A \times C) = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle\} \cap \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\} = \{\langle 1, 2 \rangle\}$$



52

3.2.3 有序对与笛卡儿积

定理3.9 设 A, B, C 为集合， $C \neq \emptyset$ ，则

1. $A \subseteq B$ 的充分必要条件是 $A \times C \subseteq B \times C$ 。

2. $A \subseteq B$ 的充分必要条件是 $C \times A \subseteq C \times B$ 。证

：仅证明 (1)，可类似地证明 (2)。必

要条件：对于任意的 $\langle x, y \rangle$ ，

$$\langle x, y \rangle \in A \times C \Leftrightarrow x \in A \wedge y \in C \Rightarrow x \in B \wedge y \in C \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in B \times C$$

所以 $A \times C \subseteq B \times C$ 。

充分条件：因为 $C \neq \emptyset$ ，所以存在 $y \in C$ ，对于任意的 x ，

$$x \in A \Rightarrow x \in A \wedge y \in C \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A \times C \Rightarrow \langle x, y \rangle \in B \times C$$

$$\Leftrightarrow x \in B \wedge y \in C \Rightarrow x \in B$$

所以 $A \subseteq B$ 。



53

3.2.3 有序对与笛卡儿积

定理3.10 设 A, B, C, D 为非空集合，则 $A \times B \subseteq C \times D$ 的充分必要条件是 $A \subseteq C$ 且 $B \subseteq D$ 。

证：必要条件：对于任意的 x, y ，

$$x \in A \wedge y \in B \Rightarrow \langle x, y \rangle \in A \times B \Rightarrow \langle x, y \rangle \in C \times D \Leftrightarrow x \in C \wedge y \in D$$

所以 $A \subseteq C$ 且 $B \subseteq D$ 。

充分条件：对于任意的 $\langle x, y \rangle$ ，

$$\langle x, y \rangle \in A \times B \Leftrightarrow x \in A \wedge y \in B \Rightarrow x \in C \wedge y \in D \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in C \times D$$

所以 $A \times B \subseteq C \times D$ 。

例3.13 设 $A = \{1, 2\}$ ，求 $P(A) \times A$ 。

解： $P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$ ，

$$P(A) \times A = \{\langle \emptyset, 1 \rangle, \langle \emptyset, 2 \rangle, \langle \{1\}, 1 \rangle, \langle \{1\}, 2 \rangle, \langle \{2\}, 1 \rangle, \langle \{2\}, 2 \rangle, \langle \{1, 2\}, 1 \rangle, \langle \{1, 2\}, 2 \rangle\}.$$



54

3.2.3 有序对与笛卡儿积

例3.14 设 A, B, C, D 为任意集合, 判断以下命题是否为真, 并说明理由。

- (1) $A \times B = A \times C \Rightarrow B = C$
- (2) $A - (B \times C) = (A - B) \times (A - C)$
- (3) $A = B \wedge C = D \Rightarrow A \times C = B \times D$
- (4) 存在集合 A , 使得 $A \subseteq A \times A$

解: (1) 不一定为真, 当 $A = \emptyset, B = \{1\}, C = \{2\}$ 时有 $A \times B = A \times C = \emptyset$, 但 $B \neq C$ 。

(2) 不一定为真, 当 $A = B = \{1\}, C = \{2\}$ 时有

$$A - (B \times C) = \{1\} - \{<1, 2>\} = \{1\}$$

$$(A - B) \times (A - C) = \emptyset \times \{1\} = \emptyset$$


(3) 为真, 由恒等置换的原理可证。

(4) 为真, 当 $A = \emptyset$ 时, 有 $A \subseteq A \times A$ 成立。



55

小结



56

3.3 有限集合的计数

❖ 集合的运算, 可用于有限个元素的计数问题。



57

3.3 有限集合的计数

❖ 使用文氏图可以很方便地解决有限集的计数问题。具体方法如下:


1) 根据已知条件画出对应的文氏图。

一般地说, 一条性质决定一个集合。有多少条性质, 就有多少个集合。
如果没有特殊的说明, 任何两个集合都画成相交的。

2) 将已知集合的元素数填入表示该集合的区域内。

通常从 n 个集合的交集填起, 根据计算的结果将数字逐步填入所有的空白区域。如果交集的数字是未知的, 可以设为 x 。

3) 根据题目中的条件, 列出一方程或方程组, 就可以求得所需要的结果。用文氏图求解有限集计数问题的思维形式图如下。



58

3.3 有限集合的计数

例3.15 对24名人员掌握外语情况的调查, 其统计结果如下:

- ◆ 会英、日、德、法分别为: 13, 5, 10和9人;
- ◆ 同时会英语和日语的有2人;
- ◆ 会英、德和法语中任两种语言的都是4人。


已知会日语的人既不懂法语也不懂德语, 分别求只会一种语言 (英、德、法、日) 的人数和会三种语言的人数。

解 令 A, B, C 和 D 分别表示会英、法、德、日语的人的集合。
设同时会三种语言的有 x 人, 只会英、法或德语一种语言的分别为 y_1, y_2 和 y_3 , 画出的图如右图。

列出下面方程组:

$$\begin{cases} y_1 + 2(4-x) + x + 2 = 13 \\ y_2 + 2(4-x) + x = 9 \\ y_3 + 2(4-x) + x = 10 \\ y_1 + y_2 + y_3 + 3(4-x) + x = 24-5 \end{cases}$$

解得: $x = 1, y_1 = 4, y_2 = 2, y_3 = 3$ 。



59

3.3 有限集合的计数

例3.16 求1到1000之间(包含1和1000在内), 既不能被5和6, 也不能被8整除的数有多少个。

解 设 $S = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \wedge 1 \leq x \leq 1000\}$ $A = \{x \mid$

$x \in S \wedge x$ 可被5整除 $\}$

$B = \{x \mid x \in S \wedge x$ 可被6整除 $\}$

$C = \{x \mid x \in S \wedge x$ 可被8整除 $\}$

$|A| = \text{int}(1000/5) = 200$

$|B| = \text{int}(1000/6) = 166$

$|C| = \text{int}(1000/8) = 125$


$|A \cap B| = \text{int}(1000/\text{lcm}(5,6)) = 33$

$|A \cap C| = \text{int}(1000/\text{lcm}(5,8)) = 25$

$|B \cap C| = \text{int}(1000/\text{lcm}(6,8)) = 41$

$|A \cap B \cap C| = \text{int}(1000/\text{lcm}(5,6,8)) = 8$

$1000 - (150 + 100 + 67 + 25 + 17 + 33 + 8) = 600$



60

3.3 有限集合的计数

(容斥原理) 设S为有穷集, P_1, P_2, \dots, P_m 是m个性质.S中的任何元素x或者具有性质 P_i , 或者不具有性质 $P_i (i=1..m)$, 两种情况必居其一. 令 A_i 表示S中具有性质 P_i 的元素构成的子集, 则S中不具有性质 P_1, P_2, \dots, P_m 的元素数为:

$$\begin{aligned} & |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_m}| \\ &= |S| - \sum_{i=1}^m |A_i| + \sum_{1 \leq i < j \leq m} |A_i \cap A_j| \\ &\quad - \sum_{1 \leq i < j < k \leq m} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \dots + (-1)^m |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m| \end{aligned}$$



61

3.3 有限集合的计数

推论 S中至少具有一条性质的元素数为

$$\begin{aligned} & |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m| \\ &= \sum_{i=1}^m |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq m} |A_i \cap A_j| \\ &\quad + \sum_{1 \leq i < j < k \leq m} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{m-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m| \end{aligned}$$

根据容斥原理, 例3.16中所求的元素数为:

$$\begin{aligned} |\overline{A \cap B \cap C}| &= |S| - (|A| + |B| + |C|) \\ &\quad + (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) - |A \cap B \cap C| \\ &= 1000 - (200 + 166 + 125) + (33 + 25 + 41) - 8 = 600 \end{aligned}$$



62

欧拉函数

❖ 例3.18 求欧拉函数的值

❖ 欧拉函数 ϕ 是数论中的一个重要函数, 设n是正整数, $\phi(n)$ 表示 $\{1, 2, \dots, n\}$ 中与n互素的数的个数. 例如 $\phi(12)=4$, 因为与12互素的数有1, 5, 7, 11. 这里认为 $\phi(1)=1$. 利用容斥原理给出欧拉函数的计算公式.

❖ 分析

(1) 将全集看成为 $\{1, 2, \dots, n\}$

(2) 素因子!

(3) 容斥原理.



63

欧拉函数 (续)

❖ 求素因子

给定正整数n, n的素因子分解式为, $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$

令 $A_i = \{x \mid 1 \leq x \leq n \text{ 且 } p_i \text{ 整除 } x\}, i=1, 2, \dots, k$

则有 $\phi(n) = |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_k}|$

❖ 容斥原理

首先计算 $|A_i| = \frac{n}{p_i}, i=1, 2, \dots, k \quad |A_i \cap A_j| = \frac{n}{p_i p_j}, 1 \leq i < j \leq k$

由容斥原理得

$$\begin{aligned} \phi(n) &= |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_k}| \\ &= n - \left(\frac{n}{p_1} + \frac{n}{p_2} + \dots + \frac{n}{p_k} \right) + \left(\frac{n}{p_1 p_2} + \frac{n}{p_1 p_3} + \dots + \frac{n}{p_{k-1} p_k} \right) - \dots + (-1)^k \left(\frac{n}{p_1 p_2 \dots p_k} \right) \\ &= n \left(1 - \frac{1}{p_1} \right) \left(1 - \frac{1}{p_2} \right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_k} \right) \end{aligned}$$

64

3.3 有限集合的计数

❖ 思考题: 没有时间上学

- “但是我没有时间上学,”埃迪向劝学员解释道,“我一天睡眠8小时,以每天为24小时计,一年中的睡眠时间加起来大约122天。星期六和星期天不上课,一年总共是104天。我们有60天的暑假。我每天用膳要花3小时--一年就要45天以上。我每天至少还得有2小时的娱乐活动--一年就要超过30天。”

埃迪边说边匆匆写下这些数字,然后他把所有的天数加起来。结果是361。

• 星期六和星期天	104
• 暑假	60
• 用膳(一天3小时)	45
• 娱乐(一天2小时)	30
• 总和	361天

- “你瞧,”埃迪接着说,“剩下给我病卧在床的只有4天,我还没有把每年7天的学校假期考虑在内呢!”
- 劝学员摇摇头。“这里有差错,”他咕哝道。但是,他左思右想,也未能发现埃迪的数据有何不准确之处。你能解释错误何在吗?




65

小结

文氏图的作用:

- ① 形象地描述集合之间的关系。
- ② 形象地描述集合的运算。
- ③ 方便地解决有限集的计数问题。



66

作业

- ❖ 补充习题3.2,3.3



67

常见题型分析


- ❖ 判断一个命题或真或假。
- ❖ 判别元素是否属于给定的集合
- ❖ 集合运算。
- ❖ 证明两集合之间的关系：包含关系或集合相等。
- ❖ 有限集合的计数。



68

本章小结

本章主要内容的知识逻辑结构图：



69