

Assignment 1

19/10/2022

Francesco Refolli 865955

1 Esercizio 1

$$\max x_1 + x_2 \quad (1)$$

$$x_1 + x_2 \leq 2 \quad (2)$$


$$2x_1 - x_2 \leq 0 \quad (3)$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \quad (4)$$

Costruisco il grafico con le equazioni dei vincoli lungo l'asse $x_1 \times x_2$.
Riscrivo per comodita' i primi due vincoli in forma equivalente:

$$x_1 \leq 2 - x_2 \quad (5)$$

$$x_1 \leq \frac{x_2}{2} \quad (6)$$



Il vettore del gradiente della funzione obiettivo $g = \langle 1, 1 \rangle$, composto dalle derivate parziali delle componenti della funzione obiettivo, è perpendicolare al vincolo $x_1 \leq 2 - x_2$, quindi il problema ha **Infinite Soluzioni Ottime**. Le soluzioni sono tutte le coppie $\langle x_1, x_2 \rangle$ che risiedono nello spigolo della regione obiettivo su cui si poggia il vincolo $x_1 \leq 2 - x_2$. Ovvero tutti i punti sul segmento delimitato dai punti: $(0, 2)$, $(\frac{2}{3}, \frac{4}{3})$.

2 Esercizio 2

$$\max x_1 + x_2 \quad (7)$$

$$x_1 + x_2 - x_3 = 2 \quad (8)$$

$$2x_1 - x_2 \leq 0 \quad (9)$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \quad (10)$$

$$x_3 \leq 0 \quad (11)$$

Conversione in forma aumentata

1 La forma aumentata non prevede vincoli di non positività, quindi inverte il segno di x_3 in tutti i vincoli:

$$\max x_1 + x_2 \quad (12)$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 2 \quad (13)$$

$$2x_1 - x_2 \leq 0 \quad (14)$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0 \quad (15)$$

2 Aggiungo una variabile di slack x_4 per portare il vincolo \leq in vincolo $=$.

$$\max x_1 + x_2 \quad (16)$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 2 \quad (17)$$

$$2x_1 - x_2 + x_4 = 0 \quad (18)$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \quad (19)$$

3 Quindi esporto la funzione obiettivo $f(x)$ in un vincolo $Z - f(x) = 0$.

$$\max Z \quad (20)$$

$$Z - x_1 - x_2 = 0 \quad (21)$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 2 \quad (22)$$

$$2x_1 - x_2 + x_4 = 0 \quad (23)$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \quad (24)$$

Risoluzione con tableau

base	Z	x_1	x_2	x_3	x_4	b
Z	1	-1	-1	0	0	0
3	0	1	1	1	0	2
4	0	2	-1	0	1	0

iterazione 1 Scelgo la colonna 1 perche' non esiste un coefficiente in prima riga negativo piu' basso.

Scelgo la riga 2 che ha il rapporto minimo.

Ricalcolo la tabella.

Questo ha l'effetto di scambiare x_4 della base con x_1 .

base	Z	x_1	x_2	x_3	x_4	b
Z	1.0	0.0	$-\frac{3}{2}$	0.0	$\frac{1}{2}$	0.0
3	0.0	0.0	$\frac{3}{2}$	1.0	$-\frac{1}{2}$	2.0
1	0.0	1.0	$-\frac{1}{2}$	0.0	$\frac{1}{2}$	0.0

iterazione 2 Scelgo la colonna 2 perche' non esiste un coefficiente in prima riga negativo piu' basso.

Scelgo la riga 1 che ha il rapporto minimo.

Ricalcolo la tabella.

Questo ha l'effetto di scambiare x_3 della base con x_2 .

base	Z	x_1	x_2	x_3	x_4	b
Z	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0
2	0.0	0.0	1.0	$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{4}{3}$
1	0.0	1.0	0.0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

iterazione 3 La prima riga non contiene piu' valori negativi, l'algoritmo del simplesso si arresta.

La soluzione di base corrente e' $\langle x_1, x_2, x_3, x_4 \rangle = \langle \frac{2}{3}, \frac{4}{3}, 0, 0 \rangle$
Quindi una soluzione al problema PL e' $\langle x_1, x_2 \rangle = \langle \frac{2}{3}, \frac{4}{3} \rangle$