


Paciente: Christiany Eler Louzada Silva Vieira
Idade: 43
CPF: 013.632.006-66
Sexo:
Telefone:
Médico: Christiany Eler Louzada Silva Vieira



Resultado da Análise

Hemoglobina: valor extraído 12.0 está ABAIXO do valor ideal (14,0-16,0 g/dL).
Hematócrito: valor extraído 34.3 está ABAIXO do valor ideal (42-48 %).
Leucócitos: valor extraído 7.2 está ACIMA do valor ideal (4 000-6 500/mm³).
Linfócitos: valor extraído 29.0 está dentro do valor ideal (25-35 % dos leucócitos).
Monócitos: valor extraído 6.0 está dentro do valor ideal (3-8 % dos leucócitos).
Eosinófilos: valor extraído 2.0 está ACIMA do valor ideal (< 1 % dos leucócitos).
Basófilos: valor extraído 1.0 está ACIMA do valor ideal (0,0-0,5 % dos leucócitos).
Plaquetas: valor extraído 309.0 está ACIMA do valor ideal (250 000-300 000/mm³).
Insulina: valor extraído 5.7 está dentro do valor ideal (< 6 µIU/mL).

Prescrição

- Biocolin (B2, B3, B5, B6, ZN, SE, Si, B9, Prolina)
Preparo: Diluir conforme orientação do fabricante.
Aplicação: Aplicar 1x por semana por 4 semanas (IM).

- B12 2.500mcg
Preparo: Diluir conforme orientação do fabricante.
Aplicação: Aplicar 1x por semana por 4 semanas (IM).

- Biotina
Preparo: Diluir conforme orientação do fabricante.
Aplicação: Aplicar 1x por semana por 4 semanas (IM).

- B12
Preparo: Diluir conforme orientação do fabricante.
Aplicação: Aplicar 1x por semana por 4 semanas (IM).

- ADEK2 600.000 UI
Preparo: Aplicar intramuscular lento e profundo, usar agulha 0,7x30mm, observando que essa aplicação deve ser realizada no quadrante superior externo do glúteo (não administrar no deltoide).
Observação: Não deixar o óleo retornar, risco de agressão cutânea gerando vermelhidão local.
Aplicação: Aplicar dose única (IM).

- Vitamina D3
Preparo: Aplicar intramuscular lento e profundo, usar agulha 0,7x30mm, observando que essa aplicação deve ser realizada no quadrante superior externo do glúteo (não administrar no deltoide).
Observação: Não deixar o óleo retornar, risco de agressão cutânea gerando vermelhidão local.
Aplicação: Aplicar dose única (IM).

- Immunity
Preparo: Aspirar o líquido na seringa e não ultrapassar 5ml por aplicação. Aplicação em região sadia

do glúteo.

Aplicação: Aplicar 1x por semana por 4 semanas (IM).

- K2MK7

Preparo: Diluir conforme orientação do fabricante.

Aplicação: Aplicar 1x por semana por 4 semanas (IM).

Christiany Eler Louzada Silva Vieira