

Paciente: Christiany Eler Louzada Silva Vieira  
Idade: 43  
CPF: 013.632.006-66  
Sexo:  
Telefone:



## Resultado da Análise

Triglicerídeos: valor 12.0 está dentro do valor ideal ( $< 100$  mg/dL).  
Ureia: valor 12.0 ABAIXO do valor ideal (35-45 mg/dL).  
TSH: valor 12.0 ACIMA do valor ideal (1,0-2,5  $\mu$ IU/mL).  
Ferritina: valor 12.0 ABAIXO do valor ideal (50-150 mcg/L (ideal  $> 70$  mcg/L)).  
Homocisteína: valor 12.0 ACIMA do valor ideal (5-9  $\mu$ mol/L).  
Leucócitos: valor 7.2 ACIMA do valor ideal (4 000-6 500/mm<sup>3</sup>).  
Linfócitos: valor 29.0 está dentro do valor ideal (25-35 % dos leucócitos).  
Monócitos: valor 6.0 está dentro do valor ideal (3-8 % dos leucócitos).  
Eosinófilos: valor 2.0 ACIMA do valor ideal ( $< 1$  % dos leucócitos).  
Basófilos: valor 1.0 ACIMA do valor ideal (0,0-0,5 % dos leucócitos).  
Plaquetas: valor 309.0 ACIMA do valor ideal (250 000-300 000/mm<sup>3</sup>).  
Glicose de jejum: valor 90.0 está dentro do valor ideal (75-90 mg/dL).  
HbA1c: valor 1.0 está dentro do valor ideal ( $< 5,4$  %).  
Insulina: valor 5.7 está dentro do valor ideal ( $< 6$   $\mu$ IU/mL).  
Colesterol Total (CT): valor 7.0 está dentro do valor ideal (0-200 mg/dL).  
Colesterol LDL: valor 12.0 está dentro do valor ideal (0-159 mg/dL).

## Prescrição

- Vitamina C

Preparo: Diluir conforme orientação do fabricante.

Aplicação: Aplicar 1x por semana por 4 semanas (IM).

- Biocolin (B2, B3, B5, B6, ZN, SE, Si, B9, Prolina)

Preparo: Diluir conforme orientação do fabricante.

Aplicação: Aplicar 1x por semana por 4 semanas (IM).

- B12 (IM)

Preparo: Diluir conforme orientação do fabricante.

Aplicação: Aplicar 1x por semana por 4 semanas (IM).

- ADEK2 600.000 UI

Preparo: Aplicar intramuscular lento e profundo, usar agulha 0,7x30mm, observando que essa aplicação deve ser realizada no quadrante superior externo do glúteo (não administrar no deltoide). Observação: Não deixar o óleo retornar, risco de agressão cutânea gerando vermelhidão local.

Aplicação: Aplicar dose única (IM).

- Vitamina D3

Preparo: Aplicar intramuscular lento e profundo, usar agulha 0,7x30mm, observando que essa aplicação deve ser realizada no quadrante superior externo do glúteo (não administrar no

deltoide). Observação: Não deixar o óleo retornar, risco de agressão cutânea gerando vermelhidão local.

Aplicação: Aplicar dose única (IM).

- Same (IM)

Preparo: Diluir conforme orientação do fabricante.

Aplicação: Aplicar 1x por semana por 4 semanas (IM).

- Immunity

Preparo: Aspirar o líquido na seringa e não ultrapassar 5ml por aplicação. Aplicação em região sadia do glúteo.

Aplicação: Aplicar 1x por semana por 4 semanas (IM).

- K2MK7

Preparo: Diluir conforme orientação do fabricante.

Aplicação: Aplicar 1x por semana por 4 semanas (IM).

---

Christiany Eler Louzada Silva Vieira