

Paciente: Christiany Eler Louzada Silva Vieira
Idade: 43
CPF: 013.632.006-66
Sexo:
Telefone:
Médico: Christiany Eler Louzada Silva Vieira



Resultado da Análise

Triglicerídeos: valor 12.0 está dentro do valor ideal (< 100 mg/dL).
Ureia: valor 12.0 ABAIXO do valor ideal (35-45 mg/dL).
TSH: valor 12.0 ACIMA do valor ideal (1,0-2,5 μ IU/mL).
Ferritina: valor 12.0 ABAIXO do valor ideal (50-150 mcg/L (ideal > 70 mcg/L)).
Homocisteína: valor 12.0 ACIMA do valor ideal (5-9 μ mol/L).
Leucócitos: valor 7.2 ACIMA do valor ideal (4 000-6 500/mm³).
Linfócitos: valor 29.0 está dentro do valor ideal (25-35 % dos leucócitos).
Monócitos: valor 6.0 está dentro do valor ideal (3-8 % dos leucócitos).
Eosinófilos: valor 2.0 ACIMA do valor ideal (< 1 % dos leucócitos).
Basófilos: valor 1.0 ACIMA do valor ideal (0,0-0,5 % dos leucócitos).
Plaquetas: valor 309.0 ACIMA do valor ideal (250 000-300 000/mm³).
Glicose de jejum: valor 90.0 está dentro do valor ideal (75-90 mg/dL).
HbA1c: valor 1.0 está dentro do valor ideal ($< 5,4$ %).
Insulina: valor 5.7 está dentro do valor ideal (< 6 μ IU/mL).
Colesterol Total (CT): valor 7.0 está dentro do valor ideal (0-200 mg/dL).
Colesterol LDL: valor 12.0 está dentro do valor ideal (0-159 mg/dL).

Prescrição

- Vitamina C

Preparo: Diluir conforme orientação do fabricante.

Aplicação: Aplicar 1x por semana por 4 semanas (IM).

- Biocolin (B2, B3, B5, B6, ZN, SE, Si, B9, Prolina)

Preparo: Diluir conforme orientação do fabricante.

Aplicação: Aplicar 1x por semana por 4 semanas (IM).

- B12 (IM)

Preparo: Diluir conforme orientação do fabricante.

Aplicação: Aplicar 1x por semana por 4 semanas (IM).

- ADEK2 600.000 UI

Preparo: Aplicar intramuscular lento e profundo, usar agulha 0,7x30mm, observando que essa aplicação deve ser realizada no quadrante superior externo do glúteo (não administrar no deltoide).

Observação: Não deixar o óleo retornar, risco de agressão cutânea gerando vermelhidão local.

Aplicação: Aplicar dose única (IM).

- Vitamina D3

Preparo: Aplicar intramuscular lento e profundo, usar agulha 0,7x30mm, observando que essa aplicação deve ser realizada no quadrante superior externo do glúteo (não administrar no deltoide).

Observação: Não deixar o óleo retornar, risco de agressão cutânea gerando vermelhidão local.

Aplicação: Aplicar dose única (IM).

- Same (IM)

Preparo: Diluir conforme orientação do fabricante.

Aplicação: Aplicar 1x por semana por 4 semanas (IM).

- Immunity

Preparo: Aspirar o líquido na seringa e não ultrapassar 5ml por aplicação. Aplicação em região sadia do glúteo.

Aplicação: Aplicar 1x por semana por 4 semanas (IM).

- K2MK7

Preparo: Diluir conforme orientação do fabricante.

Aplicação: Aplicar 1x por semana por 4 semanas (IM).

Christiany Eler Louzada Silva Vieira