

Paciente:
Idade: 0
CPF:
Sexo: F
Telefone:



Resultado da Análise

Triglicerídeos: valor 20.0 está dentro do valor ideal (< 100 mg/dL).
Ácido Úrico: valor 20.0 ACIMA do valor ideal ($< 3,9$ mg/dL).
Ureia: valor 20.0 ABAIXO do valor ideal (35-45 mg/dL).
TSH: valor 20.0 ACIMA do valor ideal (1,0-2,5 μ IU/mL).
T4 total: valor 4.0 ACIMA do valor ideal (1,5-2,5 mIU/L).
T4 livre: valor 4.0 ACIMA do valor ideal (0,9-1,3 ng/dL).
T3 total: valor 3.0 ABAIXO do valor ideal (120-160 ng/dL).
T3 livre: valor 3.0 está dentro do valor ideal (3,0-3,4 pg/mL).
Hemoglobina: valor 13.5 está dentro do valor ideal (13,5-15,5 g/dL).
VCM: valor 86.7 ABAIXO do valor ideal (88-92 fL).
HCM: valor 29.9 está dentro do valor ideal (27-33 pg/célula).
CHCM: valor 34.4 está dentro do valor ideal (31-35 g/dL).
RDW: valor 12.4 está dentro do valor ideal (11,5-13 %).
Ferritina: valor 20.0 ABAIXO do valor ideal (50-150 mcg/L (ideal > 70 mcg/L)).
Vitamina B12: valor 12.0 ABAIXO do valor ideal (500-900 ng/L).
Ácido Fólico (hemograma): valor 20.0 ACIMA do valor ideal (10-17 ng/mL).
Homocisteína: valor 20.0 ACIMA do valor ideal (5-9 μ mol/L).
Plaquetas: valor 195.0 está dentro do valor ideal (250 000-300 000/mm³).
HbA1c: valor 1.0 está dentro do valor ideal ($< 5,4$ %).
Colesterol Total (CT): valor 202.0 ACIMA do valor ideal (0-200 mg/dL).
HDL: valor 170.0 ACIMA do valor ideal (60-93 mg/dL).
Colesterol LDL: valor 170.0 ACIMA do valor ideal (0-159 mg/dL).

Prescrição

- Trio Detox (IM)

Preparo: Diluir conforme orientação do fabricante.

Aplicação: Aplicar 1x por semana por 4 semanas (IM).

- Coenzima Q10 (IM)

Preparo: Diluir conforme orientação do fabricante.

Aplicação: Aplicar 1x por semana por 4 semanas (IM).

- ADEK2 600.000 UI

Preparo: Aplicar intramuscular lento e profundo, usar agulha 0,7x30mm, observando que essa aplicação deve ser realizada no quadrante superior externo do glúteo (não administrar no deltoide). Observação: Não deixar o óleo retornar, risco de agressão cutânea gerando vermelhidão local.

Aplicação: Aplicar dose única (IM).

- Biocolin (B2, B3, B5, B6, ZN, SE, Si, B9, Prolina)

Preparo: Diluir conforme orientação do fabricante.
Aplicação: Aplicar 1x por semana por 4 semanas (IM).

- Biotina

Preparo: Diluir conforme orientação do fabricante.
Aplicação: Aplicar 1x por semana por 4 semanas (IM).

- B12

Preparo: Diluir conforme orientação do fabricante.
Aplicação: Aplicar 1x por semana por 4 semanas (IM).

- Vitamina C

Preparo: Diluir conforme orientação do fabricante.
Aplicação: Aplicar 1x por semana por 4 semanas (IM).

- B12 (IM)

Preparo: Diluir conforme orientação do fabricante.
Aplicação: Aplicar 1x por semana por 4 semanas (IM).

- B12 2.500mg

Preparo: Diluir conforme orientação do fabricante.
Aplicação: Aplicar 1x por semana por 4 semanas (IM).

- Trio Metilador

Preparo: Diluir conforme orientação do fabricante.
Aplicação: Aplicar 1x por semana por 4 semanas (IM).

- Vitamina D3

Preparo: Aplicar intramuscular lento e profundo, usar agulha 0,7x30mm, observando que essa aplicação deve ser realizada no quadrante superior externo do glúteo (não administrar no deltoide). Observação: Não deixar o óleo retornar, risco de agressão cutânea gerando vermelhidão local.

Aplicação: Aplicar dose única (IM).

- Same (IM)

Preparo: Diluir conforme orientação do fabricante.
Aplicação: Aplicar 1x por semana por 4 semanas (IM).
