

Rapport d'Analyse Éthologique et Climatique

Campagne de Piégeage Printanier 2026

Secteur : La Comté (62150), Hauts-de-France

Période : 06 mars 2026 – 08 avril 2026 | Sujet : *Vespa velutina nigrithorax*

RÉSUMÉ (ABSTRACT)

L'objectif de cette étude est d'analyser la corrélation entre les variables météorologiques (température diurne, précipitations) et la dynamique de sortie d'hivernation des fondatrices de *Vespa velutina*. Sur une période de 34 jours, 50 spécimens ont été neutralisés. Les données mettent en évidence un seuil critique d'activité corrélé à une température moyenne diurne supérieure à 10°C.

1. Méthodologie et Dispositif

Le suivi a été effectué via un réseau de piégeage sélectif sur le secteur de La Comté. Les données ont été consolidées quotidiennement dans un système de gestion de base de données structuré et visualisées via une interface analytique dédiée.

- Variables suivies** : Température moyenne diurne (°C), Précipitations (mm), et Occurrence de captures.
- Indicateur de référence** : Seuil thermique de vol fixé à 10°C.

2. Analyse des Résultats

50

FONDATRICES CAPTURÉES

17.5°C

PIC DE TEMPÉRATURE (08/04)

18

RECORD JOURNALIER

2.1. Phase de Latence (06 mars – 03 avril)

Durant cette période, les températures ont fluctué autour du seuil de 10°C avec des épisodes pluvieux marqués (notamment le 26 mars avec environ 14mm de précipitations).

Les captures restent sporadiques, oscillant entre 0 et 3 individus par jour. L'humidité élevée limite alors les sorties de prospection.

2.2. Phase d'Activation Exponentielle (04 avril – 08 avril)

À partir du 04 avril, une stabilisation des températures au-dessus du seuil critique est observée. Une corrélation positive forte apparaît entre l'augmentation thermique et le volume de captures. Le nombre de captures quotidiennes a progressé de 5 (le 05/04) à un sommet de 18 individus (le 08/04).

3. Discussion Écosystémique

La neutralisation de 50 fondatrices avant la stabilisation des nids primaires représente un impact significatif. En considérant qu'une fondatrice éliminée prévient une colonie potentielle de 2000 à 5000 individus, l'opération réduit drastiquement la population estivale. L'absence de *Vespa crabro* (Frelon européen) dans les dispositifs valide la sélectivité du piégeage.

Conclusion

La campagne démontre une efficacité optimale lors des fenêtres météorologiques sèches avec une température diurne $\geq 13^{\circ}\text{C}$. La prolongation sur le mois d'avril est impérative pour couvrir l'intégralité du cycle de sortie d'hivernation.