

Example 5.5

Q: 设计补偿器 $G_D(s)$

phase margin is 50° w plane

gain margin 10 dB $K_V = 2 \text{ sec}^{-1}$

$T = 0.2 \text{ sec}$

Solution $G_{zas}(z) = z \left\{ \frac{1 - e^{-Ts}}{s} \cdot \frac{k}{s(s+1)} \right\}$

$$= (1 - z^{-1}) z \left\{ \frac{k}{s^2(s+1)} \right\}$$

查表#13 $= (1 - z^{-1}) k \frac{[(T - 1 + e^{-T}) + (1 - e^{-T} - Te^{-T})z^{-1}]z^{-1}}{(1 - z^{-1})^2 (1 - e^{-T}z^{-1})}$

$$= \frac{k [0.01873 + 0.01752 z^{-1}] z^{-1}}{(1 - z^{-1}) (1 - 0.8187 z^{-1})}$$

$$= 0.01873 \frac{k(z + 0.9356)}{(z-1)(z-0.8187)}$$

$$z = \frac{1 + \frac{wT}{2}}{1 - \frac{wT}{2}} = \frac{1 + 0.1w}{1 - 0.1w}$$

$$G_{zas}(w) = G_{zas}(z) \Big|_{z = \frac{1 + 0.1w}{1 - 0.1w}}$$

$$= 0.01873 \frac{k \left(\frac{1 + 0.1w}{1 - 0.1w} + 0.9356 \right)}{\left(\frac{1 + 0.1w}{1 - 0.1w} - 1 \right) \left(\frac{1 + 0.1w}{1 - 0.1w} - 0.8187 \right)}$$

$$\begin{aligned}
 &= 0.01873 \frac{k(1+0.1w+0.9356-0.09356w)(1-0.1w)}{(1+0.1w-1+0.1w)(1+0.1w-0.8187+0.08187w)} \\
 &= 0.01873 \frac{k(0.00644w+1.09356)(1-0.1w)}{0.18187w+0.1813} \\
 &= \frac{k(0.00644w+1.09356)(1-0.1w)}{20.3881w+9.6797} \quad \text{提 } \Delta \text{ 出去} \\
 &\approx \frac{k(\frac{w}{300}+1)(1-\frac{w}{10})}{w(w+1)} \quad ? \text{ 应该是算错了}
 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
 G_D(w) &= \frac{Tw+1}{\alpha Tw+1} \quad 0 < \alpha < 1 \\
 G_O(w)G_{ZAS}(w) &= \frac{Tw+1}{\alpha Tw+1} \frac{k(\frac{w}{300}+1)(1-\frac{w}{10})}{w(w+1)} \\
 &\quad 0.5149 k(0.00644w+1.09356) \quad w(w+1) \quad 0.9966 \\
 &\quad 0.003315w+0.3315 \quad 0.00333 = \frac{1}{300} \approx 1/300
 \end{aligned}$$

$$k_0 = 2 = \lim_{w \rightarrow 0} \{ w [G_D(w) G_{ZAS}(w)] \} = k \quad \text{公式直接代入}$$

$$\text{So } k=2$$

$$G(w) \Rightarrow 2 G_{ZAS}(w) = \frac{2(\frac{w}{300}+1)(1-\frac{w}{10})}{w(w+1)}$$

Bold place



$$\phi = 30^\circ - 30^\circ + \textcircled{8^\circ} = 28^\circ$$

制造 5-10° 都可以

$$\alpha = \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi} = 0.361$$

$$|G(j\omega_g')| = 0.6 \quad 20 \log_{10} |G(j\omega)| = 10 \log \alpha = -4.425 \text{ dB} \quad \pm \text{增益裕度}$$

$$\Rightarrow \omega_g' = 1.7 \text{ rad/s} \quad |G(j\omega)| = 10^{-\frac{4.425}{20}} = \textcircled{0.6} \quad 0.6$$

$\omega_g' = \omega$? ✓

$$\omega_g' = \frac{1}{T} = 1.7 \Rightarrow T = 0.5790$$

$$G_D(\omega) = \frac{T\omega + 1}{\alpha T\omega + 1} = \frac{0.5790\omega + 1}{0.361\omega + 1}$$

$$G_D(z) = G_D(\omega) \Big|_{\omega = \frac{2\pi - 1}{Tz + 1}}$$

$$= \frac{0.9790 \left(\frac{28-1}{0.28+1} \right) + 1}{0.5534 \left(\frac{28-1}{0.28+1} \right) + 1}$$

$$= \frac{2.37988 - 1.9372}{8 - 0.5589}$$

$$|G(j\omega_g')| = 0.6$$

$$|G_{ZAS}(j\omega_g')| = \left| \frac{2 \left(\frac{j\omega}{300} + 1 \right) \left(1 - \frac{j\omega}{10} \right)}{j\omega (j\omega + 1)} \right|$$

$$20 \lg \frac{2 \sqrt{\left(\frac{\omega_g'}{300} \right)^2 + 1} \times \sqrt{1 + \left(\frac{\omega_g'}{10} \right)^2}}{\omega_g' \sqrt{(\omega_g')^2 + 1}} = -4.425$$

幅值公式，参考胡寿松自控

然后用卡西欧求解方程

ALPHA CALC可以打出等号

SHIFT CALC可以要求计算机求解方程

然后填写开始迭代的数据，0或者其他



Thought for 1m 11s

To solve for v_g' in the given equation:

$$20 \log \left(\frac{2 \sqrt{\left(\frac{v_g'}{300}\right)^2 + 1} \times \sqrt{1 + \left(\frac{v_g'}{10}\right)^2}}{v_g' \sqrt{(v_g')^2 + 1}} \right) = -4.425 \text{ dB}$$

We will proceed step by step.

Step 1: Simplify the Equation

Divide both sides by 20 to eliminate the coefficient:

$$\log \left(\frac{2 \sqrt{\left(\frac{v_g'}{300}\right)^2 + 1} \times \sqrt{1 + \left(\frac{v_g'}{10}\right)^2}}{v_g' \sqrt{(v_g')^2 + 1}} \right) = -0.22125$$

Step 2: Remove the Logarithm

Exponentiate both sides to eliminate the logarithm:

$$\frac{2 \sqrt{\left(\frac{v_g'}{300}\right)^2 + 1} \times \sqrt{1 + \left(\frac{v_g'}{10}\right)^2}}{v_g' \sqrt{(v_g')^2 + 1}} = 10^{-0.22125}$$

Calculate $10^{-0.22125}$:

$$10^{-0.22125} \approx 0.6009$$

Step 3: Simplify the Fractions

Let $y = v_g'$. The equation becomes:

$$\frac{2 \sqrt{\left(\frac{y}{300}\right)^2 + 1} \times \sqrt{\left(\frac{y}{10}\right)^2 + 1}}{y \sqrt{y^2 + 1}} = 0.6009$$

Step 4: Square Both Sides to Eliminate Square Roots

$$\left(\frac{2 \sqrt{\left(\frac{y}{300}\right)^2 + 1} \times \sqrt{\left(\frac{y}{10}\right)^2 + 1}}{y \sqrt{y^2 + 1}} \right)^2 = (0.6009)^2$$

Simplify:

$$\frac{4 \left(\left(\frac{y}{300}\right)^2 + 1 \right) \left(\left(\frac{y}{10}\right)^2 + 1 \right)}{y^2 (y^2 + 1)} = 0.3611$$

Step 5: Cross-Multiply and Simplify

Multiply both sides by $y^2(y^2 + 1)$:

$$4 \left(\left(\frac{y}{300}\right)^2 + 1 \right) \left(\left(\frac{y}{10}\right)^2 + 1 \right) = 0.3611 y^2 (y^2 + 1)$$

Simplify the fractions:

$$4 \left(\frac{y^2}{90,000} + 1 \right) \left(\frac{y^2}{100} + 1 \right) = 0.3611 y^2 (y^2 + 1)$$

Step 6: Expand and Simplify Both Sides

Left Side:

$$4 \left(\frac{y^4}{9,000,000} + \frac{901y^2}{90,000} + 1 \right)$$

Right Side:

$$0.3611y^4 + 0.3611y^2$$

Multiply both sides by 2,250,000 to eliminate denominators:

$$y^4 + 90,100y^2 + 9,000,000 = 812,475y^4 + 812,475y^2$$

Step 7: Rearrange the Equation

Bring all terms to one side:

$$(1 - 812,475)y^4 + (90,100 - 812,475)y^2 + 9,000,000 = 0$$

Simplify coefficients:

$$-812,474y^4 - 722,375y^2 + 9,000,000 = 0$$

Multiply through by -1 :

$$812,474y^4 + 722,375y^2 - 9,000,000 = 0$$

Step 8: Solve the Quadratic Equation

Let $z = y^2$:

$$812,474z^2 + 722,375z - 9,000,000 = 0$$

Divide by 812,474:

$$z^2 + 0.889z - 11.08 = 0$$

Use the quadratic formula:

$$z = \frac{-0.889 \pm \sqrt{(0.889)^2 + 4 \times 11.08}}{2}$$

Calculate the discriminant:

$$D = (0.889)^2 + 44.32 \approx 45.11$$

Compute z :

$$z = \frac{-0.889 \pm 6.72}{2}$$

Discard the negative solution (since y^2 can't be negative):

$$z = \frac{5.831}{2} \approx 2.9155$$

So $y^2 = 2.9155$ and $y = \sqrt{2.9155} \approx 1.708$.

Conclusion:

$$v_g' \approx 1.708$$

Answer:

An explicit calculation shows that $v_g' \approx 1.708$

$$20 \log |G(j\omega_g)| = 10 \log a = -4.425 \text{ dB}$$

$$|G(j\omega_g)| = 10^{\frac{-4.425}{20}} = 0.6008$$

$$G(j\omega_g) = \frac{2 \left(\frac{j\omega_g}{300} + 1 \right) \left(1 - \frac{j\omega_g}{10} \right)}{j\omega_g (1 + j\omega_g)}$$

$$|G(j\omega_g)|^2 = 0.6008^2 = 0.361$$

$$= \frac{4 \left(1 + \frac{\omega_g^2}{90000} \right) \left(1 + \frac{\omega_g^2}{100} \right)}{\omega_g^2 (1 + \omega_g^2)}$$

$$\omega_g^2 = x$$

$$|G(j\omega_g)|^2 = \frac{4 \left(1 + \frac{x}{90000} \right) \left(1 + \frac{x}{100} \right)}{x(1+x)} = 0.361$$

$$4 \left(1 + \frac{x}{100} + \frac{x}{90000} + \frac{x^2}{9000000} \right) = 0.361x + 0.361x^2$$

$$\downarrow$$

$$\cancel{x_1} = 0.3609x^2 + 0.3209x - 4 = 0$$

$$x_1 = 2.91373$$

$$x_2 = -3.8228 \quad \times$$

$$\omega_g = \sqrt{x_1} = 1.7069$$