

22-S1-Q2

Q: (a) transportation model

$$50 + 180 + 280 + 270 = 780$$

$$100 + 200 + 180 + 300 = 780$$

no virtual supply

Solution ① draw

Solution ① draw

		demand period				production capacity $U_i$	row diff	
		3	4	5	6			
Production period	3	40	50	40.5	41	41.5	50	0.5
	4	42	40	40.5	41		180	0.5
	5	44	42	40	40.5		280	0.5
	6	46	44	42	40		270	2
Demand $V_j$		100	200	180	300			

col diff 2 0.5 0.5 0.5

col with largest penalty

② get base solution

2) get base solution

	3	4	5	6	supply	col diff
3	40	40.5	41	41.5	0	
4	42	40	40.5	41	130	0.5
5	44	42	40	40.5	280	0.5
6	46	44	42	40	270	2
demand	0	200	180	300		
	2	2	0.5	0.5		

↑  
max

	3	4	5	6	supply	rol diff
3	40 (50)	40.5	41	41.5	0	
4	42 (50)	40 (130)	40.5	41	0	0.5
5	44	42	40	40.5	280	0.5
6	46	44	42	40	270	2
demand	0	70	180	300		
	2	0.5	0.5			

	3	4	5	6	supply	rol diff
3	40 (50)	40.5	41	41.5	0	
4	42 (50)	40 (130)	40.5	41	0	
5	44	42 (70)	40	40.5	210	0.5
6	46	44	42	40	270	2
demand	0	0	180	300		
	2	2	0.5			
	4					
	max					

	3	4	5	6	supply	rol diff
3	40 (50)	40.5	41	41.5	0	
4	42 (50)	40 (130)	40.5	41	0	
5	44	42 (70)	40 (180)	40.5	30	0.5
6	46	44	42	40	270	2
demand	0	0	0	300		

2 0.5  
↑  
max

	3	4	5	6	supply
3	40 (50)	40.5	41	41.5	0
4	42 (50)	40 (130)	40.5	41	0
5	44	42 (70)	40 (180)	40.5 (30)	0
6	46	44	42	40 (270)	0
demand	0	0	0	0	

50

	3	4	5	6	supply
3	40 (50)	40.5	41	41.5	50
4	42 (50)	40 (130)	40.5	41	180
5	44	42 (70)	40 (180)	40.5 (30)	280
6	46	44	42	40 (270)	270
demand	100	200	180	300	

③ test optimal

	3	4	5	6	supply	$u_i$
3	40 (50)	40.5 2.5	41 5	41.5 5	50	-4
4	42 (50)	40 (130)	40.5 2.5	41 2.5	180	-2
5	44 0	42 (70)	40 (180)	40.5 (30)	280	0
6	46 2.5	44 2.5	42 2.5	40 (270)	270	-0.5
demand	100	200	180	300		

$v_i$  44 42 40 40.5

So, the solution is optimal

(b) L?

Solution

$$\textcircled{1} L = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + \lambda_1 (x_1 + x_2 + 3x_3 - 2) + \lambda_2 (5x_1 + 2x_2 + x_3 - 5)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = 2x_1 + \lambda_1 + 5\lambda_2 = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = 2x_2 + \lambda_1 + 2\lambda_2 = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_3} = 2x_3 + 3\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \quad (3)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_1} = x_1 + x_2 + 3x_3 - 2 = 0 \quad (4)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_2} = 5x_1 + 2x_2 + x_3 - 5 = 0 \quad (5)$$

Solve the equation using Casio only 4个未知数

from (3)  $\lambda_2 = 2x_3 + 3\lambda_1$  代入 (1) (2)

$$2x_1 + \lambda_1 + 5(2x_3 + 3\lambda_1) = 2x_1 + 10x_3 + 16\lambda_1 = 0$$

$$2x_2 + \lambda_1 + 2(2x_3 + 3\lambda_1) = 2x_2 + \lambda_1 + 4x_3 + 6\lambda_1$$

$$= 2x_2 + 4x_3 + 7\lambda_1 = 0$$

Casio solve

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 10 & 16 \\ 2 & 0 & 4 & 7 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \\ 5 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{1}{12} = -0.08333 \\ x_2 = \frac{17}{6} = 2.8333 \\ x_3 = -\frac{1}{4} = -0.25 \\ \lambda_1 = \frac{1}{6} = 0.1667 \\ \lambda_2 = 0 \end{cases}$$

$$\lambda_2 = 2x_3 + 3\lambda_1$$

$$= 2x(-\frac{1}{4}) + 3 \times \frac{1}{6}$$

$$= 0$$

$$x = [-\frac{1}{12} \quad \frac{17}{6} \quad -\frac{1}{4}]$$

② test optimal

$$\nabla h(x) = [1 \quad 1 \quad 3]$$

$$\nabla h(x)Y = y_1 + y_2 + 3y_3 = 0$$

$$Z = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = \frac{583}{72}$$

$$= 8.0972$$

$$\nabla^2 L_{xx}(x, \lambda) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 L}{\partial x_1 \partial x_1} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_1 \partial x_3} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_2 \partial x_2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_2 \partial x_3} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial x_3 \partial x_1} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_3 \partial x_2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_3 \partial x_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

positive - definite

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = 2x_1 + \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \quad \frac{\partial L}{\partial x_1 \partial x_1} = 2$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = 2x_2 + \lambda_1 + 2\lambda_2 = 0 \quad \frac{\partial L}{\partial x_2 \partial x_2} = 2$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_3} = 2x_3 + 3\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \quad \frac{\partial L}{\partial x_3 \partial x_3} = 2$$

$$Y^T \nabla_{xx}^2 L Y = [y_1 \ y_2 \ y_3] \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

$$= [2y_1 \ 2y_2 \ 2y_3] \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

$$= 2y_1^2 + 2y_2^2 + 2y_3^2 > 0 \quad \forall Y \neq 0$$

So  $x = \left[-\frac{1}{12} \ \frac{17}{6} \ -\frac{1}{4}\right]$  is a minimum point

$$Z^* = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = \frac{583}{72}$$

$$= 8.0972$$