

## Contents

<b>1</b>	<b>Orthogonality and determinant</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Polynomial derivation</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Binomial theorem</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Linear regression</b>	<b>6</b>

# 1 Orthogonality and determinant

## Orthogonality

To prove:  $\vec{v}_1 \perp \vec{v}_2 \Leftrightarrow \vec{v}_1 * \vec{v}_2 = 0$  :

Be  $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = |\vec{v}_1| \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$ ,  $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = |\vec{v}_2| \begin{pmatrix} \cos \beta \\ \sin \beta \end{pmatrix}$  with  $\alpha = \angle \vec{v}_1$ ,  $\beta = \angle \vec{v}_2$

$$\vec{v}_1 * \vec{v}_2 = |\vec{v}_1| \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} |\vec{v}_2| \begin{pmatrix} \cos \beta \\ \sin \beta \end{pmatrix} = |\vec{v}_1| |\vec{v}_2| (\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta) = \underline{\underline{|\vec{v}_1| |\vec{v}_2| \cos(\alpha - \beta)}}.$$

Be  $\vec{v}_1 \perp \vec{v}_2 \Leftrightarrow \alpha = \beta + \frac{\pi}{2}$ , w.l.o.g.

$$\Rightarrow |\vec{v}_1| |\vec{v}_2| \cos(\alpha - \beta) = |\vec{v}_1| |\vec{v}_2| \cos(\beta + \frac{\pi}{2} - \beta) = 0$$

□

## Determinant

Let's choose  $\sin()$  instead of  $\cos()$  in the above equation:

$$\begin{aligned} |\vec{v}_1| |\vec{v}_2| \sin(\alpha - \beta) &= |\vec{v}_1| |\vec{v}_2| (\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta) \\ &= |\vec{v}_1| |\vec{v}_2| \begin{pmatrix} \sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \beta \\ -\sin \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |\vec{v}_1| \sin \alpha \\ |\vec{v}_1| \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} |\vec{v}_2| \cos \beta \\ -|\vec{v}_2| \sin \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ x_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ -y_2 \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} x_2 & x_1 \\ y_2 & y_1 \end{pmatrix} = \underline{\underline{\det \begin{pmatrix} \vec{v}_2 & \vec{v}_1 \end{pmatrix}}}. \end{aligned}$$

If  $\alpha = \beta + k * \pi$ , w.l.o.g,  $k \in \mathbb{N}$

$$\Rightarrow \det \begin{pmatrix} \vec{v}_2 & \vec{v}_1 \end{pmatrix} = |\vec{v}_1| |\vec{v}_2| \sin(\alpha - \beta) = |\vec{v}_1| |\vec{v}_2| \sin(\beta + k * \pi - \beta) = 0$$

$\Rightarrow \vec{v}_1$  and  $\vec{v}_2$  are linear dependent and the determinant in general determines linear dependency.

## 2 Polynomial derivation

To prove:  $(x^n)' = nx^{n-1}$

$$\begin{aligned}
& \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\
&= \frac{(x + \Delta x)^n - x^n}{\Delta x} \\
&= \frac{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (x^{n-k} \Delta x^k) - x^n}{\Delta x} \\
&= \frac{x^n \Delta x^0 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} (x^{n-k} \Delta x^k) - x^n}{\Delta x} \\
&= \frac{\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} (x^{n-k} \Delta x^k)}{\Delta x} \\
&= \frac{\Delta x \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} (x^{n-k} \Delta x^{k-1})}{\Delta x} \\
&= \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} (x^{n-k} \Delta x^{k-1}) \\
&= \sum_{k=1}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} (x^{n-k} \Delta x^{k-1}) \\
&= nx^{n-1} + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} (x^{n-k} \Delta x^k) \\
&\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left( nx^{n-1} + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} (x^{n-k} \Delta x^k) \right) = nx^{n-1}
\end{aligned}$$

□

### 3 Binomial theorem

To prove:  $(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (x^{n-k} y^k)$

Induction:

$n = 0$ :

$$(x + y)^0 = 1 = \sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} (x^{0-k} y^k)$$

$n \rightarrow n + 1$ :

$$\begin{aligned} (x + y)^{n+1} &= (x + y)^n (x + y) \stackrel{\text{i.p.}}{=} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (x^{n-k} y^k) (x + y) \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (x^{n+1-k} y^k) + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (x^{n-k} y^{k+1}) \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (x^{n+1-k} y^k) + \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} (x^{n+1-k} y^k) \\ &= \binom{n}{0} x^{n+1} y^0 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} (x^{n+1-k} y^k) + \binom{n}{n} x^0 y^{n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} (x^{n+1-k} y^k) \\ &= \binom{n+1}{0} x^{n+1} y^0 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} (x^{n+1-k} y^k) + \binom{n+1}{n+1} x^0 y^{n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} (x^{n+1-k} y^k) \\ &= \binom{n+1}{0} x^{n+1} y^0 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} (x^{n+1-k} y^k) + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} (x^{n+1-k} y^k) + \binom{n+1}{n+1} x^0 y^{n+1} \\ &=^* \binom{n+1}{0} x^{n+1} y^0 + \sum_{k=1}^n \left( \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right) (x^{n+1-k} y^k) + \binom{n+1}{n+1} x^0 y^{n+1} \\ &= \binom{n+1}{0} x^{n+1} y^0 + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} (x^{n+1-k} y^k) + \binom{n+1}{n+1} x^0 y^{n+1} \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} (x^{n+1-k} y^k) \end{aligned}$$

□

\*

$$\begin{aligned}
 \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} + \frac{n!}{k!(n-k)!} \\
 &= \frac{n!k}{k!(n-k+1)!} + \frac{n!(n-k+1)}{k!(n-k+1)!} \\
 &= \frac{n!k + n!(n-k+1)}{k!(n+1-k)!} \\
 &= \frac{n!(k+n+1-k)}{k!(n+1-k)!} \\
 &= \frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!} \\
 &= \underline{\underline{\binom{n+1}{k}}}
 \end{aligned}$$

## 4 Linear regression

measured values  $x_i, y_i \mid 1 \leq i \leq n, n \in \mathbb{N}$

regression line:  $y = mx + b$

minimize error by calculating least squares

$$S = \sum_{i=1}^n (y_i - (mx_i + b))^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - mx_i - b)^2$$

set  $\frac{\partial S}{\partial m} = 0$  :

$$\frac{\partial S}{\partial m} = -2 \sum_{i=0}^n (y_i - mx_i - b)x_i = 0$$

$$\Longleftrightarrow 0 = \sum_{i=0}^n (y_i - mx_i - b)x_i = \sum_{i=0}^n (x_i y_i - mx_i x_i - bx_i)$$

$$= \sum_{i=0}^n x_i y_i - m \sum_{i=0}^n x_i x_i - b \sum_{i=0}^n x_i \quad : \text{I}$$

set  $\frac{\partial S}{\partial b} = 0$  :

$$\frac{\partial S}{\partial b} = -2 \sum_{i=0}^n (y_i - mx_i - b) = 0$$

$$\Longleftrightarrow 0 = \sum_{i=0}^n (y_i - mx_i - b) = \sum_{i=0}^n (y_i - mx_i - b) = \sum_{i=0}^n y_i - m \sum_{i=0}^n x_i - nb$$

$$\Longleftrightarrow b = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n y_i - m \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n x_i = y_M - mx_M \quad : \text{II}$$

II in I:

$$\begin{aligned}
0 &= \sum_{i=0}^n x_i y_i - m \sum_{i=0}^n x_i x_i - b \sum_{i=0}^n x_i = \sum_{i=0}^n x_i y_i - m \sum_{i=0}^n x_i x_i - (y_M - m x_M) \sum_{i=0}^n x_i \\
&= \sum_{i=0}^n x_i y_i - m \sum_{i=0}^n x_i x_i - y_M \sum_{i=0}^n x_i + m x_M \sum_{i=0}^n x_i \\
&\iff m \left( \sum_{i=0}^n x_i x_i - x_M \sum_{i=0}^n x_i \right) = \sum_{i=0}^n x_i y_i - y_M \sum_{i=0}^n x_i \\
&\iff m = \frac{\sum_{i=0}^n x_i y_i - y_M \sum_{i=0}^n x_i}{\sum_{i=0}^n x_i x_i - x_M \sum_{i=0}^n x_i} \\
&= \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=0}^n x_i y_i - y_M x_M}{\frac{1}{n} \sum_{i=0}^n x_i x_i - x_M x_M} \\
&=^* \frac{CoVar(x, y)}{Var(x)}
\end{aligned}$$

□