

广东海洋大学 08—09 学年第二学期

《概率论与数理统计》课程试题（答案）

课程号： 192004

√ 考试
□ 考查√ A 卷
□ B 卷√ 闭卷
□ 开卷

题 号	一	二	三	四	五	总分	阅卷教师
各题分数	45	10	21	14	10	100	
实得分数							

一. 填空题（每题 3 分，共 45 分）

1. 袋中有 5 个白球，4 个红球，在其中任取 4 个。则事件：4 个球中恰有 2 个白球 2 个红球的概率为 10/21。

2. $P(B) = 0.3, P(AB) = 0.1, P(A|B) = \underline{1/3}$ 。

3. 甲乙两人进球的概率依次为 0.8、0.7，现各投一球，各人进球与否相互独立。至少有一人进球的概率为： 0.94。

4. 一批产品的次品率 10%，从中任取 5 件，以 X 表示其中次品的件数，则 X 的概率分布为：

$$\underline{\binom{5}{k} 0.1^k 0.9^{5-k} \quad k = 0, 1, \dots, 5}$$

5. $X \sim \pi(2), P\{X = 10\} / P\{X = 9\} = \underline{1/5}$ 。

6. $X \sim$ （密度函数） $f(x) = \begin{cases} 3x^2 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, $P\{X \leq 1/2\} = \underline{1/8}$ 。

7. （分布函数） $F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ x & 0 < x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$, （密度函数） $f(x) = \underline{\begin{cases} 1 & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}}$ 。

8. (X, Y) 服从在区域 G 上的均匀分布，其中 G 由直角坐标平面 oxy 上的

$$x = 0, x = 1, y = 0, y = 1$$

围成。则其联合密度 $f(x, y) = \underline{\begin{cases} 1 & (x, y) \in G \\ 0 & (x, y) \notin G \end{cases}}$ 。

9. $X \sim N(0, 1)$, 比较大小： $P\{X > 2\} \underline{>} P\{X < -3\}$ 。

10. $E(X)=0, E(X^2)=1, D(X)=$ 1。

11. $T \sim t(n), P\{T \leq 0\} =$ 0.5。

12. 设总体 $X \sim N(75, 100)$, X_1, X_2, \dots, X_n 是来自 X 的样本, 则 $P\{X_1 > 75\} =$ 0.5。

13. X_1, X_2, X_3, X_4 为取自总体 X 的样本, X 的均值的估计量

$$T_1 = (X_1 + X_2)/6 + (X_3 + X_4)/3, \quad T_2 = (X_1 + X_2 + X_3 + X_4)/4$$

较有效的是 T_2 。

14. 以 X 表示某小包装糖果的重量 (以 g 计), 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ 未知, 今取得 16 袋, 实测得样本均值 $\bar{x} = 100$, 样本标准差 $s = 4$, 则 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间是 (100 ± 2.1315) 。

$$\alpha = 0.05 \quad t_{\alpha/2}(15) = 2.1315 \quad t_{\alpha/2}(16) = 2.1199 \quad t_{\alpha/2}(17) = 2.1098$$

15. $F_{0.05}(6, 10) = 3.22, \quad F_{0.95}(10, 6) =$ $1/3.22$ 。

二. (10 分) 连续投掷一枚均匀的硬币, 以 X 表示投掷的次数, 就下列两种情况求 X 的分布律:

- (1) 直到出现正面为止;
- (2) 直到正面出现两次为止。

解 (1) 记 A_i 表示第 i 次正面向上, $P(A_i) = P(\overline{A_i}) = 0.5$

$\{X = k\}$ 即 $\overline{A_1} \overline{A_2} \dots \overline{A_{k-1}} A_k$, 由独立性

$$\begin{aligned} P\{X = k\} &= P(\overline{A_1} \overline{A_2} \dots \overline{A_{k-1}} A_k) = P(\overline{A_1}) P(\overline{A_2}) \dots P(\overline{A_{k-1}}) P(A_k) \\ &= 0.5^k, k = 1, 2, 3, \dots \end{aligned} \quad \dots (5 \text{分})$$

(2) $\{X = k\}$ 即: 前 $k-1$ 次有一次正面向上而第 k 次正面向上,

记事件: 前 $k-1$ 次有一次正面向上为 B , 由二项分布公式

$$P(B) = C_{k-1}^1 0.5^{k-2} \times 0.5 = (k-1) 0.5^{k-1}$$

由独立性

$$P\{X = k\} = P(B) P(A_k) = (k-1) 0.5^k, k = 2, 3, 4, \dots \quad \dots (5 \text{分})$$

三. (21 分) (X, Y) 的联合分布律如下:

$X \backslash Y$	-1	1	2
-1	c	$2/10$	$3/10$
2	$2/10$	$1/10$	$1/10$

- (1) 确定常数 c ; (2) 求边缘概率分布并判断 X, Y 的独立性; (3) 求 $E(X+Y)$;
 (4) 求 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布律。

解

(1) $c + 2/10 + 3/10 + 2/10 + 1/10 + 1/10 = 1$, 得 $c = 1/10$ (3 分)

(2) 边缘分布如下:

$X \backslash Y$	-1	1	2	$p_{i.}$
-1	$1/10$	$2/10$	$3/10$	$6/10$
2	$2/10$	$1/10$	$1/10$	$4/10$
$p_{.j}$	$3/10$	$3/10$	$4/10$	

由 $P\{X = -1, Y = -1\} = 1/10 \neq P\{X = -1\}P\{Y = -1\} = (6/10) \times (3/10) = 18/100$

可知, X, Y 不相互独立。 (6 分)

(3) 由 (2) 可知 $E(X) = -1 \times 6/10 + 2 \times 4/10 = 1/5$

$E(Y) = -1 \times 3/10 + 3/10 + 2 \times 4/10 = 4/5$

$E(X+Y) = E(X) + E(Y) = 1$ (6 分)

(4)

$P\{Z = -1\} = P\{(X, Y) = (-1, -1)\} = 1/10$

$P\{Z = 1\} = P\{(X, Y) = (-1, 1)\} = 2/10$

$P\{Z = 2\} = 1 - P\{Z = -1\} - P\{Z = 1\} = 7/10$

Z	-1	1	2
P	$1/10$	$2/10$	$7/10$

(6 分)

四. (14 分) 设总体 X 具有概率密度,

$$f(x) = \begin{cases} \theta e^{-\theta x}, & x > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

参数 θ 未知, X_1, X_2, \dots, X_n 是来自 X 的样本, 验证 $f(x)$ 是密度函数并求 θ 的最大似然估计量。

解 (1) $f(x) \geq 0$;

$$\text{且 } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^{+\infty} \theta e^{-\theta x} dx = 1 \quad \dots(6\text{分})$$

$$(2) \text{ 似然函数 } L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \theta^n \exp\left\{-\theta \sum_{i=1}^n x_i\right\} \quad x_i > 0$$

$$\text{对数似然函数 } \ln L(\theta) = \ln \prod_{i=1}^n f(x_i) = n \ln \theta - \theta \sum_{i=1}^n x_i \quad x_i > 0 \quad \dots(4\text{分})$$

$$\text{令 } \frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = \frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^n x_i = 0$$

$$\text{得 } \theta = 1/\bar{x}$$

$$\text{从而 } \hat{\theta} = 1/\bar{X} \quad \dots(4\text{分})$$

五.. (10 分) 某工厂生产金属丝, 其产品的折断力 X 服从正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ μ, σ^2

未知, 工厂声称其产品的标准差不高于 8 (以 kg 计), 现抽取 10 根做测试, 得数据如下:

$$s^2 = 75$$

试取 $\alpha = 0.05$ 进行检验。 ($\chi_{0.05}^2(9) = 16.919$ $\chi_{0.05}^2(10) = 18.307$)

$$\text{解 } H_0: \sigma \leq \sigma_0 = 8, H_1: \sigma > \sigma_0 = 8, \quad \dots(2\text{分})$$

$$\chi^2 = (n-1)S^2 / \sigma^2 \sim \chi^2(n-1),$$

$$\text{当 } H_0 \text{ 成立时, } (n-1)S^2 / \sigma^2 > (n-1)S^2 / \sigma_0^2$$

$$\text{从而 } P\{(n-1)S^2 / \sigma_0^2 > \chi_{\alpha}^2(n-1)\} \leq P\{(n-1)S^2 / \sigma^2 > \chi_{\alpha}^2(n-1)\} = \alpha$$

$$\text{得 } H_0 \text{ 的拒绝域: } \chi^2 = 9S^2 / 8^2 > 16.919 \quad \dots(6\text{分})$$

代入 $s^2 = 75$ 得 $\chi^2 = 9s^2 / 8^2 = 10.5 < 16.919$ 。不能拒绝 H_0 , 故接受工厂的声明。

$$\dots(2\text{分})$$