

《概率论与数理统计》课程试题

课程代码：19221302

☒ 考试
☐ 考查

☐ A 卷
☐ C 卷
☐ E 卷

☒ B 卷
☐ D 卷
☐ F 卷

☒ 闭卷
☐ 开卷

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	阅卷教师
各题分数	30	12	10	15	15	18						
实得分数												

一. 填空题（每题 3 分，共 30 分）

1. 设 A, B, C 为三个随机事件，则 “ A, B, C 中不多于一个发生” 用 A, B, C 的运算关系表示事件为 $\overline{A \cap B \cap C}$ 。
2. 设事件 A, B ， $P(A)=1/2, P(B)=1/3, P(A \cup B)=2/3$ ，则 $P(A - B)=1/3$ 。
3. 5 把钥匙中有 2 把能打开门，挨个测试，恰好第三次打开门的概率是 $3/20$ 。
4. 设 X 服从区间 (a, b) 上的均匀分布，则 X 的数学期望等于 $(a+b)/2$ 。
5. 若随机变量 X 服从均值为 2，方差为 σ^2 的正态分布，且 $P\{0 < X < 4\} = 0.6$ ，则 $P\{X < 0\} =$ 0.2 。
6. 设随机变量 X 服从二项分布，即 $X \sim B(n, p)$ ，且 $EX = 3, p = 1/7$ ，则 $n =$ 21 。
7. 随机变量 ξ 的密度函数为 $\phi(x) = \begin{cases} cx & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ 则 $c =$ 2 。
8. 若二维随机变量 (X, Y) 的联合概率分布为

	Y	-1	0	1
X	-1	0.08	a	0.12
	1	0.12	b	0.18

，且 X 与 Y 相互独立，则 $a =$ 0.2 。
9. 已知随机变量 X ， $E(X) = 7300$ ，标准差是 700。利用切比雪夫不等式估计 $P\{5200 \leq X \leq 9400\}$ $8/9$ 。
10. X_1, X_2, X_3 是总体 X 的样本， $\hat{\mu}_1 = \frac{1}{4}(X_1 + aX_2 + X_3)$ 是体均值的两个无偏估计，则 $a =$ 2 。

二、发报机分别以概率 0.6 和 0.4 发出信号“0”和“1”，由于通信系统受到干扰，当发报机发出信号“0”时，接报机分别以概率 0.8 和概率 0.2 收到“0”和“1”；当发报机发出信号“1”时，接报机分别以概率 0.9 和 0.1 收到“1”和“0”。求：

(1) 接报机收到“1”的概率。(5 分)

(2) 当接报机收到“1”时，发报机发出信号是“1”的概率。(7 分)

解：(1) 设： A_1 发送“0”， A_2 发送“1”； B_1 接收“0”， B_2 发送“1”

$$P\{A_1\}=0.6, P\{A_2\}=0.4, P\{B_1|A_1\}=0.8, P\{B_2|A_1\}=0.2$$

$$P\{B_1|A_2\}=0.1, P\{B_2|A_2\}=0.9 \quad (3 \text{ 分})$$

$$P\{B_2\}=P\{B_2|A_1\}P\{A_1\}+P\{B_2|A_2\}P\{A_2\}=0.48 \quad (5 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} & P\{A_2|B_2\} \\ &= P\{B_2A_2\}/P\{B_2\} \quad (1 \text{ 分}) \\ (2) &= P\{B_2|A_2\}P\{A_2\}/P\{B_2\} \quad (5 \text{ 分}) \\ &= 0.75 \quad (7 \text{ 分}) \end{aligned}$$

三、甲、乙两台机器一天中出现次品的概率分布分别为

X	0	1	2	3	Y	0	1	2	3
P	0.4	0.3	0.2	0.1	P	0.3	0.5	0.2	0

若两台机器的日产量相同，问哪台机器较好？(10 分)

$$\text{解： } E(X)=0\times 0.4+1\times 0.3+2\times 0.2+3\times 0.1=1$$

$$E(Y)=0\times 0.3+1\times 0.5+2\times 0.2+3\times 0=0.9 \quad (4 \text{ 分})$$

$$E(X^2)=0\times 0.4+1\times 0.3+4\times 0.2+9\times 0.1=2$$

$$E(Y^2)=0\times 0.3+1\times 0.5+4\times 0.2+9\times 0=1.3$$

$$D(X)=E(X^2)-E^2(X)=1 \quad D(Y)=E(Y^2)-E^2(Y)=0.49 \quad (9 \text{ 分})$$

$E(Y)<E(X), D(Y)<D(X)$ ，乙的期望小并且更稳定，所以机器乙更好 (10 分)

四、设二维随机变量 (X, Y) 具有概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} cxy, & 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

(1) 求常数 c ; (5 分) (2) 求出 (X, Y) 关于 X 和关于 Y 的边缘概率密度; (5 分)

(3) 求概率 $P\{Y \leq \frac{X}{2}\}$. (5 分)

解: (1) $\int_0^2 \int_0^3 f(x, y) dx dy = \int_0^2 \int_0^3 cxy dx dy = 1$ (2分)

解得 $c=1/9$ (5 分)

(2) $f_X(x) = \int_0^2 \frac{xy}{9} dy = \frac{2x}{9}, 3 > x > 0$ (3 分)

$f_Y(y) = \int_0^3 \frac{xy}{9} dx = \frac{y}{2}, 2 > y > 0$ (5 分)

(3) $P\{Y \leq \frac{X}{2}\} = \int_0^3 \int_0^{x/2} \frac{1}{9} xy dy dx$ (2分)
 $= 1/8$ (5分)

五、某系统由 100 个相互独立的部件组成, 每个部件损坏的概率为 0.1。要使整个系统起作用, 必须至少有 85 个部件正常工作。求该系统能正常工作的概率。

($\Phi(1.67) = 0.9525$) (15 分)

$E(Y) = 100 * 0.9 = 90$ (2分)

$D(Y) = 100 * 0.9 * 0.1 = 9$ (4分)

$Y \sim N(90, 9)$ (6分)

解: $P(Y > 85) = P(\frac{Y-90}{3} > \frac{85-90}{3})$ (10分)

$= 1 - \Phi(-1.67) = 2\Phi(1.67) - 1$ (13分)

$= 0.905$ (15分)

六、设总体 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$(1-2\theta)$

其中 θ ($0 < \theta \leq \frac{1}{2}$) 是未知参数，利用总体 X 的如下样本值：3, 1, 3, 0, 3, 1,

2, 3, 求 θ 的矩估计值和最大似然估计值。(18 分)

$$E(X) = 0 \times \theta^2 + 1 \times 2\theta(1-\theta) + 2 \times \theta^2 + 3 \times (1-2\theta) = 3 - 4\theta \quad (4\text{分})$$

解：矩估计法：
$$= \frac{3+1+3+0+3+1+2+3}{8} = 2 \quad (6\text{分})$$

$$\theta = 1/4 \quad (8\text{分})$$

最大似然估计法： $L(\theta) = 4\theta^2(1-\theta)^2(1-2\theta)^2$ (3 分)

$$\ln L(\theta) = \ln 4\theta^2(1-\theta)^2(1-2\theta)^2 \quad (6\text{分})$$

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{24\theta^2 - 28\theta + 6}{\theta(1-\theta)(1-2\theta)} = 0 \quad (10\text{分})$$

$$\text{解得 } \theta = \frac{7-\sqrt{13}}{12} \quad (12\text{分})$$