
Samlefil for alle data til prøveeksamen


Filen 1A/Oppgave1AFigur_A.png

Figure 1: Figur fra filen 1A/Oppgave1AFigur_A.png




$Filen~1A/Oppgave1AFigur_B.png$

Figure 2: Figur fra filen 1A/Oppgave1AFigur_B.png




$Filen~1A/Oppgave1AFigur_C.png$

Figure 3: Figur fra filen 1A/Oppgave1AFigur_C.png




$Filen~1A/Oppgave1AFigur_D.png$

Figure 4: Figur fra filen 1A/Oppgave1AFigur_D.png



$Filen~1A/Oppgave1AFigur_E.png$


Figure 5: Figur fra filen 1A/Oppgave1AFigur_E.png



Filen 1B.txt Luminositeten øker med en faktor 9.80e+09.

Filen 1C.png

Figure 6: Figur fra filen 1C.png



Filen 1E.png




Figure 7: Figur fra filen 1E.png

Filen 1G.txt

STJERNE A) Stjerna har en overflatetemperatur på 10000K. Radiusen er betydelig mindre enn solas radius

STJERNE B) massen til stjerna er 8 solmasser og den fusjonerer hydrogen i kjernen

STJERNE C) stjernas luminositet er 10 ganger solas luminositet og den

fusjonerer hydrogen til helium i kjernen

STJERNE D) massen til stjerna er 0.7 solmasser og den fusjonerer hydrogen i kjernen

STJERNE E) radiusen er en hundredel av solens radius og gassen i stjerna er elektrondegenerert

Filen 1H.png




Figure 8: Figur fra filen 1H.png

Filen 1J.txt

Kjernen i stjerne A har massetet
thet 1.721e+06 kg/m $\hat{3}$ og temperatur 16 millioner K.

Kjernen i stjerne B har massetet
thet 9.379e+06 kg/m3̂ og temperatur 18 millioner K.

Kjernen i stjerne C har massetet
thet $8.113e+06~\mathrm{kg/m3}$ og temperatur 38

millioner K.

Kjernen i stjerne D har massetet
thet $4.053\mathrm{e} + 06~\mathrm{kg/m}\hat{3}$ og temperatur 21 millioner K.

Kjernen i stjerne E har massetet
thet 4.077e+06 kg/m3̂ og temperatur 29 millioner K.

Filen 1K/1K.txt

Påstand 1: den absolutte størrelseklassen (magnitude) med blått filter er betydelig større enn den absolutte størrelseklassen i rødt filter


Påstand 2: denne har den minste tilsynelatende bolometriske størrelseklassen (altså den vanlige størrelseklassen tatt over alle bølgelengder, uten filter)

Påstand 3: den tilsynelatende størrelseklassen (magnitude) med blått filter er betydelig mindre enn den tilsynelatende størrelseklassen i rødt filter

Påstand 4: denne har den største tilsynelatende bolometriske størrelseklassen (altså den vanlige størrelseklassen tatt over alle bølgelengder, uten filter)


$Filen~1K/1K_Figur_A_.png$

Figure 9: Figur fra filen $1\mathrm{K}/1\mathrm{K}$ _Figur_A_.png




$Filen \ 1K/1K_Figur_B_.png$

Figure 10: Figur fra filen $1K/1K_Figur_B_pg$




$Filen \ 1K/1K_Figur_C_.png$

Figure 11: Figur fra filen $1K/1K_Figur_C_png$




$Filen~1K/1K_Figur_D_.png$

Figure 12: Figur fra filen 1K/1K-Figur-D_.png



$Filen \ 1L/1L_Figure_A.png$


Figure 13: Figur fra filen 1L/1L-Figure_A.png



Bølgelgende (cm)


$Filen \ 1L/1L_Figure_B.png$

Figure 14: Figur fra filen 1L/1L-Figure-B.png




$Filen \ 1L/1L_Figure_C.png$

Figure 15: Figur fra filen 1L/1L-Figure_C.png




$Filen \ 1L/1L_Figure_D.png$

Figure 16: Figur fra filen 1L/1L-Figure_D.png



Filen 1L/1L_Figure_E.png

Figure 17: Figur fra filen 1L/1L-Figure-E.png



Filen 1N.txt

Kjernen i stjerne A har massetet
thet $8.160\mathrm{e}+04~\mathrm{kg/m}\hat{3}$ og temperatur 35.12 millioner K.

Kjernen i stjerne B har massetet
thet 2.448e+05 kg/m3̂ og temperatur 25.43 millioner K.

Kjernen i stjerne C har massetet
thet $3.184\mathrm{e}{+05~\mathrm{kg/m}}\hat{3}$ og temperatur 33.09


millioner K.

Kjernen i stjerne D har massetet
thet $4.536\mathrm{e}+05~\mathrm{kg/m}\hat{3}$ og temperatur 17.89 millioner K.

Kjernen i stjerne E har massetet
thet 2.512e+05 kg/m3̂ og temperatur 21.52 millioner K.


Filen~1O/1O.png

Figure 18: Figur fra filen 10/10.png




$Filen~1O/1O_Figur_0_.png$

Figure 19: Figur fra filen $1O/1O_Figur_O_png$




$Filen\ 1O/1O_Figur_1_.png$

Figure 20: Figur fra filen $1O/1O_Figur_1..png$



$Filen~1O/1O_Figur_2_.png$

Figure 21: Figur fra filen $1O/1O_F$ igur_2_.png



$Filen~1O/1O_Figur_3_.png$

Figure 22: Figur fra filen $1O/1O_Figur_3_png$

Observasjon er gjort 139.39 dager etter første observasjon.

0.93

0.88

0.88

0.73

0.68

0.2606

0.2616

0.2626

0.2636

0.2646

0.2656

0.2666

0.2676

Bølgelengde (nm) minus 656nm

$Filen~1O/1O_Figur_4_.png$

Figure 23: Figur fra filen $1O/1O_F$ igur_4_.png

Observasjon er gjort 185.85 dager etter første observasjon.

0.93

0.88

0.88

0.73

0.68

0.2620

0.2630

0.2640

0.2650

0.2660

0.2670


0.2680

0.2690

Bølgelengde (nm) minus 656nm


Filen 2A.png

Figure 24: Figur fra filen 2A.png



$Filen~2B/2B_Figur_1.png$

Figure 25: Figur fra filen 2B/2B_Figur_1.png



$Filen~2B/2B_Figur_2.png$





Figure 26: Figur fra filen 2B/2B-Figur-2.png

$Filen~2C/2C_Figur_1.png$


Figure 27: Figur fra filen $2C/2C_Figur_1.png$

Vinkelforflytning 3.04 buesekunder i løpet av et millisekund.



Filen 2C/2C_Figur_2.png

Figure 28: Figur fra filen 2C/2C_Figur_2.png



Filen 3A.txt


Din destinasjon er Lillehammer som ligger i en avstand av 350 km fra Kristiansand. Du og toget som går i motsatt retning kjører begge med farta 95.28910 km/t.

Filen 3E.txt

Tog1 veier 95800.00000 kg og tog2 veier 24100.00000 kg.

Filen 4A.png

Figure 29: Figur fra filen 4A.png



Filen 4C.txt

Hastigheten til Helium-partikkelen i x-retning er 499 km/s.

Filen 4E.txt

Massen til gassklumpene er 10800000.00 kg.

Hastigheten til G1 i x-retning er 28200.00 km/s.

Hastigheten til G2 i x-retning er 33540.00 km/s.

Filen 4G.txt

Massen til stjerna er 28.75 solmasser og radien er 4.21 solradier.