


Samlefil for alle data til prøveeksamen

Filen 1A.txt

Perioden P er 127.2 millioner år


Filen 1B/Oppgave1B_Figur_A.png

Figure 1: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_A.png




Filen 1B/Oppgave1B_Figur_B.png

Figure 2: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_B.png




Filen 1B/Oppgave1B_Figur_C.png

Figure 3: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_C.png




Filen 1B/Oppgave1B_Figur_D.png

Figure 4: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_D.png



Filen 1B/Oppgave1B_Figur_E.png

Figure 5: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_E.png



Filen 1D.txt

Stjerna A: Tilsynelatende visuell størrelseklasse $m_V = 6.82$, tilsynelatende blå størrelseklasse $m_B = 9.46$

Stjerna B: Tilsynelatende visuell størrelseklasse $m_V = 6.82$, tilsynelatende blå størrelseklasse $m_B = 8.46$

Stjerna C: Tilsynelatende visuell størrelseklasse $m_V = 15.26$, tilsynelatende

blå størrelseklass $m_B = 16.90$

Stjerna D: Tilsynelatende visuell størrelseklasse $m_V = 15.26$, tilsynelatende blå størrelseklass $m_B = 17.90$

Filen 1E.txt

For stjerne 1 sin bane om massesenteret er elliptisiteten $e=0.24$ og store halvakse $a=87.40$ AU.


For stjerne 2 sin bane om massesenteret er elliptisiteten $e=0.24$ og store halvakse $a=63.33$ AU.

Filen 1F.txt

Ved bølgelengden 642.64 nm finner du størst fluks


Filen 1G/Oppgave1G_Figur_A.png

Figure 6: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_A.png




Filen 1G/Oppgave1G_Figur_B.png

Figure 7: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_B.png




Filen 1G/Oppgave1G_Figur_C.png

Figure 8: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_C.png




Filen 1G/Oppgave1G_Figur_D.png

Figure 9: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_D.png



Filen 1G/Oppgave1G_Figur_E.png

Figure 10: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_E.png



Filen 1I.txt

Gass-sky A har masse på 20.50 solmasser, temperatur på 14.10 Kelvin og tetthet $1.46\text{e-}20$ kg per kubikkmeter

Gass-sky B har masse på 19.00 solmasser, temperatur på 34.00 Kelvin og tetthet $4.59\text{e-}22$ kg per kubikkmeter

Gass-sky C har masse på 20.20 solmasser, temperatur på 33.30 Kelvin og

tetthet 3.13×10^{-21} kg per kubikkmeter

Gass-sky D har masse på 22.00 solmasser, temperatur på 43.10 Kelvin og tetthet 1.06×10^{-22} kg per kubikkmeter

Gass-sky E har masse på 7.20 solmasser, temperatur på 33.30 Kelvin og tetthet 4.67×10^{-21} kg per kubikkmeter

Filen 1J.txt

STJERNE A) hele stjerna er elektrondegenerert

STJERNE B) stjernas energi kommer fra Planck-stråling alene

STJERNE C) stjernas energi kommer fra vibrerende molekyler og ikke fra fusjon

STJERNE D) stjernas overflate består hovedsaklig av helium

STJERNE E) stjernas energi kommer hovedsaklig fra fusjon av magnesium i sentrum

Filen 1L.txt

Stjerne A har spektralklasse G9 og visuell tilsynelatende størrelseklasse $m_V = 3.99$

Stjerne B har spektralklasse B9 og visuell tilsynelatende størrelseklasse $m_V = 4.41$

Stjerne C har spektralklasse A6 og visuell tilsynelatende størrelseklasse $m_V = 6.68$

Stjerne D har spektralklasse K2 og visuell tilsynelatende størrelseklasse m_V

$$= 2.09$$


Stjerne E har spektralklasse F8 og visuell tilsynelatende størrelseklasse m_V
 $= 4.27$

Filen 1P.txt

Halvparten av partiklene har hastighetskomponent kun langs synsretningen som er enten 100 m/s mot deg eller fra deg (like mange i hver retning) og tilsvarende for den andre halvparten av partiklene men disse har 50 m/s mot deg eller fra deg


Filen 2A/Oppgave2A_Figur1.png

Figure 11: Figur fra filen 2A/Oppgave2A_Figur1.png




Filen 2A/Oppgave2A_Figur2.png

Figure 12: Figur fra filen 2A/Oppgave2A_Figur2.png



Filen 2B/Oppgave2B_Figur 4.png


Figure 13: Figur fra filen 2B/Oppgave2B_Figur 4.png



4.png

Filen 2B/Oppgave2B_Figur3.png

Figure 14: Figur fra filen 2B/Oppgave2B_Figur3.png



Filen 2C.txt

Avstand til solen er 0.607999999999998490097 AU.

Tangensiell hastighet er 51307.179484616644913331 m/s.

Filen 2D.txt

Kometens avstand fra jorda i punkt 1 er $r_1=2.332$ AU.

Kometens avstand fra jorda i punkt 2 er $r_2=9.095$ AU.

Kometens tilsynelatende størrelseklasse i punkt 1 er $m_1=17.984$.

Filen 3A.txt

Romskipets hastighet langs x-aksen er 0.9352 ganger lyshastigheten.

Tiden mellom utsendelse av strålene er 0.00055 sekunder målt i bakkesystemet.

Filen 3B.txt

Avstanden mellom de to romskipene ved første utsendelse er $D=710.0$ km.

Romskip2 sin hastighet langs x-aksen er 0.9946 ganger lyshastigheten.

Filen 3E.txt

Bølgelengden målt i romskipet som sender ut er 676.20 nm.


Filen 4A.txt

Stjernas masse er 3.27 solmasser.

Stjernas radius er 0.61 solradier.

Filen 4C.png

Figure 15: Figur fra filen 4C.png



Filen 4D.txt

Kun hvis du ikke fikk til forrige oppgave, skal du bruke denne temperaturen her: 27.62 millioner K

Filen 4G.txt

Massen til det sorte hullet er 2.50 solmasser.

r-koordinaten til det innerste romskipet er $r = 7.75$ km.

r-koordinaten til det innerste romskipet er $r = 12.03$ km.