


Samlefil for alle data til prøveeksamen

Filen 1A.txt

Perioden P er 283.1 millioner år


Filen 1B/Oppgave1B_Figur_A.png

Figure 1: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_A.png




Filen 1B/Oppgave1B_Figur_B.png

Figure 2: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_B.png




Filen 1B/Oppgave1B_Figur_C.png

Figure 3: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_C.png




Filen 1B/Oppgave1B_Figur_D.png

Figure 4: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_D.png



Filen 1B/Oppgave1B_Figur_E.png

Figure 5: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_E.png



Filen 1D.txt

Stjerna A: Tilsynelatende visuell størrelseklasse $m_V = 12.12$, tilsynelatende blå størrelseklasse $m_B = 13.52$

Stjerna B: Tilsynelatende visuell størrelseklasse $m_V = 12.12$, tilsynelatende blå størrelseklasse $m_B = 14.52$

Stjerna C: Tilsynelatende visuell størrelseklasse $m_V = 4.60$, tilsynelatende

blå størrelseklass $m_B = 6.00$

Stjerna D: Tilsynelatende visuell størrelseklasse $m_V = 4.60$, tilsynelatende blå størrelseklass $m_B = 7.00$

Filen 1E.txt

For stjerne 1 sin bane om massesenteret er elliptisiteten $e=0.95$ og store halvakse $a=78.94$ AU.


For stjerne 2 sin bane om massesenteret er elliptisiteten $e=0.95$ og store halvakse $a=41.40$ AU.

Filen 1F.txt

Ved bølgelengden 497.68 nm finner du størst fluks


Filen 1G/Oppgave1G_Figur_A.png

Figure 6: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_A.png




Filen 1G/Oppgave1G_Figur_B.png

Figure 7: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_B.png




Filen 1G/Oppgave1G_Figur_C.png

Figure 8: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_C.png




Filen 1G/Oppgave1G_Figur_D.png

Figure 9: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_D.png



Filen 1G/Oppgave1G_Figur_E.png

Figure 10: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_E.png



Filen 1I.txt

Gass-sky A har masse på 17.40 solmasser, temperatur på 62.00 Kelvin og tetthet $8.21\text{e-}21$ kg per kubikkmeter

Gass-sky B har masse på 6.80 solmasser, temperatur på 45.20 Kelvin og tetthet $9.79\text{e-}21$ kg per kubikkmeter

Gass-sky C har masse på 11.80 solmasser, temperatur på 30.50 Kelvin og

tetthet 6.10×10^{-21} kg per kubikkmeter

Gass-sky D har masse på 13.90 solmasser, temperatur på 12.40 Kelvin og tetthet 1.33×10^{-20} kg per kubikkmeter

Gass-sky E har masse på 5.80 solmasser, temperatur på 59.20 Kelvin og tetthet 4.75×10^{-21} kg per kubikkmeter

Filen 1J.txt

STJERNE A) stjernas energi kommer fra frigjort gravitasjonsenergi

STJERNE B) hele stjerna er elektrondegenerert

STJERNE C) stjernas energi kommer fra Planck-stråling alene

STJERNE D) stjerna har et degenerert heliumskall

STJERNE E) stjernas energi kommer hovedsaklig fra hydrogenfusjon i skall

Filen 1L.txt

Stjerne A har spektralklasse K7 og visuell tilsynelatende størrelseklasse $m_V = 3.00$

Stjerne B har spektralklasse K4 og visuell tilsynelatende størrelseklasse $m_V = 7.67$

Stjerne C har spektralklasse K4 og visuell tilsynelatende størrelseklasse $m_V = 5.19$

Stjerne D har spektralklasse M1 og visuell tilsynelatende størrelseklasse $m_V = 2.35$


Stjerne E har spektralklasse F8 og visuell tilsynelatende størrelseklasse $m_V = 4.06$

Filen 1P.txt

Alle gasspartiklene har fart 100 m/s i tilfeldige (uniformt fordelte) retninger.


Filen 2A/Oppgave2A_Figur1.png

Figure 11: Figur fra filen 2A/Oppgave2A_Figur1.png




Filen 2A/Oppgave2A_Figur2.png

Figure 12: Figur fra filen 2A/Oppgave2A_Figur2.png



Filen 2B/Oppgave2B_Figur 4.png


Figure 13: Figur fra filen 2B/Oppgave2B_Figur 4.png



4.png

Filen 2B/Oppgave2B_Figur3.png

Figure 14: Figur fra filen 2B/Oppgave2B_Figur3.png



Filen 2C.txt

Avstand til solen er 0.4949999999999999555911 AU.

Tangensiell hastighet er 43554.482155398378381506 m/s.

Filen 2D.txt

Kometens avstand fra jorda i punkt 1 er $r_1=2.882$ AU.

Kometens avstand fra jorda i punkt 2 er $r_2=8.295$ AU.

Kometens tilsynelatende størrelseklasse i punkt 1 er $m_1=17.147$.

Filen 3A.txt

Romskipets hastighet langs x-aksen er 0.9324 ganger lyshastigheten.

Tiden mellom utsendelse av strålene er 0.00021 sekunder målt i bakkesystemet.

Filen 3B.txt

Avstanden mellom de to romskipene ved første utsendelse er $D=280.0$ km.

Romskip2 sin hastighet langs x-aksen er 0.9948 ganger lyshastigheten.

Filen 3E.txt

Bølgelengden målt i romskipet som sender ut er 557.70 nm.


Filen 4A.txt

Stjernas masse er 2.16 solmasser.

Stjernas radius er 0.51 solradier.

Filen 4C.png

Figure 15: Figur fra filen 4C.png



Filen 4D.txt

Kun hvis du ikke fikk til forrige oppgave, skal du bruke denne temperaturen
her: 12.91 millioner K

Filen 4G.txt

Massen til det sorte hullet er 3.32 solmasser.

r-koordinaten til det innerste romskipet er $r = 10.22$ km.

r-koordinaten til det innerste romskipet er $r = 17.91$ km.