


Samlefil for alle data til prøveeksamen

Filen 1A.txt

Perioden P er 203.9 millioner år


Filen 1B/Oppgave1B_Figur_A.png

Figure 1: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_A.png




Filen 1B/Oppgave1B_Figur_B.png

Figure 2: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_B.png




Filen 1B/Oppgave1B_Figur_C.png

Figure 3: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_C.png




Filen 1B/Oppgave1B_Figur_D.png

Figure 4: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_D.png



Filen 1B/Oppgave1B_Figur_E.png

Figure 5: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_E.png



Filen 1D.txt

Stjerna A: Tilsynelatende visuell størrelseklasse $m_V = 1.90$, tilsynelatende blå størrelseklasse $m_B = 3.41$

Stjerna B: Tilsynelatende visuell størrelseklasse $m_V = 1.90$, tilsynelatende blå størrelseklasse $m_B = 4.41$

Stjerna C: Tilsynelatende visuell størrelseklasse $m_V = 6.98$, tilsynelatende

blå størrelseklass $m_B = 9.49$

Stjerna D: Tilsynelatende visuell størrelseklasse $m_V = 6.98$, tilsynelatende blå størrelseklass $m_B = 8.49$

Filen 1E.txt

For stjerne 1 sin bane om massesenteret er elliptisiteten $e=0.45$ og store halvakse $a=72.74$ AU.


For stjerne 2 sin bane om massesenteret er elliptisiteten $e=0.45$ og store halvakse $a=79.59$ AU.

Filen 1F.txt

Ved bølgelengden 479.44 nm finner du størst fluks


Filen 1G/Oppgave1G_Figur_A.png

Figure 6: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_A.png




Filen 1G/Oppgave1G_Figur_B.png

Figure 7: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_B.png




Filen 1G/Oppgave1G_Figur_C.png

Figure 8: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_C.png




Filen 1G/Oppgave1G_Figur_D.png

Figure 9: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_D.png



Filen 1G/Oppgave1G_Figur_E.png

Figure 10: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_E.png



Filen 1I.txt

Gass-sky A har masse på 21.60 solmasser, temperatur på 41.00 Kelvin og tetthet $3.96\text{e-}21$ kg per kubikkmeter

Gass-sky B har masse på 10.40 solmasser, temperatur på 64.80 Kelvin og tetthet $6.04\text{e-}22$ kg per kubikkmeter

Gass-sky C har masse på 13.90 solmasser, temperatur på 15.20 Kelvin og

tetthet 1.78×10^{-20} kg per kubikkmeter

Gass-sky D har masse på 17.80 solmasser, temperatur på 66.20 Kelvin og tetthet 8.27×10^{-21} kg per kubikkmeter

Gass-sky E har masse på 21.00 solmasser, temperatur på 22.80 Kelvin og tetthet 7.61×10^{-21} kg per kubikkmeter

Filen 1J.txt

STJERNE A) stjerna har et degenerert heliumskall

STJERNE B) kjernen består av karbon og oksygen og er degenerert

STJERNE C) stjerna har en degenerert heliumkjerne

STJERNE D) stjernas energi kommer hovedsaklig fra heliumfusjon i skall

STJERNE E) stjernas energi kommer hovedsaklig fra hydrogenfusjon i sentrum

Filen 1L.txt

Stjerne A har spektralklasse A1 og visuell tilsynelatende størrelseklasse $m_V = 8.73$

Stjerne B har spektralklasse F2 og visuell tilsynelatende størrelseklasse $m_V = 9.72$

Stjerne C har spektralklasse M4 og visuell tilsynelatende størrelseklasse $m_V = 2.80$

Stjerne D har spektralklasse K7 og visuell tilsynelatende størrelseklasse $m_V = 9.36$


Stjerne E har spektralklasse M1 og visuell tilsynelatende størrelseklasse $m_V = 4.27$

Filen 1P.txt

Alle gasspartiklene har fart 100 m/s i tilfeldige (uniformt fordelte) retninger.


Filen 2A/Oppgave2A_Figur1.png

Figure 11: Figur fra filen 2A/Oppgave2A_Figur1.png




Filen 2A/Oppgave2A_Figur2.png

Figure 12: Figur fra filen 2A/Oppgave2A_Figur2.png



Filen 2B/Oppgave2B_Figur 4.png


Figure 13: Figur fra filen 2B/Oppgave2B_Figur 4.png



4.png

Filen 2B/Oppgave2B_Figur3.png

Figure 14: Figur fra filen 2B/Oppgave2B_Figur3.png



Filen 2C.txt

Avstand til solen er 0.4619999999999996624922 AU.

Tangensiell hastighet er 55100.740482606968726031 m/s.

Filen 2D.txt

Kometens avstand fra jorda i punkt 1 er $r_1=3.710$ AU.

Kometens avstand fra jorda i punkt 2 er $r_2=9.860$ AU.

Kometens tilsynelatende størrelseklasse i punkt 1 er $m_1=18.979$.

Filen 3A.txt

Romskipets hastighet langs x-aksen er 0.9556 ganger lyshastigheten.

Tiden mellom utsendelse av strålene er 0.00070 sekunder målt i bakkesystemet.

Filen 3B.txt

Avstanden mellom de to romskipene ved første utsendelse er $D=120.0$ km.

Romskip2 sin hastighet langs x-aksen er 0.9932 ganger lyshastigheten.

Filen 3E.txt

Bølgelengden målt i romskipet som sender ut er 623.70 nm.


Filen 4A.txt

Stjernas masse er 3.65 solmasser.

Stjernas radius er 0.64 solradier.

Filen 4C.png

Figure 15: Figur fra filen 4C.png



Filen 4D.txt

Kun hvis du ikke fikk til forrige oppgave, skal du bruke denne temperaturen her: 27.98 millioner K

Filen 4G.txt

Massen til det sorte hullet er 4.56 solmasser.

r-koordinaten til det innerste romskipet er $r = 14.26$ km.

r-koordinaten til det innerste romskipet er $r = 22.97$ km.