


Samlefil for alle data til prøveeksamen

Filen 1A.txt

Perioden P er 263.8 millioner år


Filen 1B/Oppgave1B_Figur_A.png

Figure 1: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_A.png




Filen 1B/Oppgave1B_Figur_B.png

Figure 2: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_B.png




Filen 1B/Oppgave1B_Figur_C.png

Figure 3: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_C.png




Filen 1B/Oppgave1B_Figur_D.png

Figure 4: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_D.png



Filen 1B/Oppgave1B_Figur_E.png

Figure 5: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_E.png



Filen 1D.txt

Stjerna A: Tilsynelatende visuell størrelseklasse $m_V = 1.36$, tilsynelatende blå størrelseklasse $m_B = 3.14$

Stjerna B: Tilsynelatende visuell størrelseklasse $m_V = 6.56$, tilsynelatende blå størrelseklasse $m_B = 8.34$

Stjerna C: Tilsynelatende visuell størrelseklasse $m_V = 6.56$, tilsynelatende

blå størrelseklasse $m_B = 9.34$

Stjerna D: Tilsynelatende visuell størrelseklasse $m_V = 1.36$, tilsynelatende blå størrelseklasse $m_B = 4.14$

Filen 1E.txt

For stjerne 1 sin bane om massesenteret er elliptisiteten $e=0.62$ og store halvakse $a=20.32$ AU.


For stjerne 2 sin bane om massesenteret er elliptisiteten $e=0.62$ og store halvakse $a=81.23$ AU.

Filen 1F.txt

Ved bølgelengden 753.60 nm finner du størst fluks


Filen 1G/Oppgave1G_Figur_A.png

Figure 6: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_A.png




Filen 1G/Oppgave1G_Figur_B.png

Figure 7: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_B.png




Filen 1G/Oppgave1G_Figur_C.png

Figure 8: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_C.png




Filen 1G/Oppgave1G_Figur_D.png

Figure 9: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_D.png



Filen 1G/Oppgave1G_Figur_E.png

Figure 10: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_E.png



Filen 1I.txt

Gass-sky A har masse på 19.00 solmasser, temperatur på 57.80 Kelvin og tetthet 6.09×10^{-21} kg per kubikkmeter

Gass-sky B har masse på 14.80 solmasser, temperatur på 85.80 Kelvin og tetthet 8.94×10^{-21} kg per kubikkmeter

Gass-sky C har masse på 15.60 solmasser, temperatur på 76.00 Kelvin og

tetthet 8.62×10^{-21} kg per kubikkmeter

Gass-sky D har masse på 17.20 solmasser, temperatur på 48.00 Kelvin og tetthet 1.72×10^{-21} kg per kubikkmeter

Gass-sky E har masse på 37.60 solmasser, temperatur på 13.90 Kelvin og tetthet 1.25×10^{-20} kg per kubikkmeter

Filen 1J.txt

STJERNE A) hele stjerna er elektrondegenerert

STJERNE B) stjerna har et degenerert heliumskall

STJERNE C) stjernas energi kommer fra frigjort gravitasjonsenergi

STJERNE D) stjernas energi kommer hovedsaklig fra heliumfusjon i skall

STJERNE E) stjernas energi kommer fra vibrerende molekyler og ikke fra fusjon

Filen 1L.txt

Stjerne A har spektralklasse F5 og visuell tilsynelatende størrelseklasse $m_V = 4.13$

Stjerne B har spektralklasse M1 og visuell tilsynelatende størrelseklasse $m_V = 5.55$

Stjerne C har spektralklasse K4 og visuell tilsynelatende størrelseklasse $m_V = 4.56$

Stjerne D har spektralklasse M4 og visuell tilsynelatende størrelseklasse $m_V = 1.38$


Stjerne E har spektralklasse K2 og visuell tilsynelatende størrelseklasse $m_V = 5.47$

Filen 1P.txt

Alle gasspartiklene har fart 100 m/s i tilfeldige (uniformt fordelte) retninger.


Filen 2A/Oppgave2A_Figur1.png

Figure 11: Figur fra filen 2A/Oppgave2A_Figur1.png




Filen 2A/Oppgave2A_Figur2.png

Figure 12: Figur fra filen 2A/Oppgave2A_Figur2.png



Filen 2B/Oppgave2B_Figur 4.png


Figure 13: Figur fra filen 2B/Oppgave2B_Figur 4.png



4.png

Filen 2B/Oppgave2B_Figur3.png

Figure 14: Figur fra filen 2B/Oppgave2B_Figur3.png



Filen 2C.txt

Avstand til solen er 0.1260000000000000088818 AU.

Tangensiell hastighet er 106813.00180454322253354 m/s.

Filen 2D.txt

Kometens avstand fra jorda i punkt 1 er $r_1=3.892$ AU.

Kometens avstand fra jorda i punkt 2 er $r_2=7.745$ AU.

Kometens tilsynelatende størrelseklasse i punkt 1 er $m_1=17.798$.

Filen 3A.txt

Romskipets hastighet langs x-aksen er 0.9640 ganger lyshastigheten.

Tiden mellom utsendelse av strålene er 0.00088 sekunder målt i bakkesystemet.

Filen 3B.txt

Avstanden mellom de to romskipene ved første utsendelse er $D=420.0$ km.

Romskip2 sin hastighet langs x-aksen er 0.9954 ganger lyshastigheten.

Filen 3E.txt

Bølgelengden målt i romskipet som sender ut er 615.60 nm.


Filen 4A.txt

Stjernas masse er 5.03 solmasser.

Stjernas radius er 0.75 solradier.

Filen 4C.png

Figure 15: Figur fra filen 4C.png



Filen 4D.txt

Kun hvis du ikke fikk til forrige oppgave, skal du bruke denne temperaturen her: 26.31 millioner K

Filen 4G.txt

Massen til det sorte hullet er 4.84 solmasser.

r-koordinaten til det innerste romskipet er $r = 14.81$ km.

r-koordinaten til det innerste romskipet er $r = 27.46$ km.