


# Samlefil for alle data til prøveeksamen

## Filen 1A.txt

Perioden P er 169.3 millioner år


## Filen 1B/Oppgave1B\_Figur\_A.png

Figure 1: Figur fra filen 1B/Oppgave1B\_Figur\_A.png




Filen 1B/Oppgave1B\_Figur\_B.png

Figure 2: Figur fra filen 1B/Oppgave1B\_Figur\_B.png




Filen 1B/Oppgave1B\_Figur\_C.png

Figure 3: Figur fra filen 1B/Oppgave1B\_Figur\_C.png




## Filen 1B/Oppgave1B\_Figur\_D.png

Figure 4: Figur fra filen 1B/Oppgave1B\_Figur\_D.png



## Filen 1B/Oppgave1B\_Figur\_E.png

Figure 5: Figur fra filen 1B/Oppgave1B\_Figur\_E.png



## Filen 1D.txt

Stjerna A: Tilsynelatende visuell størrelseklasse  $m_V = 6.58$ , tilsynelatende blå størrelseklasse  $m_B = 7.84$

Stjerna B: Tilsynelatende visuell størrelseklasse  $m_V = 6.58$ , tilsynelatende blå størrelseklasse  $m_B = 8.84$

Stjerna C: Tilsynelatende visuell størrelseklasse  $m_V = 12.74$ , tilsynelatende

blå størrelseklass  $m_B = 15.00$

Stjerna D: Tilsynelatende visuell størrelseklasse  $m_V = 12.74$ , tilsynelatende blå størrelseklass  $m_B = 14.00$

### **Filen 1E.txt**

For stjerne 1 sin bane om massesenteret er elliptisiteten  $e=0.24$  og store halvakse  $a=29.07$  AU.


For stjerne 2 sin bane om massesenteret er elliptisiteten  $e=0.24$  og store halvakse  $a=55.09$  AU.

### **Filen 1F.txt**

Ved bølgelengden 541.08 nm finner du størst fluks


## Filen 1G/Oppgave1G\_Figur\_A.png

Figure 6: Figur fra filen 1G/Oppgave1G\_Figur\_A.png



## Filen 1G/Oppgave1G\_Figur\_B.png


Figure 7: Figur fra filen 1G/Oppgave1G\_Figur\_B.png






## Filen 1G/Oppgave1G\_Figur\_C.png

Figure 8: Figur fra filen 1G/Oppgave1G\_Figur\_C.png




## Filen 1G/Oppgave1G\_Figur\_D.png

Figure 9: Figur fra filen 1G/Oppgave1G\_Figur\_D.png



## Filen 1G/Oppgave1G\_Figur\_E.png

Figure 10: Figur fra filen 1G/Oppgave1G\_Figur\_E.png



## Filen 1I.txt

Gass-sky A har masse på 3.40 solmasser, temperatur på 83.70 Kelvin og tetthet  $8.14 \times 10^{-21}$  kg per kubikkmeter

Gass-sky B har masse på 12.40 solmasser, temperatur på 19.00 Kelvin og tetthet  $1.10 \times 10^{-20}$  kg per kubikkmeter

Gass-sky C har masse på 15.60 solmasser, temperatur på 80.90 Kelvin og

tetthet  $3.12 \times 10^{-22}$  kg per kubikkmeter

Gass-sky D har masse på 6.60 solmasser, temperatur på 29.80 Kelvin og tetthet  $3.74 \times 10^{-21}$  kg per kubikkmeter

Gass-sky E har masse på 14.40 solmasser, temperatur på 71.10 Kelvin og tetthet  $6.47 \times 10^{-21}$  kg per kubikkmeter

### **Filen 1J.txt**

STJERNE A) stjernas energi kommer hovedsaklig fra fusjon av magnesium i sentrum

STJERNE B) stjernas energi kommer hovedsaklig fra heliumfusjon i skall

STJERNE C) stjernas overflate består hovedsaklig av helium

STJERNE D) stjernas energi kommer hovedsaklig fra hydrogenfusjon i skall

STJERNE E) stjernas energi kommer fra vibrerende molekyler og ikke fra fusjon

### **Filen 1L.txt**

Stjerne A har spektralklasse K7 og visuell tilsynelatende størrelseklasse  $m_V = 8.37$

Stjerne B har spektralklasse M7 og visuell tilsynelatende størrelseklasse  $m_V = 2.37$

Stjerne C har spektralklasse B9 og visuell tilsynelatende størrelseklasse  $m_V = 5.12$

Stjerne D har spektralklasse F2 og visuell tilsynelatende størrelseklasse  $m_V$

= 4.20


Stjerne E har spektralklasse A1 og visuell tilsynelatende størrelseklasse  $m_V$   
= 3.64

### **Filen 1P.txt**

Alle partiklene har hastighetskomponent kun langs synsretningen som er enten 100 m/s mot deg eller fra deg (like mange i hver retning)


Filen 2A/Oppgave2A\_Figur1.png

Figure 11: Figur fra filen 2A/Oppgave2A\_Figur1.png




Filen 2A/Oppgave2A\_Figur2.png

Figure 12: Figur fra filen 2A/Oppgave2A\_Figur2.png



## Filen 2B/Oppgave2B\_Figur 4.png

Figure 13: Figur fra filen 2B/Oppgave2B\_Figur 4.png




4.png



## Filen 2B/Oppgave2B\_Figur3.png

Figure 14: Figur fra filen 2B/Oppgave2B\_Figur3.png



## Filen 2C.txt

Avstand til solen er 0.5030000000000000266454 AU.

Tangensiell hastighet er 54439.134366403057356365 m/s.

### **Filen 2D.txt**

Kometens avstand fra jorda i punkt 1 er  $r_1=2.028$  AU.

Kometens avstand fra jorda i punkt 2 er  $r_2=9.030$  AU.

Kometens tilsynelatende størrelseklasse i punkt 1 er  $m_1=15.413$ .

### **Filen 3A.txt**

Romskipets hastighet langs x-aksen er 0.9372 ganger lyshastigheten.

Tiden mellom utsendelse av strålene er 0.00067 sekunder målt i bakkesystemet.

### **Filen 3B.txt**

Avstanden mellom de to romskipene ved første utsendelse er  $D=460.0$  km.

Romskip2 sin hastighet langs x-aksen er 0.9948 ganger lyshastigheten.

### **Filen 3E.txt**

Bølgelengden målt i romskipet som sender ut er 554.10 nm.


### **Filen 4A.txt**

Stjernas masse er 6.25 solmasser.

Stjernas radius er 0.85 solradier.

## Filen 4C.png

Figure 15: Figur fra filen 4C.png



## Filen 4D.txt

Kun hvis du ikke fikk til forrige oppgave, skal du bruke denne temperaturen her: 27.89 millioner K

### **Filen 4G.txt**

Massen til det sorte hullet er 2.04 solmasser.

r-koordinaten til det innerste romskipet er  $r = 6.33$  km.

r-koordinaten til det innerste romskipet er  $r = 11.50$  km.