
Samlefil for alle data til prøveeksamen

Filen 1A.txt

Perioden P er 186.1 millioner år


Filen 1B/Oppgave1B_Figur_A.png

Figure 1: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_A.png




$Filen~1B/Oppgave1B_Figur_B.png$

Figure 2: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_B.png




$Filen~1B/Oppgave1B_Figur_C.png$

Figure 3: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_C.png



$Filen~1B/Oppgave1B_Figur_D.png$

Figure 4: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_D.png



$Filen\ 1B/Oppgave 1B_Figur_E.png$

Figur E

657.14
657.10
657.08
0 10 20 30 40 50 60 70 Periode (år)

Figure 5: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_E.png

Filen 1D.txt

Stjerna A: Tilsynelatende visuell størrelseklasse m
-V = 10.04, tilsynelatende blå størrelseklass $m_B=11.76$

Stjerna B: Tilsynelatende visuell størrelseklasse m
_V = 10.04, tilsynelatende blå størrelseklass $m_B = 12.76$

Stjerna C: Tilsynelatende visuell størrelseklasse m $_{\text{-}}\mathrm{V}=4.96,$ tilsynelatende

blå størrelseklass m_B = 7.68

Stjerna D: Tilsynelatende visuell størrelseklasse m
_V = 4.96, tilsynelatende blå størrelseklass $m_B = 6.68$

Filen 1E.txt

For stjerne 1 sin bane om massesenteret er elliptisiteten e=0.51 og store halvakse a=91.54 AU.


For stjerne 2 sin bane om massesenteret er elliptisiteten e=0.51 og store halvakse a=49.22 AU.

Filen 1F.txt

Ved bølgelengden 393.96 nm finner du størst fluks


$Filen~1G/Oppgave1G_Figur_A.png$

Figure 6: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_A.png




$Filen~1G/Oppgave1G_Figur_B.png$

Figure 7: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_B.png




$Filen \ 1G/Oppgave1G_Figur_C.png$

Figure 8: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_C.png



$Filen~1G/Oppgave1G_Figur_D.png$

Figure 9: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_D.png



Filen 1G/Oppgave1G_Figur_E.png

Figur E 6.20 6.00 Tilsynelatende størrelsklasse mv 5.80 5.60 5.40 5.20 5.00 20 ò 40 60 100 120 80 Observasjonstid (dager)

Figure 10: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_E.png

Filen 1I.txt

Gass-sky A har masse på 4.80 solmasser, temperatur på 29.80 Kelvin og tetthet 2.12e-21 kg per kubikkmeter

Gass-sky B har masse på 20.20 solmasser, temperatur på 59.90 Kelvin og tetthet 1.72e-21 kg per kubikkmeter

Gass-sky C har masse på 15.40 solmasser, temperatur på 11.60 Kelvin og

tetthet 1.29e-20 kg per kubikkmeter

Gass-sky D har masse på 15.40 solmasser, temperatur på 34.70 Kelvin og tetthet 5.39e-21 kg per kubikkmeter

Gass-sky E har masse på 9.60 solmasser, temperatur på 56.40 Kelvin og tetthet 4.88e-21 kg per kubikkmeter

Filen 1J.txt

STJERNE A) stjerna har et degenerert heliumskall

STJERNE B) kjernen består av karbon og oksygen og er degenerert

STJERNE C) stjerna har en degenerert heliumkjerne

STJERNE D) stjernas overflate består hovedsaklig av helium

STJERNE E) stjernas energi kommer fra frigjort gravitasjonsenergi

Filen 1L.txt

Stjerne A har spektralklasse G6 og visuell tilsynelatende størrelseklasse m $_{\text{-}}\mathrm{V}$ = 6.04

Stjerne B har spektralklasse F2 og visuell tilsynelatende størrelseklasse m_V = 3.35

Stjerne C har spektralklasse M4 og visuell tilsynelatende størrelseklasse m $_{-}\mathrm{V}$ = 1.83

Stjerne D har spektralklasse F2 og visuell tilsynelatende størrelseklasse m $_{\text{-}}\mathrm{V}$ = 4.91

Stjerne E har spektralklasse M7 og visuell tilsynelatende størrelseklasse m_V = 10.07

Filen 1P.txt

Alle gasspartiklene har fart 100 m/s i tilfeldige (uniformt fordelte) retninger.

$Filen~2A/Oppgave 2A_Figur 1.png$

i

ź

3

5

x-posisjon (buesekunder)


9

10

Figure 11: Figur fra filen 2A/Oppgave2A_Figur1.png


$Filen~2A/Oppgave 2A_Figur 2.png$

Figure 12: Figur fra filen 2A/Oppgave2A_Figur2.png



$Filen\ 2B/Oppgave 2B_Figur\ 4.png$

Figure 13: Figur fra filen 2B/Oppgave2B_Figur 4.png



4.png

Filen 2B/Oppgave2B_Figur3.png

Figur 3 10 9 8 y-posisjon (buesekunder) 7 6 5 3 2 1 . i ż ż 5 10 x-posisjon (buesekunder)

Figure 14: Figur fra filen 2B/Oppgave2B_Figur3.png

Filen 2C.txt

Avstand til solen er 0.171999999999998623323 AU.

Tangensiell hastighet er 84027.274088224919978529 m/s.

Filen 2D.txt

Kometens avstand fra jorda i punkt 1 er r1=3.890 AU.

Kometens avstand fra jorda i punkt 2 er r2=9.150 AU.

Kometens tilsynelatende størrelseklasse i punkt 1 er m1=18.872.

Filen 3A.txt

Romskipets hastighet langs x-aksen er 0.9600 ganger lyshastigheten.

Tiden mellom utsendelse av strålene er 0.00055 sekunder målt i bakkesystemet.

Filen 3B.txt

Avstanden mellom de to romskipene ved første utsendelse er D=840.0 km.

Romskip2 sin hastighet langs x-aksen er 0.9970 ganger lyshastigheten.

Filen 3E.txt

Bølgelengden målt i romskipet som sender ut er 746.10 nm.

Filen 4A.txt

Stjernas masse er 6.29 solmasser.

Stjernas radius er 0.86 solradier.

Filen 4C.png

Figur 4C 2.4000 2.2000 2.0000 Sannsynlighetstetthet i 10⁻⁴ % 1.8000 1.6000 1.4000 1.2000 1.0000 0.8000 0.6000 0.4000 0.2000 0.0000 -200 200 -400 400 -600 600 Hastighet i x-retning (km/s)

Figure 15: Figur fra filen 4C.png

Filen 4D.txt

Kun hvis du ikke fikk til forrige oppgave, skal du bruke denne temperaturen her: $14.15~\mathrm{millioner}~\mathrm{K}$

Filen 4G.txt

Massen til det sorte hullet er 4.83 solmasser.

r-koordinaten til det innerste romskipet er
r $=15.00~\mathrm{km}.$

r-koordinaten til det innerste romskipet er r $=24.84~\mathrm{km}.$