


Samlefil for alle data til prøveeksamen

Filen 1A.txt

Perioden P er 135.3 millioner år


Filen 1B/Oppgave1B_Figur_A.png

Figure 1: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_A.png




Filen 1B/Oppgave1B_Figur_B.png

Figure 2: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_B.png




Filen 1B/Oppgave1B_Figur_C.png

Figure 3: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_C.png




Filen 1B/Oppgave1B_Figur_D.png

Figure 4: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_D.png



Filen 1B/Oppgave1B_Figur_E.png

Figure 5: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_E.png



Filen 1D.txt

Stjerna A: Tilsynelatende visuell størrelseklasse $m_V = 2.02$, tilsynelatende blå størrelseklasse $m_B = 4.95$

Stjerna B: Tilsynelatende visuell størrelseklasse $m_V = 7.54$, tilsynelatende blå størrelseklasse $m_B = 9.47$

Stjerna C: Tilsynelatende visuell størrelseklasse $m_V = 2.02$, tilsynelatende

blå størrelseklass $m_B = 3.95$

Stjerna D: Tilsynelatende visuell størrelseklasse $m_V = 7.54$, tilsynelatende blå størrelseklass $m_B = 10.47$

Filen 1E.txt

For stjerne 1 sin bane om massesenteret er elliptisiteten $e=0.80$ og store halvakse $a=27.22$ AU.


For stjerne 2 sin bane om massesenteret er elliptisiteten $e=0.80$ og store halvakse $a=39.57$ AU.

Filen 1F.txt

Ved bølgelengden 514.40 nm finner du størst fluks


Filen 1G/Oppgave1G_Figur_A.png

Figure 6: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_A.png




Filen 1G/Oppgave1G_Figur_B.png

Figure 7: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_B.png




Filen 1G/Oppgave1G_Figur_C.png

Figure 8: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_C.png




Filen 1G/Oppgave1G_Figur_D.png

Figure 9: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_D.png



Filen 1G/Oppgave1G_Figur_E.png

Figure 10: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_E.png



Filen 1I.txt

Gass-sky A har masse på 7.40 solmasser, temperatur på 89.30 Kelvin og tetthet 1.18×10^{-22} kg per kubikkmeter

Gass-sky B har masse på 37.60 solmasser, temperatur på 19.20 Kelvin og tetthet 1.41×10^{-20} kg per kubikkmeter

Gass-sky C har masse på 3.00 solmasser, temperatur på 34.00 Kelvin og

tetthet $3.81\text{e-}21$ kg per kubikkmeter

Gass-sky D har masse på 6.00 solmasser, temperatur på 81.60 Kelvin og tetthet $5.22\text{e-}21$ kg per kubikkmeter

Gass-sky E har masse på 8.80 solmasser, temperatur på 83.70 Kelvin og tetthet $6.20\text{e-}22$ kg per kubikkmeter

Filen 1J.txt

STJERNE A) hele stjerna er elektrondegenerert

STJERNE B) stjernas energi kommer hovedsaklig fra hydrogenfusjon i skall

STJERNE C) stjernas overflate består hovedsaklig av helium

STJERNE D) stjernas energi kommer fra Planck-stråling alene

STJERNE E) stjernas energi kommer hovedsaklig fra fusjon av magnesium i sentrum

Filen 1L.txt

Stjerne A har spektralklasse A1 og visuell tilsynelatende størrelseklasse $m_V = 3.35$

Stjerne B har spektralklasse M7 og visuell tilsynelatende størrelseklasse $m_V = 1.85$

Stjerne C har spektralklasse K4 og visuell tilsynelatende størrelseklasse $m_V = 3.14$

Stjerne D har spektralklasse G6 og visuell tilsynelatende størrelseklasse $m_V = 5.76$


Stjerne E har spektralklasse K7 og visuell tilsynelatende størrelseklasse $m_V = 4.27$

Filen 1P.txt

Halvparten av partiklene har hastighetskomponent kun langs synsretningen som er enten 100 m/s mot deg eller fra deg (like mange i hver retning) og tilsvarende for den andre halvparten av partiklene men disse har 50 m/s mot deg eller fra deg


Filen 2A/Oppgave2A_Figur1.png

Figure 11: Figur fra filen 2A/Oppgave2A_Figur1.png




Filen 2A/Oppgave2A_Figur2.png

Figure 12: Figur fra filen 2A/Oppgave2A_Figur2.png



Filen 2B/Oppgave2B_Figur 4.png


Figure 13: Figur fra filen 2B/Oppgave2B_Figur 4.png



4.png

Filen 2B/Oppgave2B_Figur3.png

Figure 14: Figur fra filen 2B/Oppgave2B_Figur3.png



Filen 2C.txt

Avstand til solen er 0.38800000000000001154632 AU.

Tangensiell hastighet er 57216.338113156438339502 m/s.

Filen 2D.txt

Kometens avstand fra jorda i punkt 1 er $r_1=3.332$ AU.

Kometens avstand fra jorda i punkt 2 er $r_2=9.665$ AU.

Kometens tilsynelatende størrelseklasse i punkt 1 er $m_1=17.112$.

Filen 3A.txt

Romskipets hastighet langs x-aksen er 0.9508 ganger lyshastigheten.

Tiden mellom utsendelse av strålene er 0.00043 sekunder målt i bakkesystemet.

Filen 3B.txt

Avstanden mellom de to romskipene ved første utsendelse er $D=820.0$ km.

Romskip2 sin hastighet langs x-aksen er 0.9914 ganger lyshastigheten.

Filen 3E.txt

Bølgelengden målt i romskipet som sender ut er 673.20 nm.


Filen 4A.txt

Stjernas masse er 4.70 solmasser.

Stjernas radius er 0.72 solradier.

Filen 4C.png

Figure 15: Figur fra filen 4C.png



Filen 4D.txt

Kun hvis du ikke fikk til forrige oppgave, skal du bruke denne temperaturen
her: 13.88 millioner K

Filen 4G.txt

Massen til det sorte hullet er 4.00 solmasser.

r-koordinaten til det innerste romskipet er $r = 12.46$ km.

r-koordinaten til det innerste romskipet er $r = 22.91$ km.