
Samlefil for alle data til prøveeksamen

Filen 1A.txt

Perioden P er 166.5 millioner år


Filen 1B/Oppgave1B_Figur_A.png

Figure 1: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_A.png




$Filen~1B/Oppgave1B_Figur_B.png$

Figure 2: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_B.png




$Filen~1B/Oppgave1B_Figur_C.png$

Figure 3: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_C.png



$Filen~1B/Oppgave1B_Figur_D.png$

Figure 4: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_D.png



Filen 1B/Oppgave1B_Figur_E.png

Figur E

657.74 - (E) 90 657.72 - (657.70 - (6

Figure 5: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_E.png

Filen 1D.txt

Stjerna A: Tilsynelatende visuell størrelseklasse m
-V = 11.76, tilsynelatende blå størrelseklass $m_B=13.37$

Stjerna B: Tilsynelatende visuell størrelseklasse m
_V = 4.72, tilsynelatende blå størrelseklass $m_B=6.33$

Stjerna C: Tilsynelatende visuell størrelseklasse $m_{-}V = 11.76$, tilsynelatende

blå størrelseklass m_B = 14.37

Stjerna D: Tilsynelatende visuell størrelseklasse m
_V = 4.72, tilsynelatende blå størrelseklass $m_B = 7.33$

Filen 1E.txt

For stjerne 1 sin bane om massesenteret er elliptisiteten e=0.66 og store halvakse a=65.42 AU.


For stjerne 2 sin bane om massesenteret er elliptisiteten e=0.66 og store halvakse a=8.39 AU.

Filen 1F.txt

Ved bølgelengden 414.44 nm finner du størst fluks


$Filen~1G/Oppgave1G_Figur_A.png$

Figure 6: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_A.png




$Filen~1G/Oppgave1G_Figur_B.png$

Figure 7: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_B.png




$Filen \ 1G/Oppgave1G_Figur_C.png$

Figure 8: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_C.png



$Filen~1G/Oppgave1G_Figur_D.png$

Figure 9: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_D.png



Filen 1G/Oppgave1G_Figur_E.png

5.80 - 5.60 - 5.20 - 0 20 40 60 80 100 Observasjonstid (dager)

Figure 10: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_E.png

Filen 1I.txt

Gass-sky A har masse på 4.00 solmasser, temperatur på 38.90 Kelvin og tetthet 3.96e-21 kg per kubikkmeter

Gass-sky B har masse på 15.40 solmasser, temperatur på 12.90 Kelvin og tetthet 1.68e-20 kg per kubikkmeter

Gass-sky C har masse på 18.00 solmasser, temperatur på 32.60 Kelvin og

tetthet 7.24e-21 kg per kubikkmeter

Gass-sky D har masse på 9.40 solmasser, temperatur på 71.80 Kelvin og tetthet 9.94e-21 kg per kubikkmeter

Gass-sky E har masse på 21.00 solmasser, temperatur på 71.10 Kelvin og tetthet 4.43e-21 kg per kubikkmeter

Filen 1J.txt

STJERNE A) kjernen består av karbon og oksygen og er degenerert

STJERNE B) stjernas overflate består hovedsaklig av helium

STJERNE C) stjernas energi kommer hovedsaklig fra fusjon av magnesium i sentrum

STJERNE D) stjerna har en degenerert heliumkjerne

STJERNE E) stjernas energi kommer fra vibrerende molekyler og ikke fra fusjon

Filen 1L.txt

Stjerne A har spektralklasse B9 og visuell tilsynelatende størrelseklasse m_V = 3.14

Stjerne B har spektralklasse B6 og visuell tilsynelatende størrelseklasse m_V = 7.74

Stjerne C har spektralklasse G9 og visuell tilsynelatende størrelseklasse m_V = 7.81

Stjerne D har spektralklasse A6 og visuell tilsynelatende størrelseklasse m_V

= 8.80

Stjerne E har spektralklasse K7 og visuell tilsynelatende størrelseklasse m_V = 1.14

Filen 1P.txt

Halvparten av partiklene har hastighetskomponent kun langs synsretningen som er enten 100 m/s mot deg eller fra deg (like mange i hver retning) og tilsvarende for den andre halvparten av partiklene men disse har 50 m/s mot deg eller fra deg

$Filen~2A/Oppgave 2A_Figur 1.png$

1 -

i

ź

3

5

x-posisjon (buesekunder)


9

10

Figure 11: Figur fra filen 2A/Oppgave2A_Figur1.png


$Filen~2A/Oppgave 2A_Figur 2.png$

Figure 12: Figur fra filen 2A/Oppgave2A_Figur2.png



$Filen\ 2B/Oppgave 2B_Figur\ 4.png$

Figure 13: Figur fra filen 2B/Oppgave2B_Figur 4.png



4.png

Filen 2B/Oppgave2B_Figur3.png




Figure 14: Figur fra filen 2B/Oppgave2B_Figur3.png

Filen 2C.txt

Avstand til solen er 0.664999999999992450483 AU.

Tangensiell hastighet er 47012.770834677306993399 m/s.

Filen 2D.txt

Kometens avstand fra jorda i punkt 1 er r1=2.552 AU.

Kometens avstand fra jorda i punkt 2 er r2=5.355 AU.

Kometens tilsynelatende størrelseklasse i punkt 1 er m1=16.746.

Filen 3A.txt

Romskipets hastighet langs x-aksen er 0.9332 ganger lyshastigheten.

Tiden mellom utsendelse av strålene er 0.00037 sekunder målt i bakkesystemet.

Filen 3B.txt

Avstanden mellom de to romskipene ved første utsendelse er D=910.0 km.

Romskip2 sin hastighet langs x-aksen er 0.9949 ganger lyshastigheten.

Filen 3E.txt

Bølgelengden målt i romskipet som sender ut er 681.30 nm.

Filen 4A.txt

Stjernas masse er 5.91 solmasser.

Stjernas radius er 0.83 solradier.

Filen 4C.png

Figur 4C 2.4000 2.2000 2.0000 Sannsynlighetstetthet i 10⁻⁴ % 1.8000 1.6000 1.4000 1.2000 1.0000 0.8000 0.6000 0.4000 0.2000 0.0000 -600 -200 200 -400 400 600 Hastighet i x-retning (km/s)

Figure 15: Figur fra filen 4C.png

Filen 4D.txt

Kun hvis du ikke fikk til forrige oppgave, skal du bruke denne temperaturen her: 12.62 millioner K

Filen 4G.txt

Massen til det sorte hullet er 2.83 solmasser.

r-koordinaten til det innerste romskipet er r $=8.46~\mathrm{km}.$

r-koordinaten til det innerste romskipet er
r $=15.17~\mathrm{km}.$