


Samlefil for alle data til prøveeksamen

Filen 1A.txt

Perioden P er 133.0 millioner år


Filen 1B/Oppgave1B_Figur_A.png

Figure 1: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_A.png




Filen 1B/Oppgave1B_Figur_B.png

Figure 2: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_B.png




Filen 1B/Oppgave1B_Figur_C.png

Figure 3: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_C.png




Filen 1B/Oppgave1B_Figur_D.png

Figure 4: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_D.png



Filen 1B/Oppgave1B_Figur_E.png

Figure 5: Figur fra filen 1B/Oppgave1B_Figur_E.png



Filen 1D.txt

Stjerna A: Tilsynelatende visuell størrelseklasse $m_V = 10.00$, tilsynelatende blå størrelseklasse $m_B = 11.31$

Stjerna B: Tilsynelatende visuell størrelseklasse $m_V = 10.00$, tilsynelatende blå størrelseklasse $m_B = 12.31$

Stjerna C: Tilsynelatende visuell størrelseklasse $m_V = 4.96$, tilsynelatende

blå størrelseklass $m_B = 6.27$

Stjerna D: Tilsynelatende visuell størrelseklasse $m_V = 4.96$, tilsynelatende blå størrelseklass $m_B = 7.27$

Filen 1E.txt

For stjerne 1 sin bane om massesenteret er elliptisiteten $e=0.15$ og store halvakse $a=55.10$ AU.


For stjerne 2 sin bane om massesenteret er elliptisiteten $e=0.15$ og store halvakse $a=65.07$ AU.

Filen 1F.txt

Ved bølgelengden 447.00 nm finner du størst fluks


Filen 1G/Oppgave1G_Figur_A.png

Figure 6: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_A.png




Filen 1G/Oppgave1G_Figur_B.png

Figure 7: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_B.png




Filen 1G/Oppgave1G_Figur_C.png

Figure 8: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_C.png




Filen 1G/Oppgave1G_Figur_D.png

Figure 9: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_D.png



Filen 1G/Oppgave1G_Figur_E.png

Figure 10: Figur fra filen 1G/Oppgave1G_Figur_E.png



Filen 1I.txt

Gass-sky A har masse på 17.00 solmasser, temperatur på 49.40 Kelvin og tetthet $7.99\text{e-}21$ kg per kubikkmeter

Gass-sky B har masse på 14.80 solmasser, temperatur på 65.50 Kelvin og tetthet $2.99\text{e-}21$ kg per kubikkmeter

Gass-sky C har masse på 36.40 solmasser, temperatur på 16.50 Kelvin og

tetthet 1.24×10^{-20} kg per kubikkmeter

Gass-sky D har masse på 12.20 solmasser, temperatur på 34.70 Kelvin og tetthet 9.70×10^{-21} kg per kubikkmeter

Gass-sky E har masse på 12.60 solmasser, temperatur på 85.10 Kelvin og tetthet 6.24×10^{-21} kg per kubikkmeter

Filen 1J.txt

STJERNE A) stjernas energi kommer hovedsaklig fra hydrogenfusjon i sentrum

STJERNE B) stjernas energi kommer fra vibrerende molekyler og ikke fra fusjon

STJERNE C) stjernas energi kommer fra Planck-stråling alene

STJERNE D) stjernas overflate består hovedsaklig av helium

STJERNE E) kjernen består av karbon og oksygen og er degenerert

Filen 1L.txt

Stjerne A har spektralklasse K2 og visuell tilsynelatende størrelseklasse $m_V = 8.87$

Stjerne B har spektralklasse K2 og visuell tilsynelatende størrelseklasse $m_V = 4.13$

Stjerne C har spektralklasse M1 og visuell tilsynelatende størrelseklasse $m_V = 1.61$

Stjerne D har spektralklasse A4 og visuell tilsynelatende størrelseklasse m_V

$$= 6.75$$


Stjerne E har spektralklasse F5 og visuell tilsynelatende størrelseklasse m_V
 $= 9.36$

Filen 1P.txt

Halvparten av partiklene har hastighetskomponent kun langs synsretningen som er enten 100 m/s mot deg eller fra deg (like mange i hver retning) og den andre halvparten har ingen bevegelse langs synsretningen


Filen 2A/Oppgave2A_Figur1.png

Figure 11: Figur fra filen 2A/Oppgave2A_Figur1.png




Filen 2A/Oppgave2A_Figur2.png

Figure 12: Figur fra filen 2A/Oppgave2A_Figur2.png



Filen 2B/Oppgave2B_Figur 4.png


Figure 13: Figur fra filen 2B/Oppgave2B_Figur 4.png



4.png

Filen 2B/Oppgave2B_Figur3.png

Figure 14: Figur fra filen 2B/Oppgave2B_Figur3.png



Filen 2C.txt

Avstand til solen er 0.751000000000000088818 AU.

Tangensiell hastighet er 44682.874284535042534117 m/s.

Filen 2D.txt

Kometens avstand fra jorda i punkt 1 er $r_1=3.536$ AU.

Kometens avstand fra jorda i punkt 2 er $r_2=6.050$ AU.

Kometens tilsynelatende størrelseklasse i punkt 1 er $m_1=17.778$.

Filen 3A.txt

Romskipets hastighet langs x-aksen er 0.9380 ganger lyshastigheten.

Tiden mellom utsendelse av strålene er 0.00063 sekunder målt i bakkesystemet.

Filen 3B.txt

Avstanden mellom de to romskipene ved første utsendelse er $D=700.0$ km.

Romskip2 sin hastighet langs x-aksen er 0.9885 ganger lyshastigheten.

Filen 3E.txt

Bølgelengden målt i romskipet som sender ut er 766.50 nm.


Filen 4A.txt

Stjernas masse er 4.97 solmasser.

Stjernas radius er 0.75 solradier.

Filen 4C.png

Figure 15: Figur fra filen 4C.png



Filen 4D.txt

Kun hvis du ikke fikk til forrige oppgave, skal du bruke denne temperaturen her: 27.87 millioner K

Filen 4G.txt

Massen til det sorte hullet er 4.30 solmasser.

r-koordinaten til det innerste romskipet er $r = 12.96$ km.

r-koordinaten til det innerste romskipet er $r = 23.54$ km.