

Demo Stylish Article

Félix Romiguère ¹

Résumé

Ce document est un test d'utilisation de git pour le projet Tahiti Soundscape

Keywords

template, demo

¹Université de Montpellier, Scientific Department, Somewhere, City, Country, 9999

Table des matières

1 Méthode pour la prise de mesure Google Earth¹

1. Méthode pour la prise de mesure Google Earth

- La date des images de Google Earth varie entre le 15/07/2023 et le 02/03/2025.
- Un cercle de 100m de rayon est créé autour de chaque enregistreur, égalant une surface de 31416 m². Pour les mesures des polygones (HSA et HERB) on zoom pour représenter 1/3-1/4 du cercle avec un angle de plan en zénithal.
- On accumule ensuite les zones délimitées en sommant les valeurs de surface (m²) de nos polygones. Attention à bien refaire les polygones pour les sites se chevauchant entre eux (ex : ILM)
- Attention à bien prendre en compte les canopées, même surplombants une route car importants pour les oiseaux.
- Flou entre les routes d'accès en terre et celles en graviers Flou pour les surfaces HERB et la fougère en altitude. Doit-elle être considérée dedans ? (Oui car zone vraiment herbacée peut ne pas représenter les mêmes habitats et communautés aviaires que les fougères (zone agricole/parc vs versant de vallée)), parfois séparation pas claire entre les deux.



Figure 1. Séparation parfois complexe entre les vraies zones herbacées et les végétations de fougère (PI_Belvedere_5). Les fougères peuvent représenter des surfaces importantes (OBelvedere_2).




Figure 2. Proportion de HSA et de couvert herbacé par site. Ces deux variables ne sont pas corrélées entre elles : « $\text{cor}(\text{HSA}, \text{HERB})$ » = 0.03168




Figure 3. Carte des 69 sites intégrés dans les enregistrements de paysage sonore. Les couleurs chaudes représentent les sites de plus haute altitude.