Sistema Web de Cribado Clinico Preliminar

Informe Orientativo de Salud Mental (PHQ-9 y GAD-7)

Fecha de emision: 2026-10-14


Persona evaluada: Yadir morales

Este informe es un cribado orientativo y no constituye un diagnostico clinico.


1. Resumen de Instrumentos Aplicados

Instrumento	Area de exploracion	Puntaje obtenido	Severidad preliminar
PHQ-9	Animo, vitalidad e interes (ultimas 2 semanas)	**27** de 27 puntos	**Severa**
GAD-7	Tension, preocupacion y ansiedad (ultimas 2 semanas)	**21** de 21 puntos	**Severa**

PHQ-9 (Animo y vitalidad) | Puntaje obtenido: 27 / 27



GAD-7 (Tension y ansiedad) | Puntaje obtenido: 21 / 21



ATENCION PRIORITARIA: PROTOCOLO DE APOYO Y LINEAS DE CONTACTO

Atencion prioritaria y recursos de contacto inmediato: Si estas experimentando pensamientos de hacerte dano, desesperanza profunda o una situacion de angustia desbordante, por favor comunicate de inmediato con las lineas de apoyo o acude al servicio de urgencias mas cercano.

Recurso / Linea	Contacto	Horario	Orientacion
Linea 123	**123**	24/7	Emergencias medicas.
Linea 192 opcion 4	**192 opcion 4**	24/7	Salud mental MinSalud.
Linea Amiga Saludable Medellin	**106 / (604) 444 44 48**	24/7	Apoyo psicosocial.

2. Como se Responden y se Interpretan los Cuestionarios

Cada pregunta se respondio pensando en las **ultimas dos semanas**, eligiendo cuantos dias te afecto lo que describe. Cada opcion suma de 0 a 3 puntos y la suma de todas las preguntas da el puntaje total de cada cuestionario [1][2]. Un puntaje mas alto indica que reportaste mas molestias o con mas frecuencia; no indica por que ocurren ni significa que exista un problema de salud.

Ningun dia = 0 punto(s)	**Varios dias** = 1 punto(s)	**Mas de la mitad de los dias** = 2 punto(s)	**Casi todos los dias** = 3 punto(s)

Nivel	PHQ-9 (0 a 27)	GAD-7 (0 a 21)	Que se suele sugerir (orientativo)
Minima	0 a 4	0 a 4	Mantener habitos de autocuidado. Si algo te preocupa, puedes consultar de todas formas.
Leve	5 a 9	5 a 9	Observar con atencion como evolucionan las molestias y volver a responder el cuestionario mas adelante.
Moderada	10 a 14	10 a 14	Se recomienda una consulta de valoracion con medicina general o psicologia.
Moderadamente severa	15 a 19	No aplica	Se recomienda una valoracion profesional oportuna para explorar opciones de acompanamiento.
Severa	20 a 27	15 a 21	Se recomienda una valoracion profesional prioritaria; si hay mucho malestar, busca atencion cuanto antes.

Los puntajes de 5, 10, 15 y 20 en el PHQ-9, y de 5, 10 y 15 en el GAD-7, son los puntos de corte propuestos por los autores para ordenar los resultados por niveles [1][2]. Sirven para orientar si conviene consultar a un profesional; no son un diagnostico ni indican un tratamiento. Cualquier decision sobre acompanamiento o tratamiento la toma un profesional de la salud despues de evaluarte.

Sobre la pregunta 9 del PHQ-9: es una pregunta de deteccion simple sobre pensamientos de hacerse dano; no es una evaluacion del riesgo. Si respondiste cualquier opcion distinta de "Ningun dia", se recomienda una evaluacion adicional por parte de un profesional capacitado para valorar ese riesgo.

3. Que Significa Cada Pregunta: PHQ-9 (Animo y Vitalidad)

El PHQ-9 reune nueve preguntas sobre animo, interes, sueno, energia, apetito, autoestima, concentracion, ritmo corporal y pensamientos de hacerse dano; su puntaje total va de 0 a 27 [1]. A continuacion se explica que busca explorar cada pregunta y se muestra la frecuencia que marcaste. Estas explicaciones son descriptivas: ninguna pregunta se interpreta de forma aislada.

Pregunta del cuestionario	Que busca explorar	Tu respuesta y que significa
1. Poco interes o placer en hacer cosas	Explora si las actividades que antes te resultaban agradables o interesantes (pasatiempos, salidas, conversaciones, estudio o trabajo) han dejado de generarte disfrute o ganas durante las ultimas dos semanas.	**Casi todos los dias** Estuvo presente casi a diario durante las ultimas dos semanas. Suma 3 puntos.
2. Sentirse desanimado/a, deprimido/a o sin esperanza	Explora si has sentido tristeza, desanimo o la sensacion de que las cosas no van a mejorar. Se refiere al estado de animo en general, no a un mal momento aislado: la pregunta es cuantos dias de las ultimas dos semanas te has sentido asi.	**Casi todos los dias** Estuvo presente casi a diario durante las ultimas dos semanas. Suma 3 puntos.
3. Problemas para dormir o para mantenerse dormido/a, o dormir demasiado	Explora cambios en el sueno: dificultad para conciliarlo, despertarse varias veces o, al contrario, dormir mucho mas de lo habitual. El sueno tambien se ve afectado por el estres, los horarios y la salud fisica, por eso esta pregunta no se interpreta sola.	**Casi todos los dias** Estuvo presente casi a diario durante las ultimas dos semanas. Suma 3 puntos.
4. Sentirse cansado/a o tener poca energia	Explora si has sentido cansancio o falta de energia para las tareas del dia a dia, incluso sin haber hecho un gran esfuerzo. El cansancio puede tener muchas causas (descanso insuficiente, carga de trabajo, condiciones de salud).	**Casi todos los dias** Estuvo presente casi a diario durante las ultimas dos semanas. Suma 3 puntos.
5. Poco apetito o comer en exceso	Explora cambios en tu forma habitual de comer: perder el apetito o comer mas de lo normal. La pregunta se refiere al cambio respecto a lo que es habitual para ti, no a la cantidad ni al tipo de comida.	**Casi todos los dias** Estuvo presente casi a diario durante las ultimas dos semanas. Suma 3 puntos.
6. Sentirse mal consigo mismo/a o sentir que ha decepcionado a otros	Explora como te has juzgado a ti mismo/a: sentirte un fracaso, culparte en exceso o sentir que has defraudado a tu familia o a personas importantes. Recoge como te has sentido contigo mismo/a, independientemente de si otras personas piensan lo mismo.	**Casi todos los dias** Estuvo presente casi a diario durante las ultimas dos semanas. Suma 3 puntos.
7. Dificultad para concentrarse en actividades como leer o ver television	Explora si te ha costado mantener la atencion en tareas sencillas, como leer, ver una serie o seguir una conversacion. La concentracion tambien depende del sueno, del estres y de otros factores del dia a dia.	**Casi todos los dias** Estuvo presente casi a diario durante las ultimas dos semanas. Suma 3 puntos.

Pregunta del cuestionario	Que busca explorar	Tu respuesta y que significa
8. Moverse o hablar tan despacio que otras personas lo notan, o estar muy inquieto/a	Explora si tu cuerpo o tu ritmo al hablar han cambiado de forma visible: mas lentos de lo normal o, al contrario, con una inquietud que te lleva a moverte mas de lo habitual. Se refiere a cambios que otras personas podrian notar.	**Casi todos los dias** Estuvo presente casi a diario durante las ultimas dos semanas. Suma 3 puntos.
9. Pensamientos de que estaria mejor muerto/a o de hacerse dano de alguna manera	Explora si, en las ultimas dos semanas, han aparecido pensamientos de que seria mejor no estar vivo/a o de hacerse dano. Es la unica pregunta que activa un aviso especial en este informe: si marcaste cualquier opcion distinta de "Ningun dia", te recomendamos hablar pronto con una persona de confianza o comunicarte con las lineas de apoyo del recuadro de atencion prioritaria.	**Casi todos los dias** Estuvo presente casi a diario durante las ultimas dos semanas. Suma 3 puntos. Esta respuesta activa el aviso de atencion prioritaria: te recomendamos hablar pronto con una persona de confianza o con las lineas de apoyo.

4. Que Significa Cada Pregunta: GAD-7 (Tension y Ansiedad)

El GAD-7 reune siete preguntas sobre nerviosismo, preocupacion, dificultad para relajarse, inquietud, irritabilidad y miedo anticipatorio; su puntaje total va de 0 a 21 [2]. Igual que en el cuestionario anterior, se explica que busca explorar cada pregunta y se muestra la frecuencia que marcaste.

Pregunta del cuestionario	Que busca explorar	Tu respuesta y que significa
1. Sentirse nervioso/a, intranquilo/a o con los nervios de punta	Explora si has sentido nerviosismo, tension o una sensacion de estar "al limite" durante las ultimas dos semanas. Es la forma mas general de preguntar por la ansiedad: una inquietud interna, con o sin un motivo claro.	**Casi todos los dias** Estuvo presente casi a diario durante las ultimas dos semanas. Suma 3 puntos.
2. No poder dejar de preocuparse o no poder controlar la preocupacion	Explora si las preocupaciones te han parecido dificiles de detener, como pensamientos que vuelven una y otra vez aunque quieras dejar de pensar en ellos.	**Casi todos los dias** Estuvo presente casi a diario durante las ultimas dos semanas. Suma 3 puntos.
3. Preocuparse demasiado por diferentes cosas	Explora si tus preocupaciones han estado repartidas en varios temas a la vez (salud, estudios, dinero, familia, futuro) y no solo en una situacion concreta. Preocuparse es normal; la pregunta mira si ha sido mas de lo que consideras habitual para ti.	**Casi todos los dias** Estuvo presente casi a diario durante las ultimas dos semanas. Suma 3 puntos.
4. Dificultad para relajarse	Explora si te ha costado descansar y soltar la tension, incluso en momentos tranquilos o durante tu tiempo libre.	**Casi todos los dias** Estuvo presente casi a diario durante las ultimas dos semanas. Suma 3 puntos.
5. Estar tan inquieto/a que es dificil permanecer sentado/a	Explora la inquietud del cuerpo: sentir que no puedes quedarte quieto/a, la necesidad de moverte, caminar o cambiar de posicion con frecuencia.	**Casi todos los dias** Estuvo presente casi a diario durante las ultimas dos semanas. Suma 3 puntos.
6. Molestarse o ponerse irritable facilmente	Explora si has estado de mal genio o con poca paciencia, con reacciones de molestia mas rapidas de lo habitual. La irritabilidad tambien puede ser una forma en que se expresa la tension emocional.	**Casi todos los dias** Estuvo presente casi a diario durante las ultimas dos semanas. Suma 3 puntos.
7. Sentir miedo como si algo terrible pudiera pasar	Explora si has tenido la sensacion de que algo malo iba a ocurrir, un presentimiento de peligro o de que algo terrible podia pasar, aun cuando no hubiera una razon clara.	**Casi todos los dias** Estuvo presente casi a diario durante las ultimas dos semanas. Suma 3 puntos.

5. Orientacion y Recomendaciones Institucionales

Pautas de atencion y acompanamiento profesional segun niveles observados:

Indicador de animo y vitalidad (PHQ-9): El nivel observado indica un grado alto de malestar e interferencia en las actividades habituales. Es altamente prioritario solicitar acompanamiento profesional calificado en tu EPS o centro de salud, o acercarte a una consulta prioritaria para recibir orientacion adecuada.

Indicador de tension y preocupacion (GAD-7): Se observa un nivel alto de tension y preocupacion que puede limitar el desarrollo de tus actividades. Se recomienda fuertemente buscar una valoracion oportuna por medicina general o psicologia clinica a traves de tu entidad de salud.

Ruta institucional de atencion recomendada: Puedes solicitar cita de valoracion inicial por medicina general en tu entidad promotora de salud (EPS) o bienestar universitario para gestionar la remision a psicologia, o consultar los servicios de salud comunitarios de tu municipio.

6. Psicoeducacion General y Perspectivas de Acompanamiento

El malestar psicologico y emocional no responde a formulas fijas ni se reduce a una medicion numerica; es una experiencia humana ligada a historias de vida, contextos cotidianos y momentos singulares. Para su comprension y acompanamiento existen diversas perspectivas profesionales y terapeuticas con fundamento solido (entre ellas la cognitiva, la psicodinamica, la humanista y la sistemica). Este cribado no privilegia ni prescribe una orientacion especifica, ni deduce juicios sobre la personalidad a partir de los puntajes obtenidos.

7. Sobre este Cribado (Alcances, Metodologia y Limites)

Los cuestionarios PHQ-9 y GAD-7 son herramientas breves de tamizaje utilizadas internacionalmente para evaluar la presencia y frecuencia de manifestaciones vinculadas al animo, la vitalidad y la tension durante las ultimas dos semanas. Su funcion es exclusivamente orientativa y preventiva: permiten identificar si amerita consultar con un profesional de la salud, pero no determinan la presencia de un trastorno ni reemplazan la evaluacion integral, el criterio profesional ni la atencion en servicios de urgencias.

• **Marco temporal:** Las preguntas evaluan de manera exclusiva las manifestaciones experimentadas en las ultimas dos semanas.
• **No es un diagnostico:** Unicamente un profesional de la salud debidamente acreditado puede diagnosticar despues de una evaluacion clinica integral.
• **No reemplaza servicios de emergencia:** Ante urgencias de salud mental o riesgo vital, debe acudirse de inmediato a una institucion hospitalaria.
• **Autonomia del usuario:** Los resultados presentados son de caracter informativo y no son compartidos con terceros sin tu autorizacion expresa.

Origen y validacion de los cuestionarios: el PHQ-9 fue presentado por Kroenke, Spitzer y Williams en 2001 como una medida breve de la severidad de los sintomas depresivos [1], a partir de un cuestionario mas amplio pensado para la atencion primaria [5]. El GAD-7 fue desarrollado por Spitzer, Kroenke, Williams y Lowe en 2006 como una medida breve de ansiedad [2]. En Colombia, la version en espanol del PHQ-9 cuenta con un estudio de validacion en atencion primaria en Bucaramanga [3], y el GAD-7 con un estudio de validez y confiabilidad en profesionales medicos colombianos [4]. Estos estudios describen como funcionan los cuestionarios en esas poblaciones; no reemplazan la valoracion de un profesional.

Nota informativa: *Este resultado es orientativo. No mide todas las situaciones de salud mental (por ejemplo duelo, estres, trauma o consumo de sustancias) y un puntaje bajo no invalida como te sientes.*

8. Referencias Bibliograficas

[1] Kroenke K, Spitzer RL, Williams JBW. The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. J Gen Intern Med. 2001;16(9):606-613. doi:10.1046/j.1525-1497.2001.016009606.x

[2] Spitzer RL, Kroenke K, Williams JBW, Löwe B. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Arch Intern Med. 2006;166(10):1092-1097. doi:10.1001/archinte.166.10.1092

[3] Cassiani-Miranda CA, Cuadros-Cruz AK, Torres-Pinzón H, Scoppetta O, Pinzón-Tarrazona JH, López-Fuentes WY, et al. Validez del Cuestionario de salud del paciente-9 (PHQ-9) para cribado de depresión en adultos usuarios de Atención Primaria en Bucaramanga, Colombia. Rev Colomb Psiquiatr. 2021;50(1):11-21.

[4] Camargo L, Herrera-Pino J, Shelach S, Soto-Añari M, Porto MF, Alonso M, et al. Escala de ansiedad generalizada GAD-7 en profesionales médicos colombianos durante pandemia de COVID-19: validez de constructo y confiabilidad. Rev Colomb Psiquiatr. 2023;52:245-250.

[5] Spitzer RL, Kroenke K, Williams JBW. Validation and utility of a self-report version of PRIME-MD: the PHQ Primary Care Study. JAMA. 1999;282(18):1737-1744. doi:10.1001/jama.282.18.1737