Table 1: Propensity scores calculated for mother's smoking status

| | Mother Tobacco-Use Status | |
| --- | --- | --- |
| | (1) | (2) |
| Mother's Race not White or Black | −1.956*** | −1.954*** |
| | (0.134) | (0.133) |
| Mother's Years of Education | −0.817*** | −0.818*** |
| | (0.028) | (0.028) |
| Marital status | −0.205*** | −0.204*** |
| | (0.005) | (0.005) |
| Father's age | −1.256*** | −1.251*** |
| | (0.022) | (0.021) |
| Father's Years of Education | 0.029*** | 0.030*** |
| | (0.002) | (0.001) |
| Father Mexican | −0.131*** | −0.131*** |
| | (0.005) | (0.005) |
| Father Puerto Rican | −1.961*** | −1.957*** |
| | (0.173) | (0.173) |
| Father Cuban | −1.267*** | −1.268*** |
| | (0.058) | (0.058) |
| Father Central or South American | −0.567 | −0.567 |
| | (0.364) | (0.364) |
| Father Race Other or Unknown Hispanic | −1.933*** | −1.932*** |
| | (0.205) | (0.205) |
| Plurality of Infant | −0.890*** | −0.889*** |
| | (0.120) | (0.120) |
| Sex of Infant | −0.148*** | |
| | (0.054) | |
| Mother's age | −0.019 | |
| | (0.017) | |
| dmage | 0.003 | |
| | (0.002) | |
| Constant | 2.873*** | 2.707*** |
| | (0.088) | (0.064) |
| N | 114,610 | 114,610 |
| Log Likelihood | -44,310.690 | -44,315.790 |
| Akaike Inf. Crit. | 88,651.370 | 88,655.580 |

| Notes: | ***Significant at the 1 percent level. |
| --- | --- |
| | **Significant at the 5 percent level. |
| | *Significant at the 10 percent level. |