

UFV- CCE - DET
EST 105 - 3ª avaliação - 1º semestre de 2017 - 01/julho/17

Nome: _____ Matrícula: _____

Assinatura: _____. Favor apresentar documento com foto.

- São 7 questões, tabelas e formulário em páginas numeradas de 1 a 11, total de 40 pontos, FAVOR CONFERIR ANTES DE INICIAR.
- ATENÇÃO: Assinale (X) em qual turma está matriculado (sua nota será divulgada no sistema SAPIENS).

TURMA		HORÁRIO		SALA	PROFESSOR

()	T1	3ª 08-10	5ª 10-12	PVB300 Cecon
()	T2	3ª 10-12	6ª 8-10	PVB109 Moysés
()	T3	3ª 14-16	5ª 16-18	PVB109 Camila/Carol
()	T4	2ª 14-16	4ª 16-18	PVB107 Carol
()	T5	3ª 20:30-22:10	6ª 18:30-20:10	PVB204 Eduardo
()	T6	4ª 14-16	6ª 16-18	PVA361 CHOS - coordenador
()	T7	2ª 16-18	5ª 14-16	PVB307 Camila
()	T10	2ª 18:30-20:10	4ª 20:30-22:10	PVA361 Eduardo
()	T20=EST085	T1 2ª 16	PVA134,T2 2ª 18:30	PVA348(Leísa, monitor II)

- Interpretar corretamente as questões é parte da avaliação, portanto não é permitido questionamentos durante a prova !
- É OBRIGATÓRIO APRESENTAR OS CÁLCULOS organizadamente, para ter direito à revisão.
- PODE UTILIZAR A CALCULADORA, porém mostre os valores utilizados na fórmula.
- BOA SORTE e BOA PROVA !!!

FORMULÁRIO

Para $k = 1, 2, \dots, n < \infty$ $E(X^k) = \sum_x x^k P(x)$ ou $E(X^k) = \int x^k f(x) dx$

$$E(XY) = \sum_x \sum_y xy P(x, y) \quad \text{ou} \quad E(XY) = \int \int xy f(x, y) dx dy$$

$$COV(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y), \quad \rho_{X,Y} = \frac{COV(X, Y)}{\sqrt{V(X)V(Y)}}, \quad V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Para a, b e c constantes finitas, X e Y variáveis aleatórias,

$$\begin{aligned} E(aX - bY + c) &= aE(X) - bE(Y) + c \\ V(aX - bY + c) &= a^2V(X) + b^2V(Y) - 2abCOV(X, Y) \end{aligned}$$

$$P(X = x) = \binom{N}{x} p^x (1-p)^{N-x} \quad E(X) = Np \quad V(X) = Np(1-p) \quad \binom{N}{x} = \frac{N!}{x!(N-x)!}$$

$$P(X = x) = \frac{e^{-m} m^x}{x!} \quad E(X) = V(X) = m$$

$$X \sim N(\mu; \sigma^2) \implies Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

$$\bar{X} \sim N\left(\mu; \frac{\sigma^2}{n}\right) \implies Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \quad S_X^2 = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2}{n}}{n-1}$$

$$\chi_n^2 = \sum_{i=1}^h \sum_{j=1}^k \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \quad n = (h-1)(k-1)$$

$$t_\nu = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{s^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \quad s^2 = \frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

$$\nu = \text{Graus de liberdade} = n_1 + n_2 - 2$$

Tabela 1: Áreas de uma distribuição normal padrão entre $z=0$ e um valor positivo de z . As áreas para os valores de z negativos são obtidas por simetria.

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2703	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890
2,3	0,4893	0,4896	0,4898	0,4901	0,4904	0,4906	0,4909	0,4911	0,4913	0,4916
2,4	0,4918	0,4920	0,4922	0,4925	0,4927	0,4929	0,4931	0,4932	0,4934	0,4936
2,5	0,4938	0,4940	0,4941	0,4943	0,4945	0,4946	0,4948	0,4949	0,4951	0,4952
2,6	0,4953	0,4955	0,4956	0,4957	0,4959	0,4960	0,4961	0,4962	0,4963	0,4964
2,7	0,4965	0,4966	0,4967	0,4968	0,4969	0,4970	0,4971	0,4972	0,4973	0,4974
2,8	0,4974	0,4975	0,4976	0,4977	0,4977	0,4978	0,4979	0,4979	0,4980	0,4981
2,9	0,4981	0,4982	0,4982	0,4983	0,4984	0,4984	0,4985	0,4985	0,4986	0,4986
3,0	0,4987	0,4987	0,4987	0,4988	0,4988	0,4989	0,4989	0,4989	0,4990	0,4990

Tabela 2: Valores χ^2 na distribuição de qui-quadrado com n graus de liberdade tais que $P(\chi_n^2 \geq \chi^2) = p \times 100\%$.

n	p=99%	98%	97,5%	95%	90%	80%	70%	50%	30%	20%	10%	5%	4%	2,5%	2%	1%	0,2%	0,1%	n
1	0,0 ³ 16	0,0 ³ 63	0,001	0,004	0,016	0,064	0,148	0,455	1,074	1,642	2,706	3,841	4,218	5,024	5,412	6,635	9,550	10,827	1
2	0,020	0,040	0,051	0,103	0,211	0,446	0,713	1,386	2,408	3,219	4,605	5,991	6,438	7,378	7,824	9,210	12,429	13,815	2
3	0,115	0,185	0,216	0,352	0,584	1,005	1,424	2,366	3,665	4,642	6,251	7,815	8,311	9,348	9,837	11,345	14,796	16,266	3
4	0,297	0,429	0,484	0,711	1,064	1,649	2,195	3,357	4,878	5,989	7,779	9,488	10,026	11,143	11,668	13,277	16,924	18,467	4
5	0,554	0,752	0,831	1,145	1,610	2,343	3,000	4,351	6,064	7,289	9,236	11,070	11,644	12,832	13,388	15,086	18,907	20,515	5
6	0,872	1,134	1,237	1,635	2,204	3,070	3,828	5,348	7,231	8,558	10,645	12,592	13,198	14,449	15,033	16,812	20,791	22,457	6
7	1,239	1,564	1,690	2,167	2,833	3,822	4,671	6,346	8,383	9,803	12,017	14,067	14,703	16,013	16,622	18,475	22,601	24,322	7
8	1,646	2,032	2,180	2,733	3,490	4,594	5,527	7,344	9,524	11,030	13,362	15,507	16,171	17,534	18,168	20,090	24,352	26,125	8
9	2,088	2,532	2,700	3,325	4,168	5,380	6,393	8,343	10,656	12,242	14,684	16,919	17,608	19,023	19,679	21,666	26,056	27,877	9
10	2,558	3,059	3,247	3,940	4,865	6,179	7,267	9,342	11,781	13,442	15,987	18,307	19,021	20,483	21,161	23,209	27,722	29,588	10
11	3,053	3,609	3,816	4,575	5,578	6,989	8,148	10,341	12,899	14,631	17,275	19,675	20,412	21,920	22,618	24,725	29,354	31,264	11
12	3,571	4,178	4,404	5,226	6,304	7,807	9,034	11,340	14,011	15,812	18,549	21,026	21,785	23,337	24,054	26,217	30,957	32,909	12
13	4,107	4,765	5,009	5,892	7,042	8,634	9,926	12,340	15,119	16,985	19,812	22,362	23,142	24,736	25,472	27,688	32,535	34,528	13
14	4,660	5,368	5,629	6,571	7,790	9,467	10,821	13,339	16,222	18,151	21,064	23,685	24,485	26,119	26,873	29,141	34,091	36,123	14
15	5,229	5,985	6,262	7,261	8,547	10,307	11,721	14,339	17,322	19,311	22,307	24,996	25,816	27,488	28,259	30,578	35,628	37,697	15
16	5,812	6,614	6,908	7,962	9,312	11,152	12,624	15,338	18,418	20,465	23,542	26,296	27,136	28,845	29,633	32,000	37,146	39,252	16
17	6,408	7,255	7,564	8,672	10,085	12,002	13,531	16,338	19,511	21,615	24,769	27,587	28,445	30,191	30,995	33,409	38,648	40,790	17
18	7,015	7,906	8,231	9,390	10,865	12,857	14,440	17,338	20,601	22,760	25,989	28,869	29,745	31,526	32,346	34,805	40,136	42,312	18
19	7,633	8,567	8,906	10,117	11,651	13,716	15,352	18,338	21,689	23,900	27,204	30,144	31,037	32,852	33,687	36,191	41,610	43,820	19
20	8,260	9,237	9,591	10,851	12,443	14,578	16,266	19,337	22,775	25,038	28,412	31,410	32,321	34,170	35,020	37,566	43,072	45,315	20
21	8,897	9,915	10,283	11,591	13,240	15,445	17,182	20,337	23,858	26,171	29,615	32,671	33,597	35,479	36,343	38,932	44,522	46,797	21
22	9,542	10,600	10,982	12,338	14,041	16,314	18,101	21,337	24,939	27,301	30,813	33,924	34,867	36,781	37,659	40,289	45,962	48,268	22
23	10,196	11,293	11,688	13,091	14,848	17,187	19,021	22,337	26,018	28,429	32,007	35,172	36,131	38,076	38,968	41,638	47,391	49,728	23
24	10,856	11,992	12,401	13,848	15,659	18,062	19,943	23,337	27,096	29,553	33,196	36,415	37,389	39,364	40,270	42,980	48,812	51,179	24
25	11,524	12,697	13,120	14,611	16,473	18,940	20,867	24,337	28,172	30,675	34,382	37,652	38,642	40,646	41,566	44,314	50,223	52,620	25
26	12,198	13,409	13,844	15,379	17,292	19,820	21,792	25,336	29,246	31,795	35,563	38,885	39,889	41,923	42,856	45,642	51,627	54,052	26
27	12,879	14,125	14,573	16,151	18,114	20,703	22,719	26,336	30,319	32,912	36,741	40,113	41,132	43,194	44,140	46,963	53,022	55,476	27
28	13,565	14,847	15,308	16,928	18,939	21,588	23,647	27,336	31,319	34,027	37,916	41,337	42,370	44,461	45,419	48,278	54,411	56,893	28
29	14,256	15,574	16,047	17,708	19,768	22,475	24,577	28,336	32,461	35,139	39,087	42,557	43,604	45,722	46,693	49,588	55,792	58,302	29
30	14,953	16,306	16,791	18,493	20,599	23,364	25,508	29,336	33,530	36,250	40,256	43,773	44,834	46,979	47,962	50,892	57,167	59,703	30
n	p=99%	98%	97,5%	95%	90%	80%	70%	50%	30%	20%	10%	5%	4%	2,5%	2%	1%	0,2%	0,1%	n

Tabela 3: Valores positivos t na distribuição t_n de Student com n graus de liberdade em níveis de 10% a 0,1% de probabilidade = $2 \times P(t_n \geq t)$, tabela bilateral.

n	nível de probabilidade bilateral					
	10%	5%	2%	1%	0,5%	0,1%
1	6,31	12,71	31,82	63,66	127,32	636,62
2	2,92	4,30	6,97	9,92	14,09	31,60
3	2,35	3,18	4,54	5,84	7,45	12,94
4	2,13	2,78	3,75	4,60	5,60	8,61
5	2,02	2,57	3,37	4,03	4,77	6,86
6	1,94	2,45	3,14	3,71	4,32	5,96
7	1,90	2,36	3,10	3,50	4,03	5,41
8	1,86	2,31	2,90	3,36	3,83	5,04
9	1,83	2,26	2,82	3,25	3,69	4,78
10	1,81	2,23	2,76	3,17	3,58	4,59
11	1,80	2,20	2,72	3,11	3,50	4,44
12	1,78	2,18	2,68	3,06	3,43	4,32
13	1,77	2,16	2,65	3,01	3,37	4,22
14	1,76	2,14	2,62	2,98	3,33	4,14
15	1,75	2,13	2,60	2,95	3,29	4,07
16	1,75	2,12	2,58	2,92	3,25	4,02
17	1,74	2,11	2,57	2,90	3,22	3,97
18	1,73	2,10	2,55	2,88	3,20	3,92
19	1,73	2,09	2,54	2,86	3,17	3,88
20	1,73	2,09	2,53	2,84	3,15	3,85
21	1,72	2,08	2,52	2,83	3,14	3,82
22	1,72	2,07	2,51	2,82	3,12	3,79
23	1,71	2,07	2,50	2,81	3,10	3,77
24	1,71	2,06	2,49	2,80	3,09	3,75
25	1,71	2,06	2,49	2,79	3,08	3,73
26	1,71	2,06	2,48	2,78	3,07	3,71
27	1,70	2,05	2,47	2,77	3,06	3,69
28	1,70	2,05	2,47	2,76	3,05	3,67
29	1,70	2,04	2,46	2,76	3,04	3,66
30	1,70	2,04	2,46	2,75	3,03	3,65
40	1,68	2,02	2,42	2,70	2,97	3,55
60	1,67	2,00	2,39	2,66	2,92	3,46
120	1,65	1,98	2,36	2,62	2,86	3,37
∞	1,65	1,96	2,33	2,58	2,81	3,29

1.(5 pontos) Seja (X, Y) uma variável aleatória discreta bidimensional com distribuição conjunta de probabilidades dada na tabela a seguir. Pede-se: calcule $COV(X, Y)$, a covariância entre as variáveis X e Y .

X	Y		
	0	1	2
0	0,20	0,12	0,08
1	0,30	0,18	0,12

Note que

$$P(x, y) = P(x) \cdot P(y), \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2,$$

logo X e Y são independentes, e desta forma $\text{cov}(X, Y) = 0$.

Ou

$$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$E(X) = \sum xP(x) = 0 \cdot 0,40 + 1 \cdot 0,60 = 0,60$$

$$E(Y) = \sum yP(y) = 0 \cdot 0,50 + 1 \cdot 0,30 + 2 \cdot 0,20 = 0,70$$

$$E(XY) = \sum \sum xyP(x, y) = 1 \cdot 1 \cdot 0,18 + 1 \cdot 2 \cdot 0,12 = 0,42$$

$$\text{cov}(X, Y) = 0,42 - 0,60 \cdot 0,70 = 0,42 - 0,42 = 0$$

2.(5 pontos) Seja (X, Y) uma variável aleatória contínua bidimensional com a seguinte função densidade de probabilidade conjunta,

$$f(x, y) = \begin{cases} K(x + y) & , \quad 0 \leq x \leq 1 \text{ e } 0 \leq y \leq 2 \\ 0 & , \quad \text{outros valores} \end{cases}$$

Pede-se: calcule o valor da constante K .

Como $f(x, y)$ é uma f.d.p. conjunta devemos ter

i) $f(x, y) \geq 0$ para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, logo $K \geq 0$; e

ii) $1 = \int_0^2 \int_0^1 K(x + y) dx dy$.

De ii) segue que

$$\begin{aligned} 1 &= \int_0^2 \int_0^1 K(x + y) dx dy = K \int_0^2 \int_0^1 (x + y) dx dy = K \int_0^2 \left(\frac{x^2}{2} + xy \right) \Big|_{x=0}^1 dy \\ &= K \int_0^2 \left(\frac{1}{2} + y \right) dy = K \left(\frac{y}{2} + \frac{y^2}{2} \right) \Big|_{y=0}^2 = K(1 + 2) = 3K \end{aligned}$$

$$3K = 1 \Rightarrow K = \frac{1}{3}$$

3.(8 pontos) Sejam X e Y duas variáveis aleatórias tais que,

$$E(X) = 0,50 \quad V(X) = 0,25 \quad E(Y) = 1,2 \quad V(Y) = 0,56 \quad \text{e} \quad COV(X, Y) = -0,20.$$

Seja W uma variável aleatória definida como,

$$W = \frac{X}{2} - 5Y + 1$$

Pede-se:

a.(4 pts) O valor médio de W .

$$\begin{aligned} E(W) &= \frac{1}{2}E(X) - 5E(Y) + 1 \\ &= \frac{1}{2} \cdot 0,50 - 5 \cdot 1,2 + 1 = 0,25 - 6 + 1 \\ &= -4,75 \end{aligned}$$

b.(4 pts) A variância de W .

$$\begin{aligned} \text{var}(W) &= \text{var}\left(\frac{X}{2} - 5Y\right) \\ &= \frac{1}{4}\text{var}(X) + 25\text{var}(Y) - 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot \text{cov}(X, Y) \\ &= \frac{1}{4} \cdot 0,25 + 25 \cdot 0,56 - 5 \cdot (-0,20) = 0,0625 + 14 + 1 \\ &= 15,0625 \end{aligned}$$

4.(5 pontos) Uma tecelagem produz diariamente 600 metros de tecido com um processo de produção que resulta em média um defeito a cada 500 metros de tecido. Se for considerada a produção de 20 dias, utilize o modelo Poisson para calcular em quantos destes dias espera-se uma produção diária com nenhum (zero) defeito no tecido.

Seja X : “número de defeitos em 600 metros”. Queremos determinar $P[X = 0]$. Se é esperado 1 defeito a cada 500m então espera-se $600/500=1,2$ defeitos em 600m (regra de três), desta forma:

$$\begin{aligned} P[X = 0] &= \frac{e^{-1,2} 1,2^0}{0!} = \frac{0,3012 \times 1}{1} \\ &= 0,3012. \end{aligned}$$

A probabilidade de zero defeitos em 600m por Poisson é igual a 0,3012 ou 30,12%. Portanto em 30,12% dos 20 dias espera-se nenhum defeito, isto é, espera-se nenhum defeito em $20 \cdot 0,3012 = 6,0239 \approx 6$ dias.

5.(5 pontos) Admita que o tempo de execução de uma tarefa por um funcionário, em uma linha de montagem, seja uma variável aleatória normalmente distribuída com média igual a 25 minutos e desvio padrão 3 minutos. Se 200 funcionários executam tal tarefa, quantos funcionários espera-se que executem a tarefa com um tempo máximo de 28,51 minutos? Calcule com base no modelo normal.


Temos que $X \sim N(\mu = 25; \sigma^2 = 9)$.

$$\begin{aligned} P[X < 28,51] &= P\left[\frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{28,51 - 25}{3}\right] \\ &= P[Z < 1,17] = 0,5 + P[0 \leq Z \leq -1,17] \\ &= 0,5 + 0,379 \\ &= 0,879. \end{aligned}$$

Desta maneira, $P[X < 28,51] = 0,879$ ou 87,9% de 200 dias. Logo, espera-se que

$$200 \cdot 0,879 = 175,8 \approx 176$$

dos 200 funcionários executem a tarefa com um tempo máximo de 28,51 minutos.



6.(6 pontos) Os dados (frequências observadas no estudo) apresentados na tabela a seguir sugerem que a exposição aos raios UVA e UVB no período entre 11:00 e 15:00h (fator de risco) e o câncer de pele facial (doença), sejam independentes? Responda com base em um teste de hipótese a 1% conforme os itens a seguir.

Exposição	Câncer de Pele	
	SIM	NÃO
SIM	37	13
NÃO	17	53

a.(2 pts) Valor tabelado.

$$\nu = (2 - 1)(2 - 1) = 1 \text{ e } \chi_{\text{tab}}^2 = \chi_{(1;1\%)}^2 = 6,635$$

b.(2 pts) Estatística do teste (valor calculado).


Câncer de Pele	Exposição		Total
	SIM	NÃO	
SIM	37(22,5)	13(27,5)	(50)
NÃO	17(31,5)	53(38,5)	(70)
	(54)	(66)	(120)

$$\begin{aligned}\chi_{\text{cal}}^2 &= \frac{(37 - 22,5)^2}{22,5} + \frac{(13 - 27,5)^2}{27,5} + \frac{(17 - 31,5)^2}{31,5} + \frac{(53 - 38,5)^2}{38,5} \\ &= 9,3444 + 7,6455 + 6,6746 + 5,461 \\ &\cong 29,1255\end{aligned}$$

c.(2 pts) Decisão quanto à hipótese de nulidade e também o que deve ser concluído em termos da ocorrência da doença e o fator de risco.

$$\begin{cases} H_0 : & \text{Exposição e Câncer de Pele são independentes} \\ H_1 : & \text{Exposição e Câncer de Pele não são independentes} \end{cases}$$

Como $\chi_{\text{cal}}^2 \in RRH_0$, rejeitamos H_0 ao nível de 1% de significância. Desta forma, há indícios que Exposição e Câncer de Pele não são variáveis independentes, e possuem algum tipo de relação.



7.(6 pontos) O teste de impacto (crash test) consiste no impacto de veículos automotores contra barreiras indeformáveis (blocos de concreto ou ferro) ou deformáveis (bloco deformável metálico). Tem por objetivo avaliar a segurança automotiva para verificar se cumprem determinadas normas de segurança de proteção à colisão em situações de acidente de trânsito. Duas amostras aleatórias de tamanhos $n_A = 6$ e $n_B = 8$, de veículos com acessórios de segurança das classes A e B, foram avaliados. O objetivo era verificar se os valores médios dos danos podem ser considerados iguais ($H_0 : \mu_A = \mu_B$) ou se devemos considerar os acessórios da condição A melhores ($H_1 : \mu_A < \mu_B$). Um resumo dos resultados é apresentado na tabela a seguir. Conclua com base em um teste de hipóteses a $\alpha = 5\%$ conforme os itens abaixo.

Classe	Média	Variância
A	67,10	400
B	84,93	361

a.(2 pts) Valor tabelado.

$$\nu = 6 + 8 - 2 = 12 \text{ e } t_{\text{tab}} = t_{(12;5\%)} = 1,78.$$


b.(2 pts) Estatística do teste (valor calculado).

Temos que

$$\begin{aligned}\bar{X}_A &= 67,1, \\ \bar{X}_B &= 84,93, \\ S_A^2 &= (20)^2 = 400, \\ S_B^2 &= (19)^2 = 361, \\ S_c^2 &= \frac{(6-1) \times 400 + (8-1) \times 361}{6+8-2} \\ &= \frac{4527}{12} = 377,25,\end{aligned}$$

$$t_{\text{cal}} = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{\sqrt{S_c^2 \left(\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B} \right)}} = \frac{67,1 - 84,93}{\sqrt{377,25 \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{8} \right)}} = \frac{-17,83}{10,4896} = -1,7.$$

c.(2 pts) Decisão quanto à hipótese de nulidade e também o que deve ser concluído em termos de qual classe de acessórios de segurança deve ser considerada melhor.



Como $t_{\text{cal}} \in RNRH_0$, não há indícios para rejeitarmos H_0 ao nível de 5% de significância. Desta forma, o valor médio dos danos é estatisticamente o mesmo para os dois grupos e, portanto, a diferença observada nas médias das amostras é resultado de uma variação ao acaso.