



# Estatística I

---

Prof. Fernando de Souza Bastos  
fernando.bastos@ufv.br

Departamento de Estatística  
Universidade Federal de Viçosa  
Campus UFV - Viçosa

Modelos Probabilísticos

Distribuição Uniforme Discreta

Distribuição Bernoulli

Distribuição Binomial

Distribuição de Poisson

# Modelos Probabilísticos

---

# Modelos Probabilísticos

Algumas variáveis aleatórias adaptam-se muito bem a uma série de problemas práticos. Portanto, um estudo pormenorizado dessas variáveis é de grande importância para a construção de modelos probabilísticos para situações reais e a consequente estimação de seus parâmetros. Para algumas dessas distribuições existem tabelas que facilitam o cálculo de probabilidades, em função de seus parâmetros. Nesta seção iremos estudar alguns desses modelos, procurando enfatizar as condições em que eles aparecem, suas funções de probabilidade, parâmetros e como calcular probabilidades.

# Distribuição Uniforme Discreta

---

# Distribuição Uniforme Discreta


Este é o caso mais simples de v.a. discreta, em que cada valor possível ocorre com a mesma probabilidade.

**Definição:** A v.a. discreta  $X$ , assumindo os valores  $x_1, \dots, x_k$ , tem distribuição uniforme se, e somente se,

$$P(X = x_i) = p(x_i) = \frac{1}{k}, \quad \forall \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

É fácil verificar que,

$$E(X) = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k x_i, \quad \text{Var}(x) = \frac{1}{k} \left\{ \sum_{i=1}^k x_i^2 - \frac{\left( \sum_{i=1}^k x_i \right)^2}{k} \right\}$$



**Figura 1:** Distribuição uniforme discreta.



# Exemplo

Seja  $X$  a v.a. que indica o “número de pontos marcados na face superior de um dado”, quando ele é lançado. Obtemos na Tabela abaixo a distribuição de  $X$ .

$x$	1	2	3	4	5	6	Total
$p(x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	1

Notemos que

$$E(X) = 3,5 \quad \text{e} \quad V(X) = 2,9$$

# Distribuição Bernoulli

---

# Distribuição Bernoulli

Muitos experimentos são tais que os resultados apresentam ou não uma determinada característica. Por exemplo:

1. uma moeda é lançada: o resultado ou é cara, ou não (ocorrendo, então, coroa);

# Distribuição Bernoulli

Muitos experimentos são tais que os resultados apresentam ou não uma determinada característica. Por exemplo:

1. uma moeda é lançada: o resultado ou é cara, ou não (ocorrendo, então, coroa);
2. um dado é lançado: ou ocorre face 5 ou não (ocorrendo, então, uma das faces 1, 2, 3, 4 ou 6);

# Distribuição Bernoulli

Muitos experimentos são tais que os resultados apresentam ou não uma determinada característica. Por exemplo:

1. uma moeda é lançada: o resultado ou é cara, ou não (ocorrendo, então, coroa);
2. um dado é lançado: ou ocorre face 5 ou não (ocorrendo, então, uma das faces 1, 2, 3, 4 ou 6);
3. uma peça é escolhida ao acaso de um lote contendo 500 peças: essa peça é defeituosa ou não;

# Distribuição Bernoulli

Muitos experimentos são tais que os resultados apresentam ou não uma determinada característica. Por exemplo:

1. uma moeda é lançada: o resultado ou é cara, ou não (ocorrendo, então, coroa);
2. um dado é lançado: ou ocorre face 5 ou não (ocorrendo, então, uma das faces 1, 2, 3, 4 ou 6);
3. uma peça é escolhida ao acaso de um lote contendo 500 peças: essa peça é defeituosa ou não;
4. uma pessoa escolhida ao acaso dentre 1.000 é ou não do sexo masculino;

# Distribuição Bernoulli

Muitos experimentos são tais que os resultados apresentam ou não uma determinada característica. Por exemplo:

1. uma moeda é lançada: o resultado ou é cara, ou não (ocorrendo, então, coroa);
2. um dado é lançado: ou ocorre face 5 ou não (ocorrendo, então, uma das faces 1, 2, 3, 4 ou 6);
3. uma peça é escolhida ao acaso de um lote contendo 500 peças: essa peça é defeituosa ou não;
4. uma pessoa escolhida ao acaso dentre 1.000 é ou não do sexo masculino;

Em todos esses casos, estamos interessados na ocorrência de sucesso (cara, face 5 etc.) ou fracasso (coroa, face diferente de 5 etc.). Essa terminologia (sucesso e fracasso) será usada freqüentemente.



Em todos esses casos, estamos interessados na ocorrência de sucesso (cara, face 5 etc.) ou fracasso (coroa, face diferente de 5 etc.). Essa terminologia (sucesso e fracasso) será usada freqüentemente.

Para cada experimento acima, podemos definir uma v.a.  $X$ , que assume apenas dois valores: 1, se ocorrer sucesso, e 0, se ocorrer fracasso. Indicaremos por  $p$  a probabilidade de sucesso, isto é,  $P(\text{sucesso}) = P(S) = p, 0 < p < 1$ .

**Definição:** A variável aleatória  $X$ , que assume apenas os valores 0 e 1, com função de probabilidade  $(x, p(x))$  tal que

$$p(0) = P(X = 0) = 1 - p,$$

$$p(1) = P(X = 1) = p,$$

é chamada variável aleatória de Bernoulli.

**Definição:** A variável aleatória  $X$ , que assume apenas os valores 0 e 1, com função de probabilidade  $(x, p(x))$  tal que

$$p(0) = P(X = 0) = 1 - p,$$

$$p(1) = P(X = 1) = p,$$

é chamada variável aleatória de Bernoulli.

**Observação:** Experimentos que resultam numa v.a. de Bernoulli são chamados ensaios de Bernoulli. Usaremos a notação

$$X \sim \text{Ber}(p)$$


para indicar uma v.a. com distribuição de Bernoulli com parâ-

Segue-se facilmente que

$$E(X) = p \quad \text{Var}(X) = p - p^2 = p(1 - p)$$

e,

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0; \\ 1 - p, & \text{se } 0 \leq x < 1; \\ 1, & \text{se } x \geq 1. \end{cases}$$



**Figura 2:** Distribuição de Bernoulli (a) f.p. (b) f.d.a.

# Distribuição Binomial

---

# Distribuição Binomial

Imagine, agora, que repetimos um ensaio de Bernoulli  $n$  vezes, ou, de maneira alternativa, obtemos uma amostra de tamanho  $n$  de uma distribuição de Bernoulli. Suponha ainda que as repetições sejam independentes, isto é, o resultado de um ensaio não tem influência nenhuma no resultado de qualquer outro ensaio. Uma amostra particular será constituída de uma seqüência de sucessos e fracassos, ou, alternativamente, de uns e zeros.

# Distribuição Binomial

Por exemplo, repetindo um ensaio de Bernoulli cinco vezes ( $n = 5$ ), um particular resultado pode ser FSSFS ou a quinta-tupla ordenada  $(0, 1, 1, 0, 1)$ . Usando a notação  $P(S) = p$ , a probabilidade de tal amostra será:

$$(1 - p)pp(1 - p)p = p^3(1 - p)^2$$

O número de sucessos nessa amostra é igual a 3, sendo 2 o número de fracassos.



# Distribuição Binomial

Designamos por  $X$  o número total de sucessos em  $n$  ensaios de Bernoulli, com probabilidade de sucesso  $p$ ,  $0 < p < 1$ . Os possíveis valores de  $X$  são  $0, 1, 2, \dots, n$  e os pares  $(x, p(x))$ , onde  $p(x) = P(X = x)$ , constituem a chamada distribuição binomial.

# Distribuição Binomial

Assim, numa seqüência de  $n$  ensaios de Bernoulli, a probabilidade de obter  $x$  sucessos (e portanto  $n - x$  fracassos),  $x = 0, 1, 2, \dots, n$ , com  $P(S) = p$ ,  $P(F) = 1 - p = q$ , é dado por  $p^x(1 - p)^{n-x} = p^x q^{n-x}$ , devido à independência dos ensaios. Mas qualquer seqüência com  $x$  sucessos e  $n - x$  fracassos terá a mesma probabilidade. Portanto resta saber quantas seqüências com a propriedade especificada podemos formar. É fácil ver que existem

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!},$$

# Distribuição Binomial

Se  $X$  tem distribuição binomial com parâmetros  $n$  e  $p$ , indicamos  $X \sim \text{Bin}(n, p)$ . Nesse caso,

$$E(X) = np;$$

$$V(X) = np(1 - p)$$

# Distribuição de Poisson

---

# Distribuição de Poisson

Dizemos que uma v.a.  $N$  tem uma distribuição de Poisson com parâmetro  $\lambda > 0$  se,

$$P(N = k) = \frac{\exp(-\lambda)\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

Neste caso,  $E(N) = \text{Var}(N) = \lambda$ ; Logo,  $\lambda$  representa o número médio de eventos ocorrendo no intervalo considerado.

A distribuição de Poisson é largamente empregada quando se deseja contar o número de eventos de certo tipo que ocorrem num intervalo de tempo, ou superfície ou volume. São exemplos:

- número de chamadas recebidas por um telefone durante cinco minutos;
- número de falhas de um computador num dia de operação; e
- número de relatórios de acidentes enviados a uma companhia de seguros numa semana.

# Exemplo

Um telefone recebe, em média, cinco chamadas por minuto. Supondo que a distribuição de Poisson seja adequada nessa situação, obter a probabilidade de que o telefone não receba chamadas durante um intervalo de um minuto.

# Exemplo

Um telefone recebe, em média, cinco chamadas por minuto. Supondo que a distribuição de Poisson seja adequada nessa situação, obter a probabilidade de que o telefone não receba chamadas durante um intervalo de um minuto. **Resolução:**

$N$  = "Número de chamadas por minuto"

Notemos que  $\lambda = E(N) = 5$ , portanto:

$$P(N = 0) = \frac{5^0 \exp(-5)}{0!} = 0,0067.$$



Por outro lado, se quisermos a probabilidade de obter no máximo duas chamadas em quatro minutos, teremos  $\lambda = 20$  chamadas em quatro minutos, logo




$$\begin{aligned}P(N \leq 2) &= P(N = 0) + P(N = 1) + P(N = 2) \\&= \exp(-20)(1 + 20 + 200) \\&= 221 \exp(-20)\end{aligned}$$

Denotaremos uma v.a.  $N$  com distribuição de Poisson de parâmetro  $\lambda$  por:




$$N \sim \text{Poisson}(\lambda)$$

## Referências

---

-  Bastos, Fernando de Souza (2025). ***Apostila Interativa***. Disponível online: <https://ufvest.shinyapps.io/ApostilaInterativa/>.
-  Ferreira, Eric Batista e Marcelo Silva de Oliveira (2020). ***Introdução à Estatística com R***. Editora Universidade Federal de Alfenas. URL: [https://www.unifal-mg.edu.br/bibliotecas/wp-content/uploads/sites/125/2021/12/32-EBR\\_Unifal.pdf](https://www.unifal-mg.edu.br/bibliotecas/wp-content/uploads/sites/125/2021/12/32-EBR_Unifal.pdf).
-  Meyer, Paul L (1982). ***Probabilidade: aplicações à estatística***. Livros Técnicos e Científicos.

# Referências ii

-  Montgomery, D. C. e G. C Runger (2016). ***Estatística Aplicada E Probabilidade Para Engenheiros***. 6ª ed. São Paulo: Grupo Gen-LTC.
-  Morettin, P.A. e W.O Bussab (2023). ***Estatística básica***. 10ª ed. São Paulo: Editora Saraiva.
-  Peternelli, Luiz Alexandre (s.d.). ***Apostila (EST 106)***. Formato slide Disponível no PVANet - Moodle.