

Inferência Estatística II

Prof. Fernando de Souza Bastos
fernando.bastos@ufv.br

Departamento de Estatística
Programa de Pós-Graduação em Estatística Aplicada e Biometria
Universidade Federal de Viçosa
Campus UFV - Viçosa



Sumário

- 1 Testes Uniformemente Mais Poderosos
- 2 Exemplo 1
- 3 Exemplo 2

Considere a função densidade de probabilidade (pdf)

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & 0 < x < \infty \\ 0, & \text{Caso Contrário} \end{cases}$$

dos Exercícios 8.1.2 e 8.1.3. Deseja-se testar a hipótese simples $H_0 : \theta = 2$ contra a hipótese alternativa composta $H_1 : \theta > 2$. Assim, $\Omega = \{\theta : \theta \geq 2\}$. Uma amostra aleatória, X_1, X_2 , de tamanho $n = 2$ é utilizada e a região crítica é $C = \{(x_1, x_2) : 9.5 \leq x_1 + x_2 < \infty\}$. Foi mostrado nos exercícios citados que o nível de significância do teste é aproximadamente 0.05 e o poder do teste quando $\theta = 4$ é aproximadamente 0.31. A função poder $\gamma(\theta)$ do teste para todos os $\theta \geq 2$ é:

$$\begin{aligned}\gamma(\theta) &= 1 - \int_0^{9.5} \int_0^{9.5-x_2} \frac{1}{\theta^2} e^{-\frac{x_1+x_2}{\theta}} dx_1 dx_2 \\ &= \left(\frac{\theta + 9.5}{\theta} \right) e^{-9.5/\theta}, \quad 2 \leq \theta.\end{aligned}$$

Por exemplo, $\gamma(2) = 0.05$, $\gamma(4) = 0.31$ e $\gamma(9.5) = \frac{2}{e} \approx 0.74$. É mostrado (Exercício 8.1.3) que o conjunto $C = \{(x_1, x_2) : 9.5 \leq x_1 + x_2 < \infty\}$ é uma melhor região crítica de tamanho 0.05 para testar a hipótese simples $H_0 : \theta = 2$ contra cada hipótese simples na hipótese composta $H_1 : \theta > 2$.

- **Resumo do exemplo anterior:**
 - exemplo anterior ilustra um teste de uma hipótese simples H_0 que é o melhor teste de H_0 contra todas as hipóteses simples na hipótese alternativa composta H_1 .
- **Queremos agora definir uma Região Crítica para uma hipótese composta que:**
 - Seja a “melhor” para testar H_0 contra H_1 .

- **Resumo do exemplo anterior:**

- exemplo anterior ilustra um teste de uma hipótese simples H_0 que é o melhor teste de H_0 contra todas as hipóteses simples na hipótese alternativa composta H_1 .

- **Queremos agora definir uma Região Crítica para uma hipótese composta que:**

- Seja a “melhor” para testar H_0 contra H_1 .
- Melhor região crítica significa:
 - A função poder do teste deve ser **maior ou igual** à de qualquer outro teste para cada hipótese simples em H_1 .

- **Resumo do exemplo anterior:**

- exemplo anterior ilustra um teste de uma hipótese simples H_0 que é o melhor teste de H_0 contra todas as hipóteses simples na hipótese alternativa composta H_1 .

- **Queremos agora definir uma Região Crítica para uma hipótese composta que:**

- Seja a “melhor” para testar H_0 contra H_1 .
- Melhor região crítica significa:
 - A função poder do teste deve ser **maior ou igual** à de qualquer outro teste para cada hipótese simples em H_1 .
 - Deve ter o **mesmo nível de significância**.

Definição 1

A região crítica C é uma região crítica uniformemente mais poderosa (UMP) de tamanho α para testar a hipótese simples H_0 contra uma hipótese alternativa composta H_1 se o conjunto C é a melhor região crítica de tamanho α para testar H_0 contra cada hipótese simples em H_1 . Um teste definido por essa região crítica C é chamado de teste uniformemente mais poderoso (UMP), com nível de significância α , para testar a hipótese simples H_0 contra a hipótese alternativa composta H_1 .

Como será visto posteriormente, testes uniformemente mais poderosos nem sempre existem. No entanto, quando existem, o teorema de Neyman-Pearson fornece uma técnica para encontrá-los. Alguns exemplos ilustrativos são dados aqui.

Exemplo

Seja X_1, X_2, \dots, X_n uma amostra aleatória de uma distribuição normal $N(0, \theta)$, onde a variância θ é um número positivo desconhecido. Será demonstrado que existe um teste uniformemente mais poderoso com nível de significância α para testar a hipótese simples $H_0 : \theta = \theta_0$, onde θ_0 é um número positivo fixo, em oposição à hipótese alternativa composta $H_1 : \theta > \theta_0$. Assim, $\Omega = \{\theta : \theta \geq \theta_0\}$.

A função de densidade conjunta de X_1, X_2, \dots, X_n é dada por

$$L(\theta; x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{(2\pi\theta)^{n/2}} \exp \left(-\frac{1}{2\theta} \sum_{i=1}^n x_i^2 \right). \quad (1)$$

Seja θ_1 representando um número maior que θ_0 , e k denote um número positivo. Seja C o conjunto de pontos onde

$$\frac{L(\theta_0; x_1, x_2, \dots, x_n)}{L(\theta_1; x_1, x_2, \dots, x_n)} \leq k, \quad (2)$$

isto é, o conjunto de pontos onde

$$\frac{\exp\left(-\frac{1}{2\theta_0} \sum_{i=1}^n x_i^2\right)}{\exp\left(-\frac{1}{2\theta_1} \sum_{i=1}^n x_i^2\right)} \leq k, \quad (3)$$

ou equivalentemente,

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 \geq \frac{2\theta_1\theta_0}{\theta_1 - \theta_0} \left(\frac{n}{2} \log\left(\frac{\theta_1}{\theta_0}\right) - \log k \right) = c$$

O conjunto $C = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : \sum_{i=1}^n x_i^2 \geq c\}$ é então uma melhor região crítica para testar a hipótese simples $H_0 : \theta = \theta_0$ em oposição à hipótese simples $\theta = \theta_1$. Resta determinar c de forma que esta região crítica tenha o tamanho desejado α . Se H_0 for verdadeira, a variável aleatória

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{\theta_0} \quad (4)$$

tem uma distribuição qui-quadrado com n graus de liberdade. Uma vez que $\alpha = P_{\theta_0} \left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{\theta_0} \geq \frac{c}{\theta_0} \right)$, c/θ_0 pode ser calculado, por exemplo, usando o código R

$$\text{qchisq}(1 - \alpha, n).$$

Então, $C = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : \sum_{i=1}^n x_i^2 \geq c\}$ é uma melhor região crítica de tamanho α para testar $H_0 : \theta = \theta_0$ em oposição à hipótese $\theta = \theta_1$.

Além disso, para cada número θ_1 maior que θ_0 , o argumento anterior se mantém. Ou seja, $C = \{(x_1, \dots, x_n) : \sum_{i=1}^n x_i^2 \geq c\}$ é uma região crítica uniformemente mais poderosa de tamanho α para testar $H_0 : \theta = \theta_0$ em oposição a $H_1 : \theta > \theta_0$. Se x_1, x_2, \dots, x_n denotam os valores experimentais de X_1, X_2, \dots, X_n , então $H_0 : \theta = \theta_0$ é rejeitada ao nível de significância α , e $H_1 : \theta > \theta_0$ é aceita se $\sum_{i=1}^n x_i^2 \geq c$; caso contrário, $H_0 : \theta = \theta_0$ é aceita.

Se, na discussão anterior, tomarmos $n = 15$, $\alpha = 0,05$ e $\theta_0 = 3$, então as duas hipóteses são $H_0 : \theta = 3$ e $H_1 : \theta > 3$. Usando R, $c/3$ é calculado por `qchisq(0.95, 15) = 24,996`. Portanto, $c = 74,988$.

Exemplo 2

Seja X_1, X_2, \dots, X_n uma amostra aleatória de uma distribuição normal $N(\theta, 1)$, onde θ é desconhecido. Será demonstrado que não existe um teste uniformemente mais poderoso para a hipótese simples $H_0 : \theta = \theta_0$, onde θ_0 é um número fixo, em oposição à hipótese alternativa composta $H_1 : \theta \neq \theta_0$. Assim, $\Omega = \{\theta : -\infty < \theta < \infty\}$.

Exemplo 2

Seja X_1, X_2, \dots, X_n uma amostra aleatória de uma distribuição normal $N(\theta, 1)$, onde θ é desconhecido. Será demonstrado que não existe um teste uniformemente mais poderoso para a hipótese simples $H_0 : \theta = \theta_0$, onde θ_0 é um número fixo, em oposição à hipótese alternativa composta $H_1 : \theta \neq \theta_0$. Assim, $\Omega = \{\theta : -\infty < \theta < \infty\}$.

Seja θ_1 um número diferente de θ_0 . Seja k um número positivo e considere

$$\frac{\frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \exp \left(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta_0)^2 \right)}{\frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \exp \left(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2 \right)} \leq k.$$

A desigualdade anterior pode ser escrita como

$$(\theta_0 - \theta_1) \sum_{i=1}^n x_i \leq \frac{2 \log k - n(\theta_1^2 - \theta_0^2)}{2}.$$

A desigualdade anterior pode ser escrita como

$$(\theta_0 - \theta_1) \sum_{i=1}^n x_i \leq \frac{2 \log k - n(\theta_1^2 - \theta_0^2)}{2}.$$

- Se $\theta_0 > \theta_1$ essa última desigualdade é equivalente a

$$\sum_{i=1}^n x_i \leq \frac{2 \log k - n(\theta_1^2 - \theta_0^2)}{2(\theta_0 - \theta_1)},$$

A desigualdade anterior pode ser escrita como

$$(\theta_0 - \theta_1) \sum_{i=1}^n x_i \leq \frac{2 \log k - n(\theta_1^2 - \theta_0^2)}{2}.$$

- Se $\theta_0 > \theta_1$ essa última desigualdade é equivalente a

$$\sum_{i=1}^n x_i \leq \frac{2 \log k - n(\theta_1^2 - \theta_0^2)}{2(\theta_0 - \theta_1)},$$

- Por outro lado, se $\theta_0 < \theta_1$, é equivalente a

$$\sum_{i=1}^n x_i \geq \frac{2 \log k - n(\theta_1^2 - \theta_0^2)}{2(\theta_0 - \theta_1)}.$$

- **Definição de Melhor Região Crítica:**
 - **Primeira expressão:** Melhor região crítica para testar $H_0 : \theta = \theta_0$ contra $H_1 : \theta > \theta_0$.

- **Definição de Melhor Região Crítica:**
 - **Primeira expressão:** Melhor região crítica para testar $H_0 : \theta = \theta_0$ contra $H_1 : \theta > \theta_0$.
 - **Segunda expressão:** Melhor região crítica para testar $H_0 : \theta = \theta_0$ contra $H_1 : \theta < \theta_0$.

- **Definição de Melhor Região Crítica:**

- **Primeira expressão:** Melhor região crítica para testar $H_0 : \theta = \theta_0$ contra $H_1 : \theta > \theta_0$.
- **Segunda expressão:** Melhor região crítica para testar $H_0 : \theta = \theta_0$ contra $H_1 : \theta < \theta_0$.

- **Limitações da Melhor Região Crítica:**

- Uma melhor região crítica para $\theta = \theta_0 + 1$ não serve para testar $H_0 : \theta = \theta_0$ contra $\theta = \theta_0 - 1$.

- **Definição de Melhor Região Crítica:**

- **Primeira expressão:** Melhor região crítica para testar $H_0 : \theta = \theta_0$ contra $H_1 : \theta > \theta_0$.
- **Segunda expressão:** Melhor região crítica para testar $H_0 : \theta = \theta_0$ contra $H_1 : \theta < \theta_0$.

- **Limitações da Melhor Região Crítica:**

- Uma melhor região crítica para $\theta = \theta_0 + 1$ não serve para testar $H_0 : \theta = \theta_0$ contra $\theta = \theta_0 - 1$.
- Portanto, não existe um teste uniformemente mais poderoso neste caso.

- **Definição de Melhor Região Crítica:**

- **Primeira expressão:** Melhor região crítica para testar $H_0 : \theta = \theta_0$ contra $H_1 : \theta > \theta_0$.
- **Segunda expressão:** Melhor região crítica para testar $H_0 : \theta = \theta_0$ contra $H_1 : \theta < \theta_0$.

- **Limitações da Melhor Região Crítica:**

- Uma melhor região crítica para $\theta = \theta_0 + 1$ não serve para testar $H_0 : \theta = \theta_0$ contra $\theta = \theta_0 - 1$.
- Portanto, não existe um teste uniformemente mais poderoso neste caso.

- **Teste Uniformemente Mais Poderoso:**

- Caso a hipótese alternativa fosse composta unidirecional:
 - $H_1 : \theta > \theta_0$ ou $H_1 : \theta < \theta_0$. Um teste uniformemente mais poderoso existiria para cada instância.

- Exercícios da seção 8.2: 1,3,5,6,11,13.

Referências I



Hogg, RV, J McKean e AT Craig (2019). *Introduction to Mathematical Statistics*.