

Inferência Estatística II

Prof. Fernando de Souza Bastos
fernando.bastos@ufv.br

Departamento de Estatística
Programa de Pós-Graduação em Estatística Aplicada e Biometria
Universidade Federal de Viçosa
Campus UFV - Viçosa



1 Caso Multiparamétrico: Estimação

Caso Multiparamétrico: Estimação

Considere θ um vetor de p parâmetros. Sejam X_1, \dots, X_n variáveis aleatórias iid com densidade $f(x, \theta)$, $\theta \in \Omega \subset \mathbb{R}^p$. A função log-verossimilhança é dada por

$$\ell(\theta) = \log L(\theta) = \sum_{i=1}^n \log f(x_i, \theta)$$

A teoria para o caso multiparamétrico requer condições de regularidade adicionais. Considere o apêndice do livro texto Hogg et al. (2019), página 687.

Observação:

A prova do teorema abaixo não depende se θ é um escalar ou um vetor. Portanto, o resultado é válido também para o caso multiparamétrico.

Teorema 1

Seja θ_0 o valor verdadeiro de θ . Sob (R0) e (R1), temos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{\theta_0}(L(\theta_0, X) > L(\theta, X)) = 1, \text{ para } \theta \neq \theta_0,$$

ou seja, θ_0 é o ponto de máximo de $L(\theta, X)$.

Com isso, usaremos como estimador de θ aquele valor que maximiza $L(\theta)$, ou equivalentemente, o valor que resolve o sistema de equações $\frac{\partial \ell(\theta)}{\partial \theta} = 0$. Se esse valor existir, será chamado de estimador de máxima verossimilhança (EMV).

Com isso, usaremos como estimador de θ aquele valor que maximiza $L(\theta)$, ou equivalentemente, o valor que resolve o sistema de equações $\frac{\partial \ell(\theta)}{\partial \theta} = 0$. Se esse valor existir, será chamado de estimador de máxima verossimilhança (EMV).

Se o interesse for estimar uma função de θ , digamos $\eta = g(\theta)$ e se $\hat{\theta}$ é um EMV para θ , então $\hat{\eta} = g(\hat{\theta})$ é um estimador de máxima verossimilhança para η .

Exemplo

$X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$. Neste caso, $\theta = (\mu, \sigma)$.

$$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}}, \theta \in \Omega = \mathbb{R} \times (0, +\infty) \text{ e } x \in \mathbb{R}.$$

Exemplo

$X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$. Neste caso, $\theta = (\mu, \sigma)$.

$$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}}, \theta \in \Omega = \mathbb{R} \times (0, +\infty) \text{ e } x \in \mathbb{R}.$$

A função de verossimilhança nesse caso é:

$$L(\theta) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} \right)^n e^{-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\ell(\theta) = \log L(\theta) = -\frac{n}{2} \log 2\pi - n \log \sigma - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

fazendo $\frac{\partial \ell(\theta)}{\partial \mu} = 0$ e $\frac{\partial \ell(\theta)}{\partial \sigma} = 0$, pode-se obter:

$$\hat{\mu} = \bar{X} \text{ e } \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}.$$

Analisando a matriz de segundas derivadas de ℓ , pode-se ver que $(\hat{\mu}, \hat{\sigma})$ é o ponto de máximo global de $\ell(\mu, \sigma)$. Ou seja, $(\hat{\mu}, \hat{\sigma})$ é o EMV de (μ, σ) .

No caso univariado, a informação de Fisher é a variância da v.a. $\frac{\partial \log f(x, \theta)}{\partial \theta}$. No caso multiparamétrico, a informação de Fisher é definida como a matriz de variância e covariância do vetor aleatório

$$\nabla \log f(\mathbf{X}, \theta) = \left(\frac{\partial \log f(x, \theta)}{\partial \theta_1}, \dots, \frac{\partial \log f(x, \theta)}{\partial \theta_n} \right)^\top$$

A informação de Fisher é $I(\theta) = \text{Cov}(\nabla \log f(\mathbf{X}, \theta))$, em que

$$\text{Cov}(Z_1, Z_2) = \begin{bmatrix} \text{Cov}(Z_1, Z_1) & \text{Cov}(Z_1, Z_2) \\ \text{Cov}(Z_2, Z_1) & \text{Cov}(Z_2, Z_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{Var}(Z_1) & \text{Cov}(Z_1, Z_2) \\ \text{Cov}(Z_2, Z_1) & \text{Var}(Z_2) \end{bmatrix}$$

O elemento (j, k) de $I(\theta)$ é dado por

$$I_{jk}(\theta) = \text{Cov}\left(\frac{\partial \log f(x, \theta)}{\partial \theta_j}, \frac{\partial \log f(x, \theta)}{\partial \theta_k}\right)$$

O elemento (j, k) de $I(\theta)$ é dado por

$$I_{jk}(\theta) = \text{Cov}\left(\frac{\partial \log f(x, \theta)}{\partial \theta_j}, \frac{\partial \log f(x, \theta)}{\partial \theta_k}\right)$$

Sob as condições de regularidade, temos que

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, \theta) dx \Rightarrow 0 = \frac{\partial}{\partial \theta} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, \theta) dx \\ \Rightarrow 0 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial f(x, \theta)}{\partial \theta} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial \log f(x, \theta)}{\partial \theta} f(x, \theta) dx \\ &= E\left[\frac{\partial \log f(x, \theta)}{\partial \theta}\right] = E\left[\nabla \log f(x, \theta)\right] \end{aligned}$$

Tomando mais uma derivada com relação a θ , obtemos:

$$\begin{aligned} 0_{1 \times p}^{\top} &= \frac{\partial}{\partial \theta^{\top}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial \log f(x, \theta)}{\partial \theta} f(x, \theta) dx \\ &= \int \frac{\partial^2 \log f(x, \theta)}{\partial \theta \partial \theta^{\top}} f(x, \theta) dx + \int \frac{\partial \log f(x, \theta)}{\partial \theta} \frac{\partial \log f(x, \theta)}{\partial \theta^{\top}} f(x, \theta) dx \\ \Rightarrow - \int \frac{\partial^2 \log f(x, \theta)}{\partial \theta \partial \theta^{\top}} f(x, \theta) dx &= \int \frac{\partial \log f(x, \theta)}{\partial \theta} \frac{\partial \log f(x, \theta)}{\partial \theta^{\top}} f(x, \theta) dx \\ \Rightarrow E\left(\frac{\partial \log f(x, \theta)}{\partial \theta} \frac{\partial \log f(x, \theta)}{\partial \theta^{\top}}\right) &= -E\left(\frac{\partial^2 \log f(x, \theta)}{\partial \theta \partial \theta^{\top}}\right) \end{aligned}$$

Daí,

$$I(\theta) = -E\left(\frac{\partial^2 \log f(x, \theta)}{\partial \theta \partial \theta^\top}\right).$$

Exemplo

$$X \sim N(\mu, \sigma), \theta = (\mu, \sigma).$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \log f}{\partial \mu} &= \frac{1}{\sigma^2}(x - \mu); \quad \frac{\partial^2 \log f}{\partial \mu^2} = -\frac{1}{\sigma^2}; \quad \frac{\partial \log f}{\partial \sigma} = -\frac{1}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3}(x - \mu)^2 \\ \frac{\partial^2 \log f}{\partial \sigma^2} &= \frac{1}{\sigma^2} - \frac{3}{\sigma^4}(x - \mu)^2; \quad \frac{\partial^2 \log f}{\partial \mu \partial \sigma} = -\frac{2}{\sigma^3}(x - \mu) \end{aligned}$$

Logo,

$$I(\theta) = I(\mu, \sigma) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sigma^2} & 0 \\ 0 & \frac{2}{\sigma^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -E\left(\frac{\partial^2 \log f(x, \theta)}{\partial \mu^2}\right) & -E\left(\frac{\partial^2 \log f(x, \theta)}{\partial \sigma \partial \mu}\right) \\ E\left(\frac{\partial^2 \log f(x, \theta)}{\partial \mu \partial \sigma}\right) & -E\left(\frac{\partial^2 \log f(x, \theta)}{\partial \sigma^2}\right) \end{bmatrix}$$

Teorema 2

Sejam X_1, \dots, X_n variáveis aleatórias iid com densidade $f(x, \theta)$, $\theta \in \Omega \subset \mathbb{R}^p$. Assuma que valem as condições de regularidade. Então,

- 1 O sistema de equações $\frac{\partial \ell(\theta)}{\partial \theta} = 0$ tem uma solução $\hat{\theta}_n$ tal que $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta_0$ (θ_0 verdadeiro valor de θ).
- 2 Para qualquer sequência satisfazendo 1, temos

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta_0) \xrightarrow{D} N_p(0, I^{-1}(\theta)).$$

Corolário:

Sob as condições do teorema anterior, temos que

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_{in} - \theta_{i0}) \xrightarrow{D} N_p(0, I_{ii}^{-1}(\theta)).$$




Seja $g(\theta) = (g_1(\theta), \dots, g_k(\theta))^T$, $1 \leq k \leq p$ tal que a matriz de derivadas parciais $B = \left(\frac{\partial g_i}{\partial \theta_j} \right)_{ij}$, $i = 1, \dots, k$ e $j = 1, \dots, p$ possuam elementos contínuos e que não se anulem numa vizinhança de θ_0 . Seja $\hat{\eta} = g(\hat{\theta})$. Então, $\hat{\eta}$ é o EMV de η e

$$\sqrt{n}(\hat{\eta} - \eta_0) \xrightarrow{D} N_k(0, BI^{-1}(\theta)B^T).$$

Para

- Exercícios da seção 6.4: Todos, exceto o 5 e o 8.

Referências I

-  Bolfarine, Heleno e Mônica Carneiro Sandoval (2001). *Introdução à inferência estatística*. Vol. 2. SBM.
-  Casella, George e Roger L Berger (2021). *Statistical inference*. Cengage Learning.
-  Hogg, RV, J McKean e AT Craig (2019). *Introduction to Mathematical Statistics*.