

《高等数学》全程教学视频课


第32讲 泰勒公式

- 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的 0,1,2 阶泰勒多项式

$$p_0(x) = f(x_0)$$

$$p_1(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

$$p_2(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2$$



$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - p_2(x)}{(x - x_0)^2} = 0 \iff f(x) = p_2(x) + o((x - x_0)^2)$$



误差估计及泰勒公式

几个初等函数的麦克劳林公式

间接法求泰勒公式



泰勒余项

设 $f(x) = p_n(x) + R_n(x)$, 称

$$|R_n(x)| = |f(x) - p_n(x)|$$

为泰勒多项式 $p_n(x)$ 逼近 $f(x)$ 的绝对误差.

定理1 设函数 $f(x)$ 在 x_0 处具有 n 阶导数, 则当 $x \rightarrow x_0$ 时, 有

$$R_n(x) = o[(x - x_0)^n]. \quad \text{皮亚诺余项}$$

即

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o[(x - x_0)^n].$$

函数 $f(x)$ 在点 x_0 处带皮亚诺余项的 n 阶泰勒公式



- 特别当 $x_0 = 0$ 时, 称

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n)$$

为 $f(x)$ 的带皮亚诺余项的 n 阶麦克劳林公式.

- 定理1表明用 n 阶泰勒多项式近似表示 $f(x)$ 时, 其误差是 $(x - x_0)^n$ 在过程 $x \rightarrow x_0$ 中的高阶无穷小. 这说明当 $n > 1$ 时, 只要 x 充分接近 x_0 , 相应的逼近精度较线性逼近大大提高了.
- 皮亚诺余项只是对误差作了定性的刻画, 不能用于具体的精度分析.



定理2 设函数 $f(x)$ 在含有 x_0 的区间 (a, b) 内有直 $n + 1$ 阶导数, 则对任意 $x \in (a, b)$, 至少存在介于 x 与 x_0 之间的一点 ξ , 使得

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}.$$

或

拉格朗日余项

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \boxed{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}}.$$

函数 $f(x)$ 在点 x_0 处带拉格朗日余项的 n 阶泰勒公式



- 特别当 $x_0 = 0$ 时, 称

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!} x^{n+1} \quad (0 < \theta < 1)$$

为函数 $f(x)$ 带拉格朗日余项的麦克劳林公式.

- 若 $n = 0$, 带拉格朗日余项的 n 阶泰勒公式可写为

$$f(x) = f(x_0) + f'(\xi)(x - x_0),$$

其中 ξ 介于 x 与 x_0 之间. 说明拉格朗日中值公式是泰勒中值公式的一个特例.




- 指数函数 $f(x) = e^x$ 的麦克劳林公式

$$e^x \sim p_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

$$f^{(k)}(x) = e^x, \quad k = 0, 1, 2, \cdots$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!} x^{n+1},$$
$$0 < \theta < 1, -\infty < x < +\infty$$



- 正弦函数 $f(x) = \sin x$ 的麦克劳林公式

$$\sin x \sim p_{2m-1}(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{m-1} \cdot \frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!}.$$

$$f^{(k)}(x) = \sin\left(x + k \cdot \frac{\pi}{2}\right), k = 0, 1, 2, \dots$$

$$\begin{aligned} \sin x = & x - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^{m-1} \frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!} \\ & + (-1)^m \frac{\cos \theta x}{(2m+1)!} x^{2m+1}, 0 < \theta < 1, -\infty < x < +\infty \end{aligned}$$



- 余弦函数 $f(x) = \cos x$ 的麦克劳林公式

$$\cos x \sim p_{2m}(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^m \cdot \frac{x^{2m}}{(2m)!}$$

$$f^{(k)}(x) = \cos\left(x + k \cdot \frac{\pi}{2}\right), k = 0, 1, 2, \cdots$$

$$\begin{aligned} \cos x = & 1 - \frac{x^2}{2!} + \cdots + (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m)!} \\ & + (-1)^{m+1} \frac{\cos \theta x}{(2m+2)!} x^{2m+2}, \quad 0 < \theta < 1, -\infty < x < +\infty \end{aligned}$$



- 对数函数 $f(x) = \ln(1+x)$ 的麦克劳林公式

$$\ln(1+x) \sim p_n(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$$

$$f^{(k)}(x) = (-1)^{k-1} \frac{(k-1)!}{(1+x)^k}, k = 1, 2, \dots$$

$$\begin{aligned} \ln(1+x) = & x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} \\ & + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{(n+1)(1+\theta x)^{n+1}}, \quad 0 < \theta < 1, x > -1 \end{aligned}$$



- 幂函数 $f(x) = (1+x)^\alpha$ 的麦克劳林公式

$$(1+x)^\alpha \sim p_n(x) = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n$$

$$f^{(k)}(x) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)(1+x)^{\alpha-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{(n+1)!}x^{n+1} (1+\theta x)^{n+1-\alpha}, \quad 0 < \theta < 1, x > -1$$



例1 求 $f(x) = \tan x$ 的三阶带皮亚诺余项的麦克劳林公式.

例2 用间接法求 $f(x) = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$ 的 n 阶带皮亚诺余项的麦克劳林公式.

例3 用间接法求 $f(x) = \frac{1}{2+x}$ 在 $x_0 = 1$ 处的 7 阶泰勒多项式, 并求 $f^{(7)}(1)$.

