

# Cichoń's maximum の証明

後藤 達哉

2022 年 9 月 21 日

## 目次

<b>1</b>	<b>イントロダクション</b>	<b>1</b>
1.1	関係システム	4
1.2	Cohen, ランダム, Hechler, アメーバ, eventually different 強制法	5
1.3	goodness	6
1.4	EUB と COB	7
<b>2</b>	<b>Cichoń の図式の左半分</b>	<b>8</b>
2.1	初めの強制法 $\mathbb{P}^5$	8
2.2	$\mathfrak{b}$ を GCH なしで扱う	9
2.3	GCH を復活させる	13
<b>3</b>	<b>ブール超冪</b>	<b>15</b>
3.1	ブール超冪	15
3.2	$\kappa$ から $\theta$ への BUP 埋め込み	16
3.3	EUB と COB の保存	18
3.4	主定理の証明	19

## 1 イントロダクション

実数全体の集合  $\mathbb{R}$  を Lebesgue 測度 0 集合たちで覆うには、それらが最低何個必要かという問いを考える。Lebesgue 測度 0 集合の可算和は Lebesgue 測度 0 だから可算個では足りない。一方、 $\bigcup_{r \in \mathbb{R}} \{r\} = \mathbb{R}$  だから連続体濃度個あれば十分である。これで非可算かつ連続体濃度以下とわかるわけだが、ここで問いを終えてしまうのはもったいない。連続体濃度の下に非可算基数が存在することもありえると分かっているからだ。そこで問の答えを

$$\text{cov}(\mathcal{N}) = \min\{|\mathcal{A}| : \mathcal{A} \text{ はルベーグ測度 0 集合の族で } \bigcup \mathcal{A} = \mathbb{R}\}$$

とおいて、これがいろんな集合論のモデルでどうなっているのか調べよう。また、他の似たような問いの答えを文字でおいてそれらの間の関係を調べよう：ZFC の範囲内で大小関係がつくのか、等しいのか、ZFC で等しいことを証明できないなら実際にどんなモデルで破れているのか。これが**基数不変量**の研究である。

基数不変量という言葉に厳密な定義はないが、「実数の構造によって定義される基数」のことであり、その多くは  $\aleph_1$  以上  $2^{\aleph_0}$  以下であることが証明される。

いくつかの基数不変量を定義しよう。

$2^\omega$  上のイデアル  $\mathcal{I}$  に対して

- $\text{add}(\mathcal{I}) = \min\{|\mathcal{J}| : \mathcal{J} \subseteq \mathcal{I}, \bigcup \mathcal{J} \notin \mathcal{I}\}$
- $\text{cov}(\mathcal{I}) = \min\{|\mathcal{J}| : \mathcal{J} \subseteq \mathcal{I}, \bigcup \mathcal{J} = 2^\omega\}$
- $\text{non}(\mathcal{I}) = \min\{|A| : A \subseteq 2^\omega, A \notin \mathcal{I}\}$
- $\text{cof}(\mathcal{I}) = \min\{|\mathcal{J}| : \mathcal{J} \subseteq \mathcal{I}, (\forall A \in \mathcal{I})(\exists B \in \mathcal{J})(A \subseteq B)\}$


とおく。これらにルベーク測度 0 集合のイデアル  $\mathcal{N}$ 、痩せ集合のイデアル  $\mathcal{M}$  を代入したものが考察の対象である。

また、

- $\mathfrak{d} = \min\{|F| : F \subseteq \omega^\omega, (\forall f \in \omega^\omega)(\exists g \in F)(f \leq^* g)\}$ .
- $\mathfrak{b} = \min\{|F| : F \subseteq \omega^\omega, \neg(\exists f \in \omega^\omega)(\forall g \in F)(g \leq^* f)\}$ .

という基数不変量も考えられる。 $\mathfrak{d}$  は dominating number,  $\mathfrak{b}$  は bounding number と呼ばれる。

以上の 10 個の基数不変量の ZFC で示せる大小関係については以下の図式が知られていて、Cichoń の図式と呼ばれる。



ここで矢印  $A \rightarrow B$  は  $A \leq B$  を ZFC で証明できることを意味する。また  $\text{add}(\mathcal{M}) = \min\{\text{cov}(\mathcal{M}), \mathfrak{b}\}$  かつ  $\text{cof}(\mathcal{M}) = \max\{\text{non}(\mathcal{M}), \mathfrak{d}\}$  が ZFC で証明できる。

Cichoń の図式に表示されている基数不変量以外にも Blass の図式と呼ばれる図式の基数不変量： $\mathfrak{m}, \mathfrak{p}, \mathfrak{h}, \mathfrak{g}, \mathfrak{s}, \mathfrak{e}, \mathfrak{r}, \mathfrak{a}, \mathfrak{u}, \mathfrak{i}$  などもある。しかし、本稿ではこれらには焦点を当てない。

表 1 に Cichoń の図式の歴史をまとめた。

連続体仮説の否定の無矛盾性以前に Rothberger の結果があるのがすごいが、この結果は「Luzin 集合と Sierpinski 集合の両方が存在するならば連続体仮説が成り立つ」という定理の補題として証明された。Cantor の  $\aleph_0 < \mathfrak{c}$  以前に du Bois-Reymond が  $\aleph_0 < \mathfrak{b}$  を示していたことも驚くべきところであろう。

Kunen-Miller の表というのは図 1 のようなものである。[Mil81] から抜粋した。Cichoń の図式ができる前はどの組合せが可能かこのような表で表していた。

表題にもなっている Cichoń's maximum であるが、これは Cichoń の図式において (他の基数不変量の値に束縛されている  $\text{add}(\mathcal{M}), \text{cof}(\mathcal{M})$  を除いて) すべての基数不変量の値を同時に別々の値にするモデルである。そのようなモデルの構成法を本稿では見ていく。

表 1 Cichoń の図式の歴史

年	人物	出来事
1875 年	du Bois-Reymond	$\aleph_0 < \mathfrak{b}$ の証明
1891 年	Cantor	$\aleph_0 < \mathfrak{c}$ の証明
1938 年	Rothberger	$\text{cov}(\mathcal{M}) \leq \text{non}(\mathcal{N})$ と $\text{cov}(\mathcal{N}) \leq \text{non}(\mathcal{M})$ の証明
1963 年	Cohen	連続体仮説の独立性
1970 年	Martin–Solovay	Martin の公理およびその帰結の $\text{add}(\mathcal{N}) = \mathfrak{c} > \aleph_1$ の証明
1977 年	Truss	$\min\{\text{cov}(\mathcal{M}), \mathfrak{b}\} \leq \text{add}(\mathcal{M})$ の証明
1981 年	Miller	$\text{add}(\mathcal{M}) \leq \min\{\text{cov}(\mathcal{M}), \mathfrak{b}\}$ の証明およびこの時点で知られていたモデルでの Cichon の図式の中の基数不変量の値の決定, Kunen-Miller の表 (5x5 マス)
1984 年	Miller	$\text{add}(\mathcal{N}) \leq \mathfrak{b}$ の証明; Kunen-Miller の表 (6x6 マス)
1984 年	Bartoszyński	$\text{add}(\mathcal{N}) \leq \text{add}(\mathcal{M})$ の証明
1984 年	Fremlin	$\text{cof}(\mathcal{M}) = \max\{\text{non}(\mathcal{M}), \mathfrak{d}\}$ の証明; Cichoń’s diagram 登場
1985 年	Raisonnier–Stern	$\text{cof}(\mathcal{M}) \leq \text{cof}(\mathcal{N})$ の証明
1989 年	Bartoszyński–Judah–Shelah	$\text{PT}_{f,g}$ 強制法の開発および連続体濃度が $\aleph_2$ のときの Cichoń の図式の分離すべて完成
2019 年	Goldstern–Kellner–Shelah	巨大基数を仮定した Cichoń’s maximum の証明
2021 年	Goldstern–Kellner–Mejía–Shelah	巨大基数を仮定しない Cichoń’s maximum の証明

		Add	T	F	F	F	F
		Baire	T	T	F	T	F
measure							
Add	Baire	Unif	T	T	T	F	F
T	T	T	MA [MS]	?	?		
F	T	T	See Conjecture §9 (2)	Iterated random reals §4	Infinitely equal and random reals §7		
F	F	T	Dominating reals §5	Eventually different reals §5	Mathias reals §6	Cohen reals [K1]	Infinitely equal reals §7
F	T	F			Random reals [K1]		
F	F	F			See conjecture §9 (3)		Silver or Sack’s reals §7

図 1 Kunen-Miller の表

## 1.1 関係システム

**定義 1.** 3つ組  $\mathbf{R} = (X, Y, \sqsubset)$  が**関係システム**であるとは,  $X, Y$  が集合で  $\sqsubset$  が関係であることを言う (基本的には  $\sqsubset \subseteq X \times Y$  だがはみ出ているよい).

$F \subseteq X$  が  $\mathbf{R}$  **有界**であるとは  $(\exists y \in Y)(\forall x \in F)(x \sqsubset y)$  を満たすことである.  $E \subseteq Y$  が  $\mathbf{R}$ -**dominating** であるとは  $(\forall x \in X)(\exists y \in E)(x \sqsubset y)$  を満たすことである.

- $\mathfrak{b}_{\mathbf{R}} = \min\{|F| : F \subseteq X \text{ は } \mathbf{R} \text{ 非有界}\}$
- $\mathfrak{d}_{\mathbf{R}} = \min\{|E| : E \subseteq Y \text{ は } \mathbf{R}\text{-dominating}\}$

と定める.

**定義 2.** 関係システム  $\mathbf{R} = (X, Y, \sqsubset)$  についてその双対を  $\mathbf{R}^\perp = (Y, X, \sqsubset^\perp)$  と定める. ここに

$$y \sqsubset^\perp x \iff \neg(x \sqsubset y).$$

$\mathfrak{b}_{\mathbf{R}^\perp} = \mathfrak{d}_{\mathbf{R}}$  かつ  $\mathfrak{d}_{\mathbf{R}^\perp} = \mathfrak{b}_{\mathbf{R}}$  に注意する.

**定義 3.** 関係システム  $\mathbf{R} = (X, Y, \sqsubset)$  が**ポーランド関係システム**であるとは, 次の3条件を満たすことを言う.

1.  $X$  は完全ポーランド空間.
2.  $Y$  はあるポーランド空間  $Z$  の非空な解析集合.
3.  $\sqsubset \cap (X \times Z) = \bigcup_{n \in \omega} \sqsubset_n$  であって,  $\langle \sqsubset_n : n \in \omega \rangle$  は  $X \times Z$  の閉集合の増大列であって, 各  $n \in \omega$  と  $y \in Y$  について  $(\sqsubset_n)^y = \{x \in X : x \sqsubset_n y\}$  は nowhere dense である.

ポーランド関係システムのような定義可能な関係システムを考えているとき, それを書いたときには今考えている宇宙の中でその定義を解釈したものを表すことにする.

**事実 4.**  $\mathbf{R}$  がポーランド関係システムであれば,  $\mathfrak{b}_{\mathbf{R}} \leq \text{non}(\mathcal{M})$  かつ  $\text{cov}(\mathcal{M}) \leq \mathfrak{d}_{\mathbf{R}}$  である.

**定義 5.** 1.  $\mathcal{C} = \{(q_n)_{n \in \omega} : \text{各 } q_n \text{ は正の有理数かつ } \sum_n q_n \leq 1\}$  とおく.  
2.  $\Omega_n = \{a \in [2^{<\omega}]^{<\aleph_0} : \mu(\bigcup_{s \in a} [s]) \leq 2^{-n}\}$  とおき,  $\Omega = \prod_{n \in \omega} \Omega_n$  とおく. 各  $x \in \Omega$  について  $N_x = \bigcap_{n \in \omega} \bigcup_{s \in x(n)} [s]$  とおく.

以下の4つはすべてポーランド関係システムである.

**定義 6.** 1.  $\mathbf{R}_1 = (\mathcal{C}, \mathcal{C}, \{(x, y) : (\forall^\infty n)(x(n) \leq y(n))\})$   
2.  $\mathbf{R}_2 = (\Omega, 2^\omega, \{(x, y) : y \notin N_x\})$   
3.  $\mathbf{R}_3 = (\omega^\omega, \omega^\omega, \{(x, y) : (\forall^\infty n)(x(n) \leq y(n))\})$   
4.  $\mathbf{R}_4 = (\omega^\omega, \omega^\omega, \{(x, y) : (\forall^\infty n)(x(n) \neq y(n))\})$

**補題 7.** 1.  $\mathfrak{d}_{\mathbf{R}_1} = \text{cof}(\mathcal{N}), \mathfrak{b}_{\mathbf{R}_1} = \text{add}(\mathcal{N}),$   
2.  $\mathfrak{d}_{\mathbf{R}_2} = \text{non}(\mathcal{N}), \mathfrak{b}_{\mathbf{R}_2} = \text{cov}(\mathcal{N}),$   
3.  $\mathfrak{d}_{\mathbf{R}_3} = \mathfrak{d}, \mathfrak{b}_{\mathbf{R}_3} = \mathfrak{b},$   
4.  $\mathfrak{d}_{\mathbf{R}_4} = \text{cov}(\mathcal{M}), \mathfrak{b}_{\mathbf{R}_4} = \text{non}(\mathcal{M}).$

## 1.2 Cohen, ランダム, Hechler, アメーバ, eventually different 強制法

### 1.2.1 Cohen 強制法

$\mathbb{C} = 2^{<\omega}$  で順序を延長関係で入れたもの  $q \leq p \iff p \subseteq q$  は Cohen 強制法と呼ばれる.  $\mathbb{C}$  ジェネリックフィルター  $G$  から作られる実数  $c = \bigcup G$  を Cohen 実数という. Cohen 実数から  $G$  を復元できる:  $G = \{c \upharpoonright n : n \in \omega\}$ . Cohen 強制法は可算なので, 明らかに  $\sigma$ -centered を満たす. 特に ccc を満たす. Cohen 実数はグラウンドモデル上  $\mathbf{R}_4^\perp$ -dominating である:

$$(\forall x \in \omega^\omega \cap V)(\exists^\infty n)(x(n) = \dot{c}(n)).$$

### 1.2.2 ランダム強制法

$\mathbb{B} = \{T : T \text{ は } 2^{<\omega} \text{ の部分木で } \mu([T]) > 0\}$  で順序を包含関係で入れたもの  $T' \leq T \iff T' \subseteq T$  をランダム強制法という.  $\mathbb{B}$  ジェネリックフィルター  $G$  から作られる実数  $r = \bigcap \{[T] : T \in G\}$  をランダム実数という. ランダム実数から  $G$  を復元できる:  $G = \{T \in \mathbb{B} : r \in [T]\}$ . ランダム強制法は ccc を満たす. ランダム実数はグラウンドモデル上  $\mathbf{R}_2$ -dominating である:

$$(\forall x \in \Omega^V)(\dot{r} \notin N_x).$$

### 1.2.3 Hechler 強制法

$\mathbb{D} = \{(n, f) : n \in \omega, f \in \omega^\omega\}$  で順序を

$$(m, g) \leq (n, f) \iff n \leq m \wedge f \upharpoonright n = g \upharpoonright n \wedge (\forall k \in \omega)(f(k) \leq g(k))$$

で入れたものを Hechler 強制法という.  $\mathbb{D}$  ジェネリックフィルター  $G$  から作られる実数  $d = \bigcup \{f \upharpoonright n : (n, f) \in G\}$  を Hechler 実数という. Hechler 実数から  $G$  を復元できる:  $G = \{(n, f) : f \upharpoonright n = d \upharpoonright n\}$ . Hechler 強制法は  $\sigma$ -centered である. Hechler 実数はグラウンドモデル上  $\mathbf{R}_3$ -dominating である:

$$(\forall x \in \omega^\omega \cap V)(\forall^\infty n)(x \leq^* \dot{d}).$$

### 1.2.4 アメーバ強制法

$\mathbb{A} = \{T : T \text{ は } 2^{<\omega} \text{ の subtree で } \mu([T]) \geq 1/2\}$  で順序を  $T' \leq T \iff T' \subseteq T$  で入れたものをアメーバ強制法という.  $\mathbb{A}$  ジェネリックフィルター  $G$  に対して測度  $1/2$  の閉集合  $K_G = \bigcap G$  が定まる. そのコード  $a$  をアメーバ実数という. アメーバ実数  $a$  から  $G$  を復元できる:  $G = \{T \in \mathbb{A} : a \subseteq [T]\}$ . アメーバ実数を Borel な方法で加工して得られる実数  $b \in \mathcal{C}$  があって, それはグラウンドモデル上  $\mathbf{R}_1$ -dominating である:

$$(\forall x \in \mathcal{C}^V)(x \leq b).$$

アメーバ強制法は ccc である.

### 1.2.5 eventually different 強制法

$\mathbb{E} = \{(s, k, \varphi) : s \in \omega^{<\omega}, k \in \omega, \varphi : \omega \rightarrow [\omega]^{<\omega}, (\forall i \in \text{dom}(s))(s(i) \notin \varphi(i))\}$  で順序を

$$(s', k', \varphi') \leq (s, k, \varphi) \iff s \subseteq s' \wedge k \leq k' \wedge (\forall i)(\varphi(i) \subseteq \varphi'(i))$$

を入れたものを eventually different 強制法という。ℰ ジェネリックフィルター  $G$  から作られる実数  $e = \bigcup \{s : (s, k, \varphi) \in G\}$  を eventually different generic 実数という。eventually different 強制法は  $\sigma$ -centered である。eventually different generic 実数はグラウンドモデル上  $\mathbf{R}_4$ -dominating である：

$$(\forall x \in \omega^\omega \cap V)(\forall^\infty n)(x(n) \neq \dot{e}(n)).$$

### 1.2.6 Borel reading of names

Cohen, ランダム, Hechler, アメーバ, eventually different 強制法は共通して次の性質を持つ。

**性質 8.**  $\mathbb{P}$  を ccc かつ Borel な強制半順序であり、かつ  $\mathbb{P}$  はジェネリック実数を持つという性質を考える。すなわち、実数の名前  $\dot{x}_{\text{gen}}$  と Borel な関係  $B \subseteq \mathbb{P} \times 2^\omega$  があって

$$\mathbb{P} \Vdash p \in \dot{G} \iff B(p, \dot{x}_{\text{gen}})$$

となるという性質を考える。

この性質を持つ強制法による強制拡大での実数はジェネリック実数から Borel な方法で計算できる。

**命題 9.**  $\mathbb{P}$  を上記性質 8 を持つ強制法とする。  $\dot{x}$  を  $2^\omega$  の元の名前とする。このとき Borel 関数  $C: 2^\omega \rightarrow 2^\omega$  があって、

$$\Vdash \dot{x} = C(\dot{x}_{\text{gen}})$$

となる。

これは有限台反復でも同様である。

**命題 10.**  $(P_\alpha, Q_\alpha : \alpha < \delta)$  を有限台反復とする。各  $Q_\alpha$  は上記性質 8 を持つ (ことが  $P_\alpha$  によって強制される) 強制法とする。  $\dot{x}$  を  $2^\omega$  の元の名前とする。このとき Borel 関数  $C: (2^\omega)^\omega \rightarrow 2^\omega$  と可算個の添字  $\alpha_0, \alpha_1, \dots$  があって、

$$\Vdash \dot{x} = C(\dot{x}_{\text{gen}}^{\alpha_0}, \dot{x}_{\text{gen}}^{\alpha_1}, \dots)$$

となる。

## 1.3 goodness

**定義 11.**  $P$  を ccc な強制法とし、 $\lambda$  を非可算正則基数とし、 $R$  をポーランド関係システムとする。  $P$  が  $\lambda$ -**R-good** であるとは、 $Y$  の元を表す各  $P$  名前  $\dot{y}$  について非空な集合  $\mathcal{Y} \subseteq Y$  で  $\text{size}(\mathcal{Y}) < \lambda$  なものが  $V$  に存在して、どんな  $x \in X$  についても  $x$  が  $\mathcal{Y}$  上  $\mathbf{R}$  非有界であれば、 $\Vdash x \in \dot{y}$ 。

**事実 12.**  $\mathbf{R}$  をポーランド関係システムとする。

1. ccc で  $\text{size} < \lambda$  な強制法  $P$  はすべて、 $\lambda$ -**R-good** である。特に Cohen 強制法は  $\aleph_1$ -**R-good** である。

2. ccc で  $\lambda$ - $\mathbf{R}$ -good であることは任意の長さの有限台反復で保たれる。

**事実 13.** 1.  $\sigma$ -centered かランダム強制法の部分ブール代数である強制法は  $\aleph_1$ - $\mathbf{R}_1$ -good である。

2.  $\sigma$ -centered な強制法は  $\aleph_1$ - $\mathbf{R}_2$ -good である。

**補題 14.**  $\mathbf{R} = (X, Y, \sqsubset)$  をポーランド関係システムとする。  $\lambda \leq \kappa \leq \mu$  を全て非可算正則基数とする。  $\mu$  個の Cohen 実数  $(c_\alpha : \alpha < \mu)$  を加えた後に、  $\lambda$ - $\mathbf{R}$ -good 強制法で強制拡大したモデルにおいて、どんな実数  $y \in Y$  についても、

$$(\exists \alpha < \kappa)(\forall \beta \in \kappa \setminus \alpha)(c_\beta \sqsubset y)$$

が成り立つ。

証明.  $\kappa$  個の Cohen 実数を追加した後の中間モデルで議論する。それを  $V_\kappa$  と呼ぶ。残りの強制法、すなわち  $\mu \setminus \kappa$  個の Cohen と good 強制法の反復は good である。よって  $V_\kappa$  において goodness を目撃する集合  $\mathcal{Y}$  でサイズ  $< \lambda$  なものを得る。

最初の Cohen 強制法は ccc であり、 $\kappa \geq \lambda$  は正則なので、ある番号  $\alpha \in \kappa$  がとれてどの元  $y \in \mathcal{Y}$  もすでに最初の  $\alpha$  個の Cohen を付け加えたモデルに存在する。そのモデルを  $V_\alpha$  と書こう。  $y$  によって bound される実数たちの集合  $M_y$  は meager であり、それは絶対的である。どの  $\beta \in \kappa \setminus \alpha$  に対しても  $c_\beta$  は  $V_\alpha$  上の Cohen 実数なので  $M_y$  に属さない。すなわち  $y$  に bound されない。つまり、 $\mathcal{Y}$  によって bound されない。したがって、goodness の定義より、各  $c_\beta$  は与えられた  $y$  に bound されないことが強制される。  $\square$

## 1.4 EUB と COB

**定義 15.**  $\gamma$  を極限順序数、 $P$  を ccc 強制法、 $\mathbf{R} = (X, Y, \sqsubset)$  を定義可能な関係システムとする。  $\text{EUB}(\mathbf{R}, P, \gamma)$  とは次の主張である： $X$  の元の  $P$ -名前の列  $(\dot{x}_\alpha)_{\alpha < \gamma}$  であって、どんな  $Y$  の元の  $P$ -名前の列  $\dot{y}$  についても

$$(\exists \alpha < \gamma)(\forall \beta \in \gamma \setminus \alpha) P \Vdash \neg(\dot{x}_\beta \sqsubset \dot{y})$$

となる。

ccc 強制法を考えているので、 $\gamma$  が非可算共終数を持つときには、 $(\exists \alpha < \gamma)(\forall \beta \in \gamma \setminus \alpha)$  は強制関係の外にあらうが中にあらうが同じなことに注意しておく。

**定義 16.**  $\lambda, \mu$  を非可算正則基数、 $P$  を ccc 強制法、 $\mathbf{R} = (X, Y, \sqsubset)$  を定義可能な関係システムとする。このとき  $\text{COB}(\mathbf{R}, P, \lambda, \mu)$  は次の主張である： $< \lambda$ -directed な半順序集合  $(S, <)$  でサイズ  $\mu$  なものと  $Y$  の元の  $P$ -名前の族  $(\dot{y}_s : s \in S)$  があって、 $X$  の元のどんな  $P$ -名前  $\dot{x}$  についても

$$(\exists s \in S)(\forall t > s) P \Vdash \dot{x} \sqsubset \dot{y}_t$$

となる。

$\text{EUB}(\mathbf{R}, P, \gamma)$  は  $\text{COB}(\mathbf{R}^\perp, P, \text{cf}(\gamma), \text{cf}(\gamma))$  と同値なことに注意する。

**補題 17.**  $\text{COB}(\mathbf{R}, P, \lambda, \mu)$  は  $P \Vdash (\mathfrak{b}_{\mathbf{R}} \geq \lambda \text{ かつ } \mathfrak{d}_{\mathbf{R}} \leq \mu)$  を含意する. また  $\text{EUB}(\mathbf{R}, P, \lambda)$  は  $P \Vdash (\mathfrak{b}_{\mathbf{R}} \leq \lambda \text{ かつ } \mathfrak{d}_{\mathbf{R}} \geq \lambda)$  を含意する.

証明. 前半の COB についての主張の証明. 集合  $(\dot{y}_s)_{s \in S}$  はサイズ  $\mu$  の dominating family なので  $\mathfrak{d}_{\mathbf{R}} \leq \mu$  を得る.

$\mathfrak{b}_{\mathbf{R}} \geq \lambda$  を示すために,  $(\dot{x}_\alpha)_{\alpha \in \theta}$  を長さ  $\theta < \lambda$  なる  $X$  の元の  $P$  名前の列とする. 各  $\dot{x}_\alpha$  について,  $s_\alpha \in S$  があって,  $(\forall t > s_\alpha) P \Vdash \dot{x}_\alpha \sqsubset \dot{y}_t$  である.  $S$  は  $<\lambda$ -directed なので, ある  $t$  があってどの  $s_\alpha$  よりも大きい. したがって,  $P \Vdash \dot{x}_\alpha \sqsubset \dot{y}_t$  がすべての  $\alpha$  で成り立つ. すなわち  $\{\dot{x}_\alpha : \alpha \in \theta\}$  は bounded である.

後半の EUB についての主張は上の主張と前半の主張から従う. □

## 2 Cichoń の図式の左半分

### 2.1 初めの強制法 $\mathbb{P}^5$

これから「部分的アメーバ強制法」「部分的ランダム強制法」「部分的 Hechler 強制法」「部分的 eventually different 強制法」を定義する. そのために, 性質 8 を持つ強制法の有限台反復  $(P_\alpha, Q_\alpha : \alpha < \delta)$  を考える.  $(\dot{\eta}_\alpha : \alpha < \delta)$  をジェネリック実数の列とする.  $\alpha < \delta$  と  $w \subseteq \alpha$  を固定する.

**定義 18.** 1.  $V$  の元  $(B, u)$  が  $w$ -コードであるとは,  $u$  が  $u \subseteq w$  なる可算集合であり  $B$  が  $B: \mathbb{R}^u \rightarrow \mathbb{R}$  なる Borel 関数であることを意味する.

2.  $V^{P_\alpha}$  の実数  $x$  が  $w$ -コード  $(B, u)$  の解釈であるとは,  $x = B((\eta_\beta)_{\beta \in u})$  であることを意味する

3.  $\dot{Q}_\alpha$  が  $w$ -部分的ランダム強制法であるとは,

$$P_\alpha \Vdash Q_\alpha = \{q : q \text{ はランダム強制法の条件であり, } q \text{ はある } w\text{-コード } (B, u) \text{ in } V \text{ の解釈}\}$$

となっていることを意味する. ただし,  $Q_\alpha$  の順序はランダム強制法の順序の制限であるとする.

次の定義は後の節で使う.

**定義 19.** 1.  $(p, q) \in P_\alpha * Q_\alpha$  が位置  $\alpha$  で決定されているとはコード  $(B, u)$  があって,  $p$  が  $q$  が  $(B, u)$  のコードであることを強制することだとする.  $(p, q)$  が与えられたとき, 一般には  $q$  のコードの  $P_\alpha$  名前が取れるにすぎないので位置  $\alpha$  で決定されていないが,  $p' \leq p$  を取って  $(p', q)$  が位置  $\alpha$  が決定されているようにすることができる.

2.  $Q_\alpha$  の元を表すグラウンドモデルコード列とはコードの列  $(B_n, u_n)_{n \in \omega}$  で,  $u_n \subseteq w$  なものである.

ランダム強制法以外のアメーバ, Hechler, eventually different 強制法についても  $w$ -部分的強制法を同様に定義する.

**仮定 20.**  $\aleph_1 < \lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3 < \lambda_4 < \lambda_5$  を正則基数たちで  $\mu < \lambda_i$  ならば  $\mu^{\aleph_0} < \lambda_i$  となるものたちとする. また,  $\lambda_3$  は正則基数  $\chi$  で  $\chi^{\aleph_0} = \chi$  なものの後続基数だと仮定し,  $\lambda_5^{<\lambda_4} = \lambda_5$  と



する.

$\delta_5 = \lambda_5 + \lambda_5$  とおき,  $\delta_5 \setminus \lambda_5$  の非有界部分集合たち  $S^1, S^2, S^3$  and  $S^4$  への分割を固定する. 各  $\alpha \in \delta_5 \setminus \lambda_5$  について  $w_\alpha \subseteq \alpha$  であって各  $\{w_\alpha : \alpha \in S^i\}$  は  $[\delta_5]^{<\lambda_i}$  の中で共終であると仮定する.

**定義 21.**  $\mathbb{P}^5 = (P_\alpha, Q_\alpha)_{\alpha \in \delta_5}$  を有限台反復であって,  $\alpha \in \lambda_5$  に対する  $Q_\alpha$  は Cohen 強制法であり

$$Q_\alpha \text{ は } w_\alpha\text{-部分的} \left\{ \begin{array}{c} \text{アメーバ} \\ \text{ランダム} \\ \text{Hechler} \\ \text{eventually different} \end{array} \right\} \text{ 強制法} \quad (\alpha \text{ が } \left\{ \begin{array}{c} S^1 \\ S^2 \\ S^3 \\ S^4 \end{array} \right\} \text{ の元するとき})$$

であるものとする.

事実 13 より  $\mathbb{P}^5$  は  $i \in \{1, 2, 4\}$  について  $(\lambda_i, \mathbf{R}_i)$ -good である. したがって補題 14 より次が従う.

**補題 22.**  $i \in \{1, 2, 4\}$  と正則基数  $\kappa \in [\lambda_i, \lambda_5]$  について  $\text{EUB}(\mathbf{R}, \mathbb{P}^5, \kappa)$  が成り立つ.

**補題 23.**  $i \in \{1, 2, 3, 4\}$  について  $\text{COB}(\mathbf{R}, \mathbb{P}^5, \lambda_i, \lambda_5)$  が成り立つ.

証明.  $S = S^i$  とおき,  $S$  上の順序  $<$  を  $s < t \iff w_s \subsetneq w_t$  で定める.  $\lambda_i$  が正則なので  $(S, <)$  は  $<\lambda_i$ -directed である.  $\dot{y}_s$  を  $s$  で追加されるジェネリック実数とする (たとえば,  $i = 2$  のときは部分的ランダム実数).  $\mathbb{P}^5$  名前  $\dot{x}$  は Borel な方法でジェネリック実数たちの可算な添字の集合  $w^* \subseteq \delta$  による部分列のみに依存する.  $s \in S^i$  であって  $w_s \supseteq w^*$  となるものをとる.  $t > s$  を任意にとる. このとき  $w_t \supseteq w_s$  なので  $w_t$  は  $\dot{x}$  を計算するためのすべての情報を含む. よって,  $\mathbb{P}^5 \Vdash \dot{x} \subset_i \dot{y}_t$  を得る.  $\square$

## 2.2 $\mathfrak{b}$ を GCH なしで扱う

前の節の内容では  $\text{EUB}(\mathbf{R}_3, \mathbb{P}^5, \kappa)$  (これは  $\mathfrak{b}$  が小さいことに対応する) が抜けていたことに注意しよう. 適切にパラメータ  $(w_\alpha)_{\alpha \in S^4}$  を選ぶことでこの EUB も得られることをこの節と次の節で見えていく.

この節に限って, 仮定 20 に加えて次も仮定する.

**仮定 24.** (この節限定)  $2^\chi = |\delta_5| = \lambda_5$ .

$S^0 = \lambda_5 \cup S^1 \cup S^2 \cup S^3$  とおく. よって  $\delta_5 = S^0 \cup S^4$  であり,  $\mathbb{P}^5$  は長さ  $\delta_5$  の FS ccc 反復であり,  $\alpha \in S^0$  は  $|Q_\alpha| < \lambda_3$  を含意する. すなわち  $|Q_\alpha| \leq \chi$  を含意する.  $\alpha \in S^0$  に対して  $P_\alpha$  名前

$$i_\alpha : Q_\alpha \rightarrow \chi \text{ 単射} \tag{1}$$

を固定する.

各条件  $p \in \mathbb{P}^5$  はある条件  $q$  に強めて  $\alpha \in \text{supp}(q) \cap S^0$  ならば  $q \restriction \alpha \Vdash i_\alpha(q(\alpha)) = \dot{j}$  for some  $j \in \chi$  となるようにできることに注意しておく.

eventually different 強制法について再掲しておく.  $\mathbb{E} = \{(s, k, \varphi) : s \in \omega^{<\omega}, k \in \omega, \varphi: \omega \rightarrow [\omega]^{\leq k}, (\forall i \in \text{dom}(s))(s(i) \notin \varphi(i))\}$  で順序を

$$(s', k', \varphi') \leq (s, k, \varphi) \iff s \subseteq s' \wedge k \leq k' \wedge (\forall i)(\varphi(i) \subseteq \varphi'(i))$$

を入れたものを eventually different 強制法という.  $\mathbb{E}$  ジェネリックフィルター  $G$  から作られる実数  $e = \bigcup \{s : (s, k, \varphi) \in G\}$  を eventually different generic 実数という.  $(s, k, \varphi) \in \mathbb{E}$  に対して  $s$  を幹,  $k$  を幅と呼ぶことにする.

次の性質たちは容易に観察できる.

**観察 25.** • もし  $p, q \in \mathbb{E}$  が両立可能ならばそれらは最大の共通下界を持つ.

- 同じ幹を持つ有限個の条件について, それらは同じ幹の共通下界を持つ. よって,  $\mathbb{E}$  は  $\sigma$ -centered である.
- もし  $q = (s', k', \varphi')$  かつ  $p = (s, k, \varphi)$  であって  $s'$  が  $s$  の延長であるならば,  $p$  と  $q$  が両立可能であるのは, ちょうど  $s'(i) \notin \varphi(i)$  for all  $i \in \text{dom}(s')$  であるときである.
- もし  $q^* = (s^*, k^*, \varphi^*)$  が有限集合  $B \subseteq \mathbb{E}$  のすべての元と両立可能ならばかつ  $s^*$  が各  $(s, k, \varphi) \in B$  について  $s$  の延長ならば,  $B \cup \{q^*\}$  は下界を持つ. ( $s^*$  を幹として使い,  $B \cup \{q^*\}$  に現れるすべての  $\varphi$  の pointwise の和集合をとればよい.)

我々は  $\mathbb{E}$  ではなく  $\mathbb{E}$  の部分的バージョンで強制する.  $\alpha \in S^4$  に対する  $P_\alpha$  拡大において, この部分強制  $Q_\alpha = \mathbb{E}'$  は (必ずしも完備埋め込みでない)  $\mathbb{E}$  の部分強制法であり, conjunction で閉じている (すなわち, 条件の有限集合について最大下界を取る部分操作で閉じている). よって両立可能性は  $\mathbb{E}$  で見ても  $\mathbb{E}'$  で見ても変わらない. そして先程の観察は  $\mathbb{E}'$  に対しても成り立つ. 後の参照のために最後の項目を明示的に主張しておく.

**事実 26.**  $\mathbb{E}' \subseteq \mathbb{E}$  が conjunction で閉じているものとする. もし条件  $q^* = (s^*, k^*, \varphi^*) \in \mathbb{E}'$  が有限集合  $B \subseteq \mathbb{E}'$  のどの元とも両立可能かつ  $s^*$  が各  $(s, k, \varphi) \in B$  に対する  $s$  の延長ならば  $B \cup \{q^*\}$  は下界を  $\mathbb{E}'$  に持つ.

**定義 27.**  $D$  を  $\omega$  上の非単項ウルトラフィルターとし  $\bar{p} = (p_n)_{n \in \omega} = (s, k, \varphi_n)_{n \in \omega}$  を  $\mathbb{E}$  の条件の列であって, 同じ幹と幅を持つものとする.  $\lim_D \bar{p}$  という条件を  $(s, k, \varphi_\infty)$  であって, すべての  $i$  と  $j$  について  $j \in \varphi_\infty(i) \iff \{n : j \in \varphi_n(i)\} \in D$ . となるものとして定める.

$\lim_D \bar{p} \in \mathbb{E}$  である. また,  $q \leq \lim_D \bar{p}$  ならば集合  $B := \{n \in \omega : p_n \text{ compatible with } q\}$  は  $D$  の元である.

(証明:  $q = (s', k', \varphi') \leq \lim_D \bar{p} = (s, k, \varphi_\infty)$  とする. よって各  $i \in \text{dom}(s')$  について  $s'(i) \notin \varphi_\infty(i)$  であり, 極限の定義より  $A^i := \{n : s'(i) \notin \varphi_n(i)\} \in D$  である. もし  $n \in \bigcap_{i \in \text{dom}(s')} A^i$  ならば  $p_n$  は  $q$  と両立する.)

集合  $B$  は両立可能性のみを使って定義されているので, 両立可能性を保存する部分強制に対してなお主張は成り立つ. 後の参照のためにこれを述べておく:

**事実 28.**  $\mathbb{E}'$  が conjunction で閉じた  $\mathbb{E}$  の部分強制で  $\bar{p}$  が  $\mathbb{E}'$  の条件の列で同じ幹と幅を持つものとし,  $\lim_D(\bar{p}) \in \mathbb{E}'$  と  $q \leq_{\mathbb{E}'} \lim_D(\bar{p})$  を仮定する. このとき  $B := \{n \in \omega : p_n \text{ compatible with } q\}$  は  $D$  の元である.

**定義 29.** • **部分的なガードレール**とは関数  $h$  でその定義域は  $\delta_5$  の部分集合であり,  $\alpha \in S^0 \cap \text{dom}(h)$  について  $h(\alpha) \in \chi$  かつ,  $\alpha \in S^4 \cap \text{dom}(h)$  について  $h(\alpha) \in \omega^{<\omega} \times \omega$  であるものである.

- **可算なガードレール**とは部分的なガードレールであって可算な定義域を持つものである.  
**フルガードレール**とは部分的ガードレールで定義域が  $\delta_5$  なものである.

Engelking と Karłowicz [EK65] は位相空間のボックス積の density を調べるために次の補題を証明した. 我々はこの結果を使う.

**補題 30.**  $\theta, \mu$  を無限基数とし  $\mu^{<\theta} = \mu$  とする. このとき, 関数の族  $(f_\xi : \xi < \mu)$  であって各  $f_\xi : 2^\mu \rightarrow \mu$  であって, どんな関数  $f$  であって  $\text{dom}(f) \in [2^\mu]^{<\theta}$  かつ  $\text{ran}(f) \subseteq \mu$  なものについてもある  $\xi < \mu$  があって  $f \subseteq f_\xi$  である.

補題 30 より次が従う.

**補題 31.** ( $|\delta_5| \leq 2^\chi$  and  $\chi^{\aleph_0} = \chi$  なので, ) フルガードレールの族  $H^*$  で  $|H^*| = \chi$  なものがあり, 各可算ガードレールはある  $h \in H^*$  に拡大される. このような族  $H^*$  を一つ固定し,  $(h_\varepsilon^*)_{\varepsilon \in \chi}$  と  $H^*$  の元を枚挙する.

**定義 32.** 条件  $p \in \mathbb{P}^5$  がフルガードレール  $h$  に従うとは次の 2 条件を満たすことをいう.

- すべての  $\alpha \in S^0 \cap \text{dom}(p)$  について  $P_\alpha$  は  $p(\alpha) \in Q_\alpha$  かつ  $i_\alpha(p(\alpha)) = h(\alpha)$  を強制する ( $i_\alpha$  は (1) で定義されたもの)
- すべての  $\alpha \in S^4 \cap \text{dom}(p)$  について :
  - $p \restriction \alpha$  は  $p(\alpha)$  の幹と幅の組が  $h(\alpha)$  に等しいことを強制する.
  - $p \restriction (\alpha + 1)$  は  $\alpha$  において決定されている.

我々は FS 反復を扱っているので, 条件  $p$  であって各位置  $\alpha \in \text{dom}(p)$  において決定されているものの集合は稠密である. よって次が成り立つ.

- 条件  $p$  であってあるガードレール  $h$  が存在して  $p$  が  $h$  に従うものは稠密である.
- 各固定されたガードレール  $h$  について条件  $p$  であって  $h$  に従うものの集合は centered である.

**定義 33.** • **ルート  $\nabla$  の  $\Delta$  システムでフルガードレール  $h$  に従うもの**とは族  $\bar{p} = (p_i)_{i \in I}$  であって, おおのの  $p_i$  はすべて  $h$  に従い,  $(\text{dom}(p_i) : i \in I)$  は通常の意味でルート  $\nabla$  の  $\Delta$  システムであるものをいう (よって  $\nabla \subseteq \delta_5$  は有限).

- 特に可算な  $\Delta$  システムについて興味がある.  $(p_n : n \in \omega)$  をルート  $\nabla$  の  $\Delta$  で  $h$  に従うものとし,  $\bar{D} = (D_\alpha : \alpha \in u)$  を列であって  $u \supseteq \nabla \cap S^4$  かつ  $D_\alpha$  は  $\omega$  上の超フィルターを表す  $P_\alpha$  名前であるとする. このとき定義域  $\nabla$  の関数  $\lim_{\bar{D}} \bar{p}$  を次で定める.
  - もし  $\beta \in \nabla \cap S^0$  ならば,  $\lim_{\bar{D}} \bar{p}(\beta)$  はすべての  $p_n(\beta)$  の共通の値である (その値はすでにガードレール  $h$  によって決定されていることに注意する).
  - もし  $\alpha \in \nabla \cap S^4$  ならば,  $\lim_{\bar{D}} \bar{p}(\alpha)$  は  $\mathbb{P}_\alpha^5$  によって強制されることの  $\lim_{D_\alpha} (p_n(\alpha))_{n \in \omega}$  である.

一般的には  $\lim_{\bar{D}} \bar{p}$  は  $\mathbb{P}^5$  の条件とは限らないことに注意する： $\alpha \in S^4 \cap \nabla$  について、 $\lim_{\bar{D}} \bar{p}(\alpha)$  は eventually different 強制法  $\mathbb{E}$  の条件であることは確かだが、それが必ずしも部分的 eventually different 強制法  $Q_\alpha$  に入っているとは言えない。

また次に注意する：もし  $\bar{p}$  が可算な  $\Delta$  システムかつ  $\alpha \in \nabla \cap S^4$  ならば  $(p_n(\alpha))_{n \in \omega}$  はグラウンドモデルコード列である (定義 19(2) を見よ)。これは “ $p_n$  が  $h$  に従う” の定義と  $\bar{p}$  is in  $V$  より従う。

今我々は  $(w_\alpha)_{\alpha \in S^4}$  を除いたすべての  $\mathbb{P}^5 = (P_\alpha, Q_\alpha)_{\alpha \in \delta_5}$  を定義するためのパラメータを固定している。よって、 $\alpha \in S^4 \cap \beta$  に対して  $w_\alpha$ ,  $P_\beta$  を知れる。

次が Cichoń’s maximum で最も重いポイントである。本稿では証明を省略する。

**構成 34.**  $\alpha \in \delta_5$  に関する帰納法で列  $(D_\alpha^\varepsilon)_{\varepsilon \in \chi}$  と  $\alpha \in S^4$  に対する  $w_\alpha$  を次を満たすように構成できる：

1. 各  $D_\alpha^\varepsilon$  は非単項超フィルターの  $P_\alpha$  名前であって、 $P_\alpha \Vdash \bigcup_{\beta < \alpha} D_\beta^\varepsilon \subseteq D_\alpha^\varepsilon$ .
2. 各可算な  $\Delta$  システム  $\bar{p}$  in  $P_\alpha$  でガードルール  $h_\varepsilon^* \in H^*$  に従うものに対して：  
 $\lim_{(D_\beta^\varepsilon)_{\beta < \alpha}} \bar{p}$  は  $P_\alpha$  の元...
3. ... かつ強制することの  $A_{\bar{p}} := \{n \in \omega : p_n \in G_\alpha\}$  は  $D_\alpha^\varepsilon$  の元.
4.  $\alpha \in S^4$  のとき、 $w_\alpha \subseteq \alpha$ ,  $|w_\alpha| < \lambda_4$  かつ  $Q_\alpha$  の元のすべてのグラウンドモデルコード列と  $\varepsilon \in \chi$  について  $D_\alpha^\varepsilon$  極限は  $Q_\alpha$  に属することが強制される。  
(実際には、これを満たす  $w_\alpha$  の集合は  $[\alpha]^{<\lambda_4}$  の中で  $\omega_1$ -club となる。すなわち、各  $w^* \in [\alpha]^{<\lambda_4}$  について  $w_\alpha \supseteq w^*$  で (d) を満たすものが存在し、そして  $(w^i)_{i \in \omega_1}$  という (d) を満たすものの増加列について極限  $w_\alpha := \bigcup_{i \in \omega_1} w^i$  も (d) を満たす。)

上記の構成のもとで、次が得られる。

**補題 35.**  $\kappa \in [\lambda_3, \lambda_5]$  に対する  $\text{EUB}(\mathbf{R}_3, \mathbb{P}^5, \kappa)$  が成立する。なおかつ、それは最初の  $\kappa$  個の Cohen 実数によって witness される。

証明。証明したいことは、どんな  $\mathbb{P}^5$  名前  $y$  についても coboundedly many に  $\alpha \in \kappa$  があって、 $\mathbb{P}^5 \Vdash \neg c_\alpha \leq^* y$  となることである。

背理法で、 $p^*$  が次を強制するとしよう；unboundedly many の  $\alpha \in \kappa$  について  $c_\alpha \leq^* y$  である。

そしてそのような添字  $\alpha$  たちを  $(\alpha_i)_{i \in \kappa}$  と昇順で枚挙する (よって特に  $\alpha_i \geq i$ )。各  $i$  について  $p_i \leq p^*$  であって  $\alpha_i$  をある  $\beta_i$  に決定し、かつ  $n_i$  であって  $(\forall m \geq n_i) c_{\alpha_i}(m) \leq y(m)$  となるものも決定するものとする。 $\beta_i \in \text{dom}(p_i)$  を仮定しても良い。 $\beta_i < \kappa \leq \lambda_5$  なので  $\beta_i$  は Cohen の位置であり、したがって  $p_i(\beta_i)$  は Cohen の条件 in  $V$  だとしてよい。 $\Delta$  システム補題や鳩の巣原理を使うことで添え字集合を縮めて、以下を仮定できる：

- すべての  $n_i$  はある  $n^*$  に等しい。
- $(p_i)_{i \in \kappa}$  はルート  $\nabla$  の  $\Delta$  システムである。
- $\beta_i \notin \nabla$  であり、特に  $\beta_i$  たちは互いに異なる。  
(実際、どんな  $\beta \in \kappa$  についてもたかだか  $|\beta|$  個の  $p_i$  が  $\alpha_i = \beta$  を強制できる、なぜなら  $p_i$  は  $\alpha_i \geq i$  を強制するから。)

- $p_i(\beta_i)$  は常に同じ Cohen の位置  $s$  であり, 一般性を失わず同じ長さ  $n^{**} \geq n^*$  としてよい (そうでなければ  $s$  を拡大する).

この  $\Delta$  システムの最初の  $\omega$  個の元  $(p_i)_{i \in \omega}$  をとる. 今, 各  $p_i$  を  $p'_i$  に拡大する: Cohen の条件  $p_i(\beta_i) = s$  を  $s \frown i$  に拡大することで (すなわち,  $p'_i$  により  $c_{\alpha_i}(n^{**}) = i$  がこれで強制されるようになる). 今  $(p'_i)_{i \in \omega}$  はなお可算な  $\Delta$  システムであり新しい可算なガードレールに従い, したがって, あるフルガードレール  $h_\varepsilon^* \in H^*$  に従う.

結果として  $\lim_{(D_\alpha^\varepsilon)_{\alpha \in \delta_5}} \bar{p}'$  は強制することの, 無限個に多くの  $p'_i$  がジェネリックフィルターに入る (構成 34(3)). しかしそのようなものの  $p'_i$  は  $c_{\alpha_i}(n^{**}) = i \leq y(n^{**})$  を強制する. これは  $y^{**}$  が自然数なことに反している.  $\square$

## 2.3 GCH を復活させる

本稿の残りではグラウンドモデル  $V$  で仮定 20 に加えて次が成り立つと仮定する.

**仮定 36.** GCH が成り立つ.

(これは仮定 24 と両立しないことに注意.)

$\mathbb{P}^5$  を定めるための  $\bar{w} = (w_\alpha)_{\alpha \in S^4}$  を除いたすべてのパラメータが固定されていることに注意する.

**補題 37.**  $\bar{w}$  を適当に選べばすべての正則基数  $\kappa \in [\lambda_3, \lambda_5]$  について  $\text{EUB}(\mathbf{R}_3, \mathbb{P}^5, \kappa)$  が成り立つ.

これを示すためにかんたんな観察から始める.

**補題 38.**  $\chi$  を基数とし,  $B$  を集合とし,  $X^0 \in [B]^\chi$  とする.  $\mathbb{R}$  は  $\chi^+$ -cc な強制概念で  $C$  は  $\mathbb{R}$  名前前で次を満たすとする:

$$\mathbb{R} \Vdash "C \text{ は } [B]^\chi \text{ の } \omega_1\text{-club 部分集合}."$$

するとある集合  $X \supseteq X^0$  がグラウンドモデルに存在し,  $\mathbb{R} \Vdash X \in C$ .

証明. 帰納法により列  $(X^\alpha, \tilde{X}^\alpha : \alpha < \omega_1)$  を次のように選ぶ.

- $X^\alpha$  は  $[B]^\chi$  の元
- $X^\alpha$  たちは  $\alpha$  に関して単調増大
- $\tilde{X}^\alpha$  は  $\mathbb{R}$  名前前で  $\mathbb{R}$  で次が強制される: “ $\tilde{X}^\alpha$  は  $C$  の元で  $X^\alpha$  を含む; そして  $\tilde{X}^\alpha$  たちの列は単調増加である (必ずしも連続ではない). ”
- $\mathbb{R}$  で  $\tilde{X}^\alpha \subseteq X^{\alpha+1}$  が強制される.

(極限ステップ  $\gamma$  では  $X^\gamma = \bigcup_{\alpha < \gamma} X^\alpha$  とおき, 後続ステップ  $\alpha + 1$  では  $\chi^+$ -cc を使って名前  $\tilde{X}^\alpha$  をカバーする.) すると  $X = \bigcup_{\alpha \in \omega_1} X^\alpha$  が望まれた集合である.  $\square$

**補題 37 の証明.**  $\mathbb{R}$  を  $<\chi$ -closed かつ  $\chi^+$ -cc な強制法で  $2^\chi = \lambda_5$  を強制するものとする.

$\mathbb{R}$  拡大  $V^*$  の中で仮定 24 は成り立つ. そして仮定 20 はなお成り立つ

$(w_\alpha)_{\alpha \in S^i}$  はなお  $[\delta_5]^{<\lambda_i}$  の中で共終である:  $i = 1, 2$  について強制法  $\mathbb{R}$  は  $[\delta_5]^{<\lambda_i}$  の元を付け加えない.  $\mathbb{R}$  が  $\lambda_i$ -closed だから.

$i = 3$  について,  $\delta_5$  の新しい部分集合でサイズ  $\theta < \lambda_3$  なものは, グラウンドモデルの集合でサイズがたかだか  $\theta \times \chi < \lambda_3$  なものに含まれる.  $\mathbb{R}$  が  $\chi^+$ -cc だから.

よって  $V^*$  の中で帰納的な構成 34 を実行できる. 実際には  $V$  の中で  $\alpha \in \delta_5$  に関する帰納法で次が構成できる. まず, ある共終な列  $\bar{w}^{\text{initial}} = (w_\alpha^{\text{initial}})_{\alpha \in S^4}$  を  $V$  で固定しておく.

- $\mathbb{R}$  名前  $(D_\alpha^\varepsilon)_{\varepsilon \in \chi}$  で構成 34 の (1,2,3) に従ったもの.
- $\alpha \in S^4$  ならば  $w_\alpha \supseteq w_\alpha^{\text{initial}}$  が  $V$  の中に取れて  $\mathbb{R}$  が  $w_\alpha$  が構成 34 の (4) を満たすことを強制する.

(補題 38 と  $w_\alpha$  の候補たちの集合が  $[\alpha]^{<\lambda_4}$  の中で  $\omega_1$ -club 集合だったことを使う.)

よって,  $V$  の中でパラメータ  $\bar{w}$  であって次を満たすものを得た:  $\mathbb{R}$  拡大  $V^*$  の中で同じパラメータは強制法  $\mathbb{P}^{*,5}$  を定め, それは  $\text{EUB}(\mathbf{R}_3, \mathbb{P}^{*,5}, \kappa)$  in  $V^*$  を満たす.

$\mathbb{P}^{*,5}$  は基本的に  $\mathbb{P}^5$  と同じものである.

$\mathbb{R}$  拡大  $V^*$  の中で  $\mathbb{P}^5 = (P_\alpha, Q_\alpha)_{\alpha < \delta_5}$  ( $V$  の中で構成したもの) は標準的に  $\mathbb{P}^{*,5} = (P_\alpha^*, Q_\alpha^*)_{\alpha < \delta_5}$  に稠密埋め込みされる.

証明: 帰納法により ( $\mathbb{R}$  拡大の中で)  $P_\alpha^*$  が強制することの,  $Q_\alpha^*$  ( $P_\alpha^*$ -ジェネリックによって評価される) が  $Q_\alpha$  ( $P_\alpha$  (帰納法の仮定より  $P_\alpha^*$  と等価) のジェネリックにより評価される) と等しいとなることを示す.  $Q_\alpha^*$  の任意の元は  $V$  にすでに存在する Borel 関数を添字  $w_\alpha$  の位置にある可算個のジェネリック実数に適用したものである. それは  $V$  にすでにある.

これは次を導く:

$V$  においてすべての正則基数  $\kappa \in [\lambda_3, \lambda_5]$  について  $\text{EUB}(\mathbf{R}_3, \mathbb{P}^5, \kappa)$  が成り立ち, それは  $\kappa$  個 Cohen 実数により witness される.

証明:  $y$  を実数の  $\mathbb{P}^5$  名前とする.  $V^*$  においてにおいて  $y$  を  $\mathbb{P}^{*,5}$  名前として解釈する.  $\text{EUB}(\mathbf{R}_3, \mathbb{P}^{*,5}, \kappa)$  が成り立つので,  $(\exists \alpha \in \kappa) (\forall \beta \in \kappa \setminus \alpha) \mathbb{P}^{*,5} \Vdash c_\beta \dot{\leq}^* y$  となる. ここで  $c_\beta$  は  $\beta$  番目の Cohen 実数である.  $\chi < \kappa$  なので  $V$  の中に  $\alpha^* < \kappa$  であって  $\alpha$  の取りうる値の上界がとれる. 任意の  $\beta \in \kappa \setminus \alpha^*$  について  $V$  において絶対性より  $\mathbb{P}^5 \Vdash c_\beta \dot{\leq}^* y$  が分かる.  $\square$

**定理 39.** GCH を仮定し  $\lambda_i$  が仮定 20 を満たすものとして与えられるとする. このときパラメータを適切に定めることで, 定義 21 での FS ccc 反復  $\mathbb{P}^5$  が  $i = 1, 2, 3, 4$  について次を満たすようにできる:

- 任意の  $[\lambda_i, \lambda_5]$  内の正則基数  $\kappa$  について,  $\text{EUB}(\mathbf{R}_i, \mathbb{P}^5, \kappa)$  が成り立つ.
- $\text{COB}(\mathbf{R}_i, \mathbb{P}^5, \lambda_i, \lambda_5)$  が成り立つ.

よって特に  $\mathbb{P}^5$  は  $\text{add}(\mathcal{N}) = \lambda_1$ ,  $\text{cov}(\mathcal{N}) = \lambda_2$ ,  $\mathfrak{b} = \lambda_3$ ,  $\text{non}(\mathcal{M}) = \lambda_4$ ,  $\text{cov}(\mathcal{M}) = \mathfrak{d} = \text{non}(\mathcal{N}) = \text{cof}(\mathcal{N}) = \lambda_5 = 2^{\aleph_0}$  を強制する.

### 3 ブール超冪

#### 3.1 ブール超冪

$\kappa$  を強コンパクト基数とし、 $B$  を  $\kappa$  分配的かつ  $\kappa^+$ -cc を持つ無原子完備ブール代数とする。すると任意の  $B$  内の  $\kappa$  完備フィルターは  $\kappa$  完備なウルトラフィルターに拡大される。  $U$  は  $\kappa^+$  完備ではない。今、 $\kappa$  完備なウルトラフィルター  $U$  を固定する。

**BUP 名前**とは関数  $x: A \rightarrow V$  であって、その定義域  $A$  は  $B$  の極大反鎖であるものである。 $x$  の定義域を  $A(x)$  と書く。

任意の BUP 名前は  $V$  の元の  $B$ -名前を定める：BUP 名前  $x$  に対して  $\{\widetilde{(x(a), a)} : a \in A(x)\}$  である。逆に  $V$  の元の  $B$ -名前はそれと強制同値な BUP 名前を持つ。BUP 名前とそこから定まる  $B$ -名前を同一視する。

2 つの BUP 名前に対してブール値  $\llbracket x = y \rrbracket$  が定まる。 $x$  と  $y$  が同値とは  $\llbracket x = y \rrbracket \in U$  であることを指す。

$v \in V$  の標準名前  $\check{v}$  とは  $\{(1_B, w) : w \in v\}$  のことである。

ブール超冪  $M^-$  は BUP 名前  $x$  の同値類  $[x]$  からなる。 $[x] \in^- [y]$  を  $\llbracket x \in y \rrbracket \in U$  により定義する。 $j^-: V \rightarrow M^-$  を  $v$  を  $[\check{v}]$  に送る写像として定める。

BUP 名前  $x_1, \dots, x_n$  に対してブール値  $\llbracket \varphi(x_1, \dots, x_n) \rrbracket$  が適切に定まる。

次が成り立つ。

1. Loś の定理:  $(M^-, \in^-) \models \varphi([x_1], \dots, [x_n])$  が成り立つのはちょうど  $\llbracket \varphi(x_1, \dots, x_n) \rrbracket \in U$  のとき。
2.  $j^-: (V, \in) \rightarrow (M^-, \in^-)$  は初等埋め込み。
3. 特に  $(M^-, \in^-)$  は ZFC のモデル。

$U$  が  $\sigma$  完備なので、 $(M^-, \in^-)$  は wellfounded である。 $M$  を  $(M^-, \in^-)$  の推移崩壊とする。そして  $j: V \rightarrow M$  を  $j^-$  と推移崩壊写像の合成とする。 $[x]$  の推移崩壊  $x^U$  と書く。したがって、 $\check{v}^U = j(v)$  である。

- 事実 40.**
1.  $M \models \varphi(x_1^U, \dots, x_n^U)$  となるのはちょうど  $\llbracket \varphi(x_1, \dots, x_n) \rrbracket \in U$  となるとき。特に  $j: V \rightarrow M$  は初等埋め込み。
  2.  $|Y| < \kappa$  ならば  $j(Y) = j''Y$  である。特に  $j$  の  $\kappa$  への制限は恒等写像である。 $M$  は  $<\kappa$  列で閉じている。
  3.  $j(\kappa) \neq \kappa$ , 特に  $\kappa = \text{crit}(j)$ 。

証明. 一つだけ示してみよう。 $\alpha < \kappa$  について  $j(\alpha) = \alpha$  を示す。背理法で、 $j(\alpha) > \alpha$  となる  $\alpha$  が存在するとして、そのような最小を取る。 $\alpha \in j(\alpha) \in M$  で  $M$  は推移的なので  $\alpha \in M$  である。そこで BUP 名前  $x$  をとって  $j(x) = \alpha$  となる。 $j(x) \in j(\alpha)$  だから Loś の定理より  $\llbracket \check{x} \in \check{\alpha} \rrbracket \in U$  となる。今ブール値  $\llbracket \check{x} \in \check{\alpha} \rrbracket$  は  $\bigvee_{\beta \in \alpha} \llbracket \check{x} = \check{\beta} \rrbracket$  に等しいことと、 $U$  の  $\kappa$  完備性より、ある  $\beta < \alpha$  があって、 $\llbracket \check{x} = \check{\beta} \rrbracket \in U$  となる。Loś の定理をもう一度使うと  $j(\beta) = j(x) = \alpha$ 。今  $\beta$  の最小性より  $j(\beta) = \beta$  だから  $\beta = j(\beta) = j(x) = \alpha$  となって、 $\beta < \alpha$  に反する。□

$V$  の元  $Y$  について、 $Y$  の元を表す強制名前は BUP 名前  $x$  でその値域  $\text{ran}(x)$  が  $Y$  の部分集

合であるものとして書ける．そのような BUP 名前を  $j(Y)$  の元を表す BUP 名前と呼ぶことにする (そのような名前  $x$  について  $x^U$  は  $j(Y)$  の元であるため)．

**補題 41.**  $(S, \leq)$  を  $\leq \kappa$ -directed な半順序集合としたとき,  $j''S$  は  $j(S)$  の中で cofinal である．

証明.  $j(S)$  の元を任意にとり,  $x^U$  とする．先程の注意より, BUP 名前  $x$  は  $\text{ran}(x) \subseteq S$  としてよい． $\text{dom}(x)$  は  $B$  が  $\kappa^+$ -cc なことよりサイズ  $\kappa$  以下なので,  $\text{ran}(x)$  は共通の上界  $s_0$  を持つ．すると  $\llbracket x \leq s_0 \rrbracket = 1_B$  となるので,  $(M^-, \epsilon^-) \models [x] \leq \check{s}_0$ ．したがって,  $x^U \leq j(s_0)$  となる．  $\square$

**定義 42.** BUP 埋め込みとは, 初等埋め込み  $j: V \rightarrow M$  ( $M$  は推移的) であって, 臨界点  $\kappa$  を持つものであって,  $M$  は  $< \kappa$ -closed かつ, どんな  $\leq \kappa$ -directed な半順序集合  $S$  についても  $j''S$  は  $j(S)$  内で cofinal になるものである．

よって,  $\kappa$ -分配的かつ  $\kappa^+$ -cc 原子なし完備ブール代数と  $\kappa$  完備ウルトラフィルタに対する上で定義した埋め込みは BUP 埋め込みである．

**補題 43.**  $j$  を BUP 埋め込みで  $\text{crit}(j) = \kappa$  なものとする．

1.  $|A| < \kappa$  ならば,  $j''A = j(A)$  である．
2. ある正則基数  $\lambda < \kappa$  について  $S$  が  $< \lambda$ -directed な半順序であるとき,  $j(S)$  は  $< \lambda$ -directed である．
3.  $\text{cf}(\alpha) \neq \kappa$  なる極限順序数  $\alpha$  について,  $j''\alpha$  は  $j(\alpha)$  の中で共終．よって特に  $\text{cf}(j(\alpha)) = \text{cf}(\alpha)$ ．

証明. 1 目.  $f: \lambda \rightarrow A$  全単射と  $\lambda < \kappa$  をとる．すると  $M$  で  $j(f): \lambda \rightarrow j(A)$  全単射が成り立つ．よって,  $x \in j(A)$  とすると  $\alpha < \lambda$  がとれて  $x = j(f)(\alpha)$  だが,  $j(f)(\alpha) = j(f(\alpha))$  なので, これで良い．

2 目.  $M$  で  $j(S)$  は  $< \lambda$ -directed な半順序なことが成り立ち,  $M$  が  $< \kappa$ -closed なことを使うとよい．

3 目.  $\text{cf}(\alpha) = \lambda \neq \kappa$  とする． $f: \lambda \rightarrow \alpha$  を共終単調増加関数とする． $\lambda < \kappa$  ならば  $M$  の中で  $j(f): \lambda \rightarrow j(\alpha)$  が共終単調増加関数となるが, これは絶対的である． $\lambda > \kappa$  ならば  $\alpha$  は  $\leq \kappa$ -directed な半順序なので,  $j''\alpha$  は  $j(\alpha)$  の中で共終である．よって  $j''f = (j(\xi), j(f(\xi)))_{\xi < \lambda}$  は  $\text{cf}(j''\lambda) = \text{cf}(j''\alpha) = \text{cf}(j(\alpha))$  を目撃する．他方で,  $\text{cf}(j''\lambda) = \text{cf}(\lambda) = \lambda$  である．これで示せた．  $\square$

### 3.2 $\kappa$ から $\theta$ への BUP 埋め込み

**補題 44.**  $\kappa$  を強コンパクト基数,  $\theta > \kappa$  を  $\text{cf}(\theta) > \kappa$  なる基数とする．このとき BUP 埋め込み  $j$  で  $\text{crit}(j) = \kappa$  かつ次の 3 条件を満たすものが存在する：

1.  $\text{cf}(j(\kappa)) = \text{cf}(\theta)$  かつ  $j(\kappa) \geq \theta$ ．
2. すべての  $\mu$  について  $|j(\mu)| \leq \max(\mu, \theta)^\kappa$ ．
3. 特に  $\theta^\kappa = \theta$  かつ  $\kappa \leq \mu \leq \theta$  ならば  $|j(\mu)| = \theta$ ．



証明. 次で定まる強制法  $(P_{\kappa, \theta}, \supseteq)$  の完備化を  $B$  とする:

$$P_{\kappa, \theta} = \{f : f \text{ は } \theta \text{ から } \kappa \text{ への部分関数で濃度が } < \kappa \text{ なもの}\}$$

$B$  は  $< \kappa$  分配的かつ  $\kappa^+$ -cc を持つ. この強制法はジェネリックな関数  $f^* : \theta \rightarrow \kappa$  を付け加える. よって, 各  $\delta < \theta$  に対して  $f^*(\delta)$  は  $\kappa$  の元を表す強制名前であり, したがって BUP 名前である.

1 番について.  $x$  を  $j(\kappa)$  の元を表す BUP 名前とする. すなわち  $x$  の定義域  $A$  は  $B$  の極大反鎖であり, 値域は  $\kappa$  の部分集合である.  $P_{\kappa, \theta}$  が  $B$  で稠密なので,  $A \subseteq P_{\kappa, \theta}$  と仮定してもよい.  $\delta < \theta$  を各  $a \in A$  について  $a$  の定義域の上限より大きいものとする ( $\text{cf}(\theta) > \kappa$  よりこれはある). このような  $(x, \delta)$  を「適切な組」と呼ぶことにする. そして

$$b_{x, \delta} = \llbracket f^*(\delta) > x \rrbracket$$

とおく.

今,  $b_{x, \delta}$  たちが  $\kappa$  完備なフィルターを生成することを主張する. それを示すために,  $(x_i, \delta_i : i < \mu)$ ,  $\mu < \kappa$  を適切な組の列とする.  $\bigwedge_{i < \mu} b_{x_i, \delta_i} \neq \emptyset$  を示す必要がある. 集合  $\{\delta_i : i < \mu\}$  の元を単調増加かつ重複なしに  $(\delta^\ell : \ell < \gamma)$ ,  $\gamma \leq \mu$  と並べる.  $A_\ell = \{i < \mu : \delta_i = \delta^\ell\}$  とおく. 条件  $q_\ell$  が与えられたときに  $q_{\ell+1} \in P_{\kappa, \theta}$  を次のように定める:

1.  $q_{\ell+1} \leq q_\ell$
2.  $\delta^\ell \in \text{supp}(q_{\ell+1}) \subseteq \delta^\ell \cup \{\delta^\ell\}$
3.  $q_{\ell+1} \upharpoonright \delta^\ell$  はすべての  $i \in A_\ell$  について  $x_i$  の値を  $\alpha_i$  に決定する.
4.  $q_{\ell+1}(\delta^\ell) = \sup_{i \in A_\ell} (\alpha_i) + 1$

この構成は  $q_{\ell+1}$  が各  $i \in A_\ell$  について  $b_{x_i, \delta_i}$  より強いことを保証する. 極限順序数  $\ell \leq \gamma$  についてはそこまで構成した条件の和集合をとる. すると  $q_\gamma$  は各  $b_{x_i, \delta_i}$  より強い条件となり主張が証明された.

さて,  $\kappa$  が強コンパクトなので,  $b_{x, \delta}$  ( $(x, \delta)$  は適切な組) が生成する  $\kappa$  完備フィルターを拡大して,  $\kappa$  完備ウルトラフィルター  $U$  を得ることができる. すると列  $(f^*(\delta)^U : \delta < \theta)$  は狭義単調増加かつ共終である ( $\delta < \delta'$  に対して  $(f^*(\delta), \delta')$  は適切であり, 適切な組の  $b$  は  $U$  に入っていることから). よって,  $\text{cf}(j(\kappa)) = \text{cf}(\theta)$  かつ  $j(\kappa) \geq \theta$  を得る.

2 番について.  $j(\mu)$  の元を表す BUP 名前の数を勘定すればよい. 反鎖は  $P_{\kappa, \theta}$  の部分集合としてよかったので,  $|P_{\kappa, \theta}| = \theta$  を考えると,  $j(\mu)$  の元を表す BUP 名前の数は

$$[\theta]^\kappa \times \mu^\kappa = \max(\theta, \mu)^\kappa$$

で抑えられる. したがって,

$$|j(\mu)| \leq \max(\theta, \mu)^\kappa.$$

□

**定義 45.**  $\kappa$  から  $\theta$  への BUP 埋め込みとは BUP 埋め込み  $j$  で臨界点  $\kappa$  を持ち,  $\text{cf}(j(\kappa)) = |j(\kappa)| = \theta$  となるものを言う.

**系 46.**  $\kappa$  を強コンパクト,  $\theta > \kappa$  を正則基数で  $\theta^\kappa = \theta$  とする. すると  $\kappa$  から  $\theta$  への BUP 埋め込みが存在する. (なおかつそれは,  $\kappa \leq \mu \leq \theta$  なる  $\mu$  に対して  $|j(\mu)| = \theta$  を満たす).

**補題 47.**  $j: V \rightarrow M$  を初等的で,  $M$  は推移的かつ  $<\kappa$ -closed かつ  $\text{crit}(j) = \kappa$  だとする. ある  $\nu < \kappa$  について  $P$  は  $\nu$ -cc であると仮定する.

1.  $j(P)$  は  $\nu$ -cc.
2.  $\tau$  が  $M[G]$  の元を表す  $j(P)$  名前ならば,  $j(P)$  名前が  $\sigma$  が  $M$  の中であって  $j(P) \Vdash \tau = \sigma$  となる.
3. 特に, どんな  $j(P)$  名前であって, 実数やボレルコード, 実数の可算列を表すものは同値なものが  $M$  中にある.
4.  $M[G]$  は  $V[G]$  の中で  $<\kappa$ -closed である.
5. もし  $\xi < \kappa$  であって  $P$  が  $2^\xi = \lambda$  を強制するならば  $j(P)$  は  $2^\xi = |j(\lambda)|$  を強制する.

証明. 1 番について.  $P$  が  $\nu$ -cc のため,

$$V \models \forall A \in [P]^\nu \exists p, q \in A (p \neq q \wedge p \parallel q)$$

となる. 初等性と  $j(\nu) = \nu$  より

$$M \models \forall A \in [j(P)]^\nu \exists p, q \in A (p \neq q \wedge p \parallel q).$$

$A \subseteq j(P)$  がサイズ  $\nu$  だとしたら,  $M$  の  $<\kappa$ -closed より,  $A \in M$  である. そこで  $M$  で  $\exists p, q \in A (p \neq q \wedge p \parallel q)$  が成り立つが, これは上向き絶対的であるため,  $V$  でも成り立つ.

2 番について. 名前  $\tau$  は組  $(A, f)$  であって  $A \subseteq j(P)$  は極大反鎖で  $f: A \rightarrow M$  は  $a$  を  $M$  中の  $j(P)$  名前に送るものに対応する.  $j(P)$  は  $\nu$ -cc かつ  $M$  は  $<\kappa$ -closed なので,  $(A, f)$  は  $M$  の元であり,  $M$  の中で  $(A, f)$  を  $j(P)$  名前  $\sigma$  として解釈できる.

これは直ちに (3) と (4) を含意する:  $j(P)$  名前  $\tau$  で  $M[G]$  の元の  $\zeta$ -列 ( $\zeta < \kappa$ ) を表すものが与えられたとき,  $\tau$  を名前の  $\zeta$ -列  $(\tau_i)_{i < \zeta}$  として解釈でき, 各  $\tau_i$  について同値な  $j(P)$  名前  $\sigma_i$  が  $M$  にある.  $M$  が  $<\kappa$ -closed なので,  $(\sigma_i)_{i < \zeta}$  は  $M$  にあり, よって  $j(P)$  名前を  $M$  の中にとって  $\tau$  と同値にできる.

(そして, もし  $\tau$  が  $j(P)$  名前で  $M[G]$  の中で  $<\kappa$  列なものを表すものだとすると,  $\kappa$  が正則で  $j(P)$  が  $\kappa$ -cc なことから  $\tau$  の長さの上界  $\zeta < \kappa$  をとれる.)

5 番について.  $M[G]$  では  $|2^\xi| = j(\lambda)$  と  $2^\xi \cap V[G] = 2^\xi \cap M[G]$  が成り立つ. □

### 3.3 EUB と COB の保存

**補題 48.**  $\mathbf{R}$  をポーランド関係システムとし,  $P$  を ccc 強制法とし,  $j$  を BUP 埋め込みで臨界点  $\kappa$  を持つものとする. このとき,  $\text{EUB}(\mathbf{R}, P, \delta)$  は  $\text{EUB}(\mathbf{R}, j(P), j(\delta))$  を導く. 特に正則基数  $\lambda \neq \kappa$  について,  $\text{EUB}(\mathbf{R}, P, \lambda)$  は  $\text{EUB}(\mathbf{R}, j(P), \lambda)$  を導く.

証明.  $\bar{x} = (x_\alpha : \alpha < \delta)$  を  $\text{EUB}(\mathbf{R}, P, \delta)$  の証拠となる  $P$  名前の列とする. このとき初等性より  $M$  で次が成り立つ:

$$\text{すべての } j(P) \text{ 名前 } y \text{ について } (\exists \alpha < j(\delta)) (\forall \beta \in j(\delta) \setminus \alpha) \neg (j(\bar{x})_\beta \sqsubset_i y).$$

これは絶対的なので,  $j(\bar{x})$  は  $\text{EUB}(\mathbf{R}, j(P), j(\delta))$  の証拠である.

後半の主張は正則な  $\lambda \neq \kappa$  については  $\text{cf}(j(\lambda)) = \lambda$  であったことと  $\text{EUB}(\mathbf{R}, P, \delta) \iff \text{EUB}(\mathbf{R}, P, \text{cf}(\delta))$  より分かる. □

**補題 49.**  $\mathbf{R}$  をポーランド関係システムとし,  $P$  を ccc 強制法とし,  $j$  を BUP 埋め込みで臨界点  $\kappa$  を持つものとする.  $\text{COB}(\mathbf{R}, P, \lambda, \mu)$  を仮定する. このとき, もし  $\kappa > \lambda$  ならば,  $\text{COB}(\mathbf{R}, j(P), \lambda, |j(\mu)|)$  が成り立つ. もし  $\kappa < \lambda$  ならば,  $\text{COB}(\mathbf{R}, j(P), \lambda, \mu)$  が成り立つ.

証明.  $(S, <)$  と  $\bar{y}$  を  $\text{COB}(\mathbf{R}, P, \lambda, \mu)$  の証拠とする. すると, 初等性より  $M$  で次が成り立つ.

$$\text{各 } j(P) \text{ 名前 } x \text{ について : } (\exists s \in j(S)) (\forall t \in j(S)) (t > s \rightarrow j(P) \Vdash x \sqsubset_i j(\bar{y})_t) \quad (*)$$

$j(P)$  名前  $x$  が  $V$  で与えられたとき, それを  $M$  の元に取り直すことができたことと,  $\sqsubset_i$  の  $M[G]$  と  $V[G]$  の間の絶対性より, これは  $V$  でも正しい.

もし  $\lambda < \kappa$  ならば,  $j(\lambda) = \lambda$  なので,  $j(S)$  は  $M$  の中で  $\lambda$ -directed であり,  $M$  の  $<\kappa$ -closedness より  $V$  でもそうである. よって,  $\text{COB}(\mathbf{R}, j(P), \lambda, |j(\mu)|)$  を得る.

$\lambda > \kappa$  とする.  $j''S$  と  $j''\bar{y}$  が  $\text{COB}(\mathbf{R}, j(P), \lambda, \mu)$  の証拠であることを示す.  $j''S$  は  $S$  と同型なので,  $\lambda$ -directed かつサイズ  $\mu$  は良い.  $j(P)$  名前  $x$  が与えられたとすると, やはりそれは  $M$  の元だとしてよい. すると (\*) でのような  $s \in j(S)$  がとれる.  $j''S$  が  $j(S)$  の中で cofinal であったので,  $s' \in S$  がとれて  $j(s') > s$  となる. すると, どんな  $t > s'$  についても,  $j(t) > j(s') > s$  なため,  $j(P) \Vdash x \sqsubset_i j(\bar{y})_t$  を得る.  $\square$

系として次を得る.

**系 50.**  $j$  を  $\kappa$  から  $\theta$  への BUP 埋め込みとする. このとき

1. 正則な  $\lambda \neq \kappa$  に対する  $\text{EUB}(\mathbf{R}, P, \lambda)$  は  $\text{EUB}(\mathbf{R}, j(P), \lambda)$  を含意する.
2.  $\text{EUB}(\mathbf{R}, P, \kappa)$  は  $\text{EUB}(\mathbf{R}, j(P), \theta)$  を含意する.
3.  $\kappa > \lambda$  と  $\kappa \leq \mu \leq \theta$  に対する  $\text{COB}(\mathbf{R}, P, \lambda, \mu)$  は  $\text{COB}(\mathbf{R}, j(P), \lambda, \theta)$  を含意する.
4.  $\kappa < \lambda$  に対する  $\text{COB}(\mathbf{R}, P, \lambda, \mu)$  は  $\text{COB}(\mathbf{R}, j(P), \lambda, \mu)$  を含意する.


### 3.4 主定理の証明

**定理 51.** GCH を仮定し,  $\aleph_1 < \kappa_9 < \lambda_1 < \kappa_8 < \lambda_2 < \kappa_7 < \lambda_3 < \kappa_6 < \lambda_4 < \lambda_5 < \lambda_6 < \lambda_7 < \lambda_8 < \lambda_9$  を正則基数たちで  $\lambda_3$  は正則基数の後続で  $i = 1, 2, 4, 5$  に対し  $\lambda_i$  は可算共終数を持つ基数の後続でないとし,  $i = 6, 7, 8, 9$  に対して  $\kappa_i$  は強コンパクト基数であるとする. すると ccc 強制法  $\mathbb{P}^9$  が存在し, 次を強制する:

$$\begin{aligned} \text{add}(\mathcal{N}) = \lambda_1 < \text{cov}(\mathcal{N}) = \lambda_2 < \mathfrak{b} = \lambda_3 < \text{non}(\mathcal{M}) = \lambda_4 < \\ < \text{cov}(\mathcal{M}) = \lambda_5 < \mathfrak{d} = \lambda_6 < \text{non}(\mathcal{N}) = \lambda_7 < \text{cof}(\mathcal{N}) = \lambda_8 < 2^{\aleph_0} = \lambda_9. \end{aligned}$$

証明.  $i = 6, \dots, 9$  について,  $j_i$  を  $\kappa_i$  から  $\lambda_i$  への BUP 埋め込みとする. すなわち,  $\text{cf}(j_i(\kappa_i)) = |j_i(\lambda_i)| = \lambda_i$ . 第 2 章の強制法  $\mathbb{P}^5$  を使い,  $i = 5, 6, 7, 8$  に対し  $\mathbb{P}^{i+1} := j_{i+1}(\mathbb{P}^i)$  とおく. 特に  $\mathbb{P}^9 = j_9(j_8(j_7(j_6(\mathbb{P}^5))))$  である.

Cichoń の図式の関連する基数不変量を望んだ順番で  $\mathfrak{r}_1, \dots, \mathfrak{r}_8$  と並べる.



$i = 1, \dots, 4$  に対して  $i^* := 9 - i$  とおく (よって  $\mathfrak{x}_{i^*}$  は  $\mathfrak{x}_i$  の双対である).

補題 17 より  $\text{EUB}(\mathbf{R}_i, P, \lambda)$  は  $P \Vdash (\mathfrak{x}_i \leq \lambda \ \& \ \mathfrak{x}_{i^*} \geq \lambda)$  を含意し,  $\text{COB}(\mathbf{R}, P, \lambda, \mu)$  は  $P \Vdash \mathfrak{x}_i \geq \lambda \ \& \ \mathfrak{x}_{i^*} \leq \mu$  を含意することに注意する.

**主張:**  $\mathbb{P}^9$  は  $2^{\aleph_0} = \lambda_9$  を強制する.

**証明:**  $i = 5, \dots, 8$  に関する帰納法で, 各  $\mathbb{P}^{i+1}$  は  $2^{\aleph_0} = j_{i+1}(\lambda_i) = \lambda_{i+1}$  を強制することを示せる (補題 47(5) と系 46 による).

**主張:**  $i = 1, \dots, 4$  について  $\text{EUB}(\mathbf{R}_i, \mathbb{P}^9, \lambda_i)$  が成り立ち,  $\text{EUB}(\mathbf{R}_4, \mathbb{P}^9, \lambda_5)$  が成り立つ.

**証明:** 主張は定理 39 により  $\mathbb{P}^5$  について成り立ち, また系 50(1) により保存される.

これは  $i = 1, \dots, 4$  について  $V^{\mathbb{P}^9}$  での  $\mathfrak{x}_i \leq \lambda_i$  を含意し, また  $\mathfrak{x}_5 = \text{cov}(\mathcal{M}) \geq \lambda_5$  を含意する.

**主張:**  $i = 1, 2, 3$  に対して  $\text{EUB}(\mathbf{R}_i, \mathbb{P}^9, \lambda_{i^*})$  が成り立つ.

**証明:**  $\kappa_{i^*+1} < \lambda_i < \kappa_{i^*} < \lambda_5$  に注意する. よって  $\text{EUB}(\mathbf{R}_i, \mathbb{P}^5, \kappa_{i^*})$  が成り立つ (系 39). これは  $\ell = 5, \dots, i^* - 1$  について  $\text{EUB}(\mathbf{R}_i, \mathbb{P}^\ell, \kappa_{i^*})$  を含意する (系 50(1)). すると  $\ell = i^*$  について  $\text{EUB}(\mathbf{R}_i, \mathbb{P}^\ell, \lambda_{i^*})$  である (系 50(2)). すると  $\ell = i^* + 1, \dots, 9$  について  $\text{EUB}(\mathbf{R}_i, \mathbb{P}^\ell, \lambda_{i^*})$  を得る (再び系 50(1)).

これは  $V^{\mathbb{P}^9}$  での  $\ell = 6, 7, 8$  について  $\mathfrak{x}_\ell \geq \lambda_\ell$  を含意する.

**主張:**  $i = 1, 2, 3, 4$  が  $\text{COB}(\mathbf{R}_i, \mathbb{P}^9, \lambda_i, \lambda_{i^*})$  について成り立つ.

**証明:** 定理 39 より  $\text{COB}(\mathbf{R}_i, \mathbb{P}^5, \lambda_i, \lambda_5)$  が成り立ち,  $\ell = 5, \dots, i^*$  について  $\text{COB}(\mathbf{R}_i, \mathbb{P}^\ell, \lambda_i, \lambda_\ell)$  を導く ( $\kappa_\ell > \lambda_i$  を使う) (系 50(3)). すると  $\ell = i^* + 1, \dots, 9$  について  $\text{COB}(\mathbf{R}_i, \mathbb{P}^\ell, \lambda_i, \lambda_{i^*})$  を得る (系 50(4)).

これは  $V^{\mathbb{P}^9}$  においての  $i = 1, \dots, 4$  について  $\mathfrak{x}_i \geq \lambda_i$  と  $\ell = 5, \dots, 8$  についての  $\mathfrak{x}_\ell \leq \lambda_\ell$  を含意する.  $\square$

## 参考文献

- [CM22] Miguel A Cardona and Diego A Mejía. “Forcing constellations of Cichoń’s diagram by using the Tukey order”. *arXiv preprint arXiv:2203.00615* (2022).
- [EK65] Ryszard Engelking and Monika Karłowicz. “Some theorems of set theory and their topological consequences”. *Fundamenta Mathematicae* 57.3 (1965), pp. 275–285.
- [GKS19] Martin Goldstern, Jakob Kellner, and Saharon Shelah. “Cichoń’s maximum”. *Annals of Mathematics* 190.1 (2019), pp. 113–143.
- [Mil81] Arnold W. Miller. “Some properties of measure and category”. *Transactions of the American Mathematical Society* 266 (1981), pp. 93–114.