
Lista de Exercício com Resolução

Progressão Aritmética e Geométrica

Dezembro, 2021

Fundamentos - P.A

1. Determine x de modo que $(x; 2x + 1; 5x + 7)$ seja uma P.A.
2. Obtenha 3 números em P.A, de modo que a soma entre esses seja igual a 3 e a soma de seus quadrados seja 11
3. Os números que exprimem o lado, a diagonal e a área de um quadrado estão, respectivamente, em P.A. Determine quanto mede o lado.
4. Demonstre que se (a, b, c) é uma P.A, então (a^2bc, ab^2c, abc^2) também é.
5. Determine qual é o primeiro termo negativo da P.A $f = \{60, 53, 46, \dots\}$.
6. Sabe-se que $a_{10} = 7$ e que $a_{12} = -8$. Monte a P.A.
7. De 100 a 1000, quanto são os múltiplos de 2 ou 3.
8. Obtenha a soma dos 200 primeiros termos da sequência dos números ímpares positivos. Calcule também a soma dos n primeiros termos iniciais dessa mesma sequência.
9. Um jardineiro tem que regar 60 roseiras plantadas ao longo de uma vereda retilínea e distando 1 m uma da outra. Ele enche seu regador numa fonte situada na mesma vereda, a 15 m da primeira roseira, e a cada viagem rega 3 roseiras. Começando e terminando na fonte, determine qual é o percurso total que ele terá que caminhar até regar todas as roseiras.
10. **(ITA-SP)** Considere a progressão aritmética $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_{50})$ de razão d . Se $\sum_{n=1}^{10} a_n = 10 + 25d$ e $\sum_{n=1}^{50} a_n = 4550$. Então $d - a_1$ é igual a:

(a) 3	(b) 6	(c) 9	(d) 11	(e) 14
-------	-------	-------	--------	--------

Fundamentos - P.G

1. Prove que se x, y, z , nessa ordem, formam uma P.G, vale a relação

$$(x + y + z)(x - y + z) = x^2 + y^2 + z^2$$

2. Os lados de um triângulo retângulo apresentam medidas em P.G. Determine o valor de q .

3. Dada uma P.G finita $(a_1, a_2, \dots, a_{10})$ onde $a_1 = 2$ e $a_2 = 6$, então determine se $(a_{10})^{\frac{1}{8}} = 3 \cdot (2)^{\frac{1}{8}}$ é uma sentença verdadeira.


4. Prove que se (a_1, a_2, a_3, \dots) é P.G, então $\left(\frac{1}{a_1}, \dots\right)$ também é.

5. Determine $\sum_{i=3}^n 2^i = 4088$

6. Sabendo que $0 < q < 1$, calcule o valor da expressão da P.G infinita

$$q + 2q^2 + 3q^3 + \dots$$

7. **(IME–RJ)** Uma placa metálica com base b e altura h sofre sucessivas reduções da sua área, em função da realização de diversos cortes, conforme ilustrado na figura abaixo. A cada passo, a área à direita é removida e a placa sofre um novo corte. Determine a soma das áreas removidas da placa original após serem realizados n cortes.



8. **(ITA-SP)** Seja (a_1, a_2, \dots) uma progressão geométrica de razão $0 < a_1 < 1$ e soma igual a $3a_1$. A soma dos três primeiros termos dessa progressão geométrica é igual a

(a) $\frac{8}{27}$ (b) $\frac{20}{27}$ (c) $\frac{26}{27}$ (d) $\frac{30}{27}$ (e) $\frac{38}{27}$

9. **(Dep. de Matemática da Clínica Espiritual de Marabá - PA)** Para que os produtos dos termos da sequência

$$\left(1, \sqrt{3}, \sqrt{3}^2, \sqrt{3}^3, \dots, \sqrt{3}^{(n-1)}\right)$$

Seja igual a 3^{14} , deverão ser consideradas, nessa sequência:

(a) 8 termos (b) 6 termos (c) 10 termos (d) 9 termos (e) 7 termos

10. **(ITA-SP)** A progressão infinita (a_1, \dots, a_n, \dots) tem razão $r < 0$. Sabe-se que a progressão infinita $(a_1, \dots, a_{(5n+1)}, \dots)$ tem soma 8 e a progressão infinita $(a_1, \dots, a_{(5n)}, \dots)$ tem soma 2. Determine a soma da progressão (a_1, \dots, a_n, \dots)

Resolução das Questões

Progressão Aritmética

Questão 1

A questão lida com a formação básica de uma P.A. Para determinar o termo x pedido, podemos igualar a constante de razão r da seguinte forma:

$$\begin{aligned}(2x + 1) - x &= (5x + 7) - (2x + 1) \\ x + 1 &= 3x + 6 \\ -2x &= 5 \\ x &= -\frac{5}{2}\end{aligned}$$

A prova real é realizada substituindo x na sequência e verificando se de fato a mesma forma uma P.A com os três primeiros termos dados.

$$\begin{aligned}f &= \left(-\frac{5}{2}, -2 \cdot \frac{5}{2} + 1, -5 \cdot \frac{5}{2} + 7\right) \\ f &= (-2.5, -4, -5.5)\end{aligned}$$

De fato, forma-se a P.A de $a_1 = (-2.5)$ e $r = (-1.5)$.

Questão 2

O enunciado pede duas condições a ser cumpridas (além da formação em P.A)

- A soma dos 3 números deve ser igual a 3
- A soma dos 3 números, cada um ao quadrado, deve ser igual a 11

Isso implica no seguinte sistema

$$\begin{cases}(x - r) + x + (x + r) = 3 \\ (x - r)^2 + x^2 + (x + r)^2 = 11\end{cases}$$

Do primeiro membro, nota-se inicialmente que r irá ser cancelado pela soma entre $-r$ e $+r$. Ficando apenas $3x = 3$. Desse modo, descobre-se $x = 1$. Jogando essa informação no segundo membro, poderemos manipular e descobrir r efetivamente.

$$(1 - r)^2 + 1 + (1 + r)^2 = 11$$

$$(1^2 - 2r + r^2) + 1 + (1^2 + 2r + r^2) = 11$$

$$3 + 2r^2 = 11$$

$$r = \pm 2$$

Sendo $x = 1$ e $r = \pm 2$, podemos montar duas progressões aritméticas f (para $r = 2$) e g (para $r = -2$), como ilustrado abaixo.

$$f = (-1, 1, 3)$$

$$g = (3, 1, -1)$$

- Soma: $-1 + 1 + 3 = 3$
- Soma dos quadrados: $3^2 + 1^2 + (-1)^2 = 11$

Questão 3

Chamaremos l de lado, d a diagonal e a a área. Montemos a sequência $f = (l, d, a)$. Como o enunciado pede o valor algébrico de l , é interessante reescrever todos esses valores em função do mesmo. Utilizando os conhecimentos importados da Geometria Plana, podemos afirmar que a P.A terá a forma

$$f = (l, l\sqrt{2}, l^2)$$

A P.A se estabelecerá com a existência de r . Utilizando a mesma técnica da primeira questão, temos

$$l\sqrt{2} - l = l^2 - l\sqrt{2}$$

$$l\sqrt{2} + l\sqrt{2} - l = l^2$$

$$2 \cdot l\sqrt{2} - l = l^2$$

$$l = \frac{2 \cdot l\sqrt{2} - l}{l}$$

$$l = \frac{2 \cdot l\sqrt{2}}{l} - \frac{l}{l}$$

$$l = 2\sqrt{2} - 1$$

Questão 4

- Hipótese: $\Rightarrow f = (a, b, c)$ é uma P.A
- Tese: $\Rightarrow g = (a^2bc, ab^2c, abc^2)$ é uma P.A

A hipótese afirma que a sequência é, de fato, uma P.A. Isso permite-nos concluir que $b - a = c - b$. Se todos os 3 primeiros elementos forem multiplicados por abc , é necessário verificar se essa igualdade mantém-se juntamente com essa proporção. Na P.A da tese, tem-se

$$g = (a^2bc, ab^2c, abc^2)$$

Supondo que ela, de fato, é uma P.A, a igualdade $ab^2c - a^2bc = abc^2 - ab^2c$ é válida. No entanto, isso nada mais é que a igualdade da sequência f multiplicada por abc também. Outro modo de ver isso é considerar o seguinte:

$$ab^2c - a^2bc = abc(b - a)$$

$$abc^2 - ab^2c = abc(c - b)$$

O que mantém a mesma relação.

Questão 5

Temos inicialmente $a_1 = 60$ e uma razão r negativa igual a -7 . Haverá o n -ésimo termo a qual a_n ficará negativo, que pode ser ilustrado por $a_n = 60 + (n - 1) \cdot -7$. Fixaremos $a_n < 0$ e trabalharemos com essa inequação.

$$60 + (n - 1) \cdot -7 < 0$$

$$60 - 7n + 7 < 0$$

$$67 - 7n < 0$$

$$-7n < -67$$

$$n > \frac{67}{7} \approx 9.5$$

Como n obrigatoriamente é um número inteiro, admitimos $n \geq 10$. Portanto, a sequência ficará negativa após o décimo termo. Isso é facilmente provado ao verificar a_{10} .

$$a_{10} = 60 \cdot (9) \cdot -7 = (60 - 63) = (-3)$$

Questão 6

Podemos definir a_{10} e a_{12} a partir da fórmula do n -ésimo termo.

$$\begin{cases} a_{10} = a_1 + 9r \\ a_{12} = a_1 + 11r \end{cases}$$

As expressões necessárias para montar a P.A são a_1 e r , montando o sistema e resolvendo-o por soma.

$$\begin{cases} 7 = a_1 + 9r \\ 8 = -a_1 - 11r \quad (\times -1) \\ \hline 15 = -2r \\ r = -\frac{15}{2} \end{cases}$$

Substituindo r na primeira equação, encontra-se $a_1 = \frac{149}{2}$. A formação da P.A pode ser feita com essas duas informações.

Questão 7

Entre 100 e 1000, sabe-se que há 999 números. Por partes, chamaremos a sequência f de números divisíveis por 2 e g por 3 (não necessariamente o número deve ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo).

- Na sequência f , podemos afirmar que a_1 é igual a 100 (pois é o primeiro número entre 100 e 1000 divisível por 2), $r = 2$ e $a_n = 1000$ (último número divisível por 2). É necessário saber quantos n termos essa P.A tem

$$1000 = 100 + (n - 1)2$$

$$1000 = 100 + 2n - 2$$

$$1000 = 98 + 2n$$

$$2n = 902$$

$$n = 451$$

- A lógica é a mesma para múltiplos de 3. $a_1 = 102$, $a_n = 999$, $r = 3$

$$999 = 102 + (n - 1)3$$

$$999 = 102 + 3n - 3$$

$$999 = 99 + 3n$$

$$3n = 900$$

$$n = 300$$

Questão 8

A P.A que representaria a sequência dos 200 primeiros números ímpares positivos é gerada com $a_1 = 1$ e $r = 2$. Utiliza-se a fórmula

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$$

Determina-se inicialmente $a_n = 1 + (200 - 1)2 \Leftrightarrow 399$, após isso, na fórmula

$$S_{200} = \frac{200(1 + 399)}{2} \Leftrightarrow 100(400) = 40000$$

Para calcularmos a soma de n elementos dessa sequência já estabelecida, seguimos os mesmos passos

$$a_n = 1 + 2(n - 1) \Leftrightarrow 2n - 1$$

$$S_n = \frac{n(1 + 2n - 1)}{2} \Leftrightarrow \frac{2n^2}{2} = n^2$$

Questão 9

A fonte está a 15 metros da primeira parte que será “regada”. Quando chegar nas primeiras 3 roseiras, andará mais 2 metros para regá-las (vai regar a primeira roseira de imediato, andará até a segunda (1 metro) e até a terceira (1 metro)). Depois disso, terá que voltar para reabastecer a água, voltando todo o caminho novamente, totalizando

$$15 + 2 + 2 + 15 = 34$$

Esse é o trajeto realizado inicialmente, e o primeiro termo da P.A ($a_1 = 34$). A cada viagem, o percurso aumenta em 6 metros (já que são 3 metros a mais na ida e 3 metros a mais na volta, adicionados com os caminhos anteriores), portanto $r = 6$. Como ele rega 3 roseiras a cada 1 viagem, então ele fará no total 20 viagens para regar todas as 60 ($n = 20$). Montada a P.A, utiliza-se a mesma técnica da questão anterior.

$$a_{20} = 34 + (19)6 = 148$$

$$S_{20} = \frac{20(34 + 148)}{2} = 10(182) = 1820$$

Portanto, o jardineiro andou 1820 metros.

Questão 10 (*)

A primeira afirmativa da questão diz que o somatório dos 10 primeiros termos da P.A dada é igual a expressão

$$10 + 25d$$

E que o somatório dos 50 primeiros termos dessa mesma P.A equivale à 4550. É possível igualar esses valores com S_{10} e S_{50} para descobrir os termos notáveis.

$$\frac{n(a_1 + a_n)}{2} = 10 + 25d$$

Porém $a_n = a_1 + (n - 1)d$ (d é a razão r da questão) e $n = 10$ para esse caso

$$\frac{10(a_1 + a_1 + 9d)}{2} = 10 + 25d$$

$$\frac{10(2a_1 + 9d)}{2} = 10 + 25d$$

$$5(2a_1 + 9d) = 10 + 25d$$

$$10a_1 + 45d = 10 + 25d$$

$$10a_1 = 10 - 20d$$

$$a_1 = \frac{10 - 20d}{10} \Leftrightarrow 1 - 2d$$

Achado uma expressão que relaciona a_1 com d para o somatório dos 10 primeiros termos ($a_1 = 1 - 2d$), agora é necessário descobrir outra relação no somatório de 50 para obter um sistema.

$$\frac{50(a_1 + a_1 + 49d)}{2} = 4550$$

$$\frac{50(2a_1 + 49d)}{2} = 4550$$

$$25(2a_1 + 49d) = 4550$$

$$50a_1 + 1225d = 4550$$

$$a_1 = \frac{4550 - 1225d}{50} \Leftrightarrow \frac{4550}{50} - \frac{1225d}{50}$$

$$a_1 = 91 - \frac{49d}{2}$$

Podemos, por fim, igualar essas duas relações e descobrir o valor de d .

$$91 - \frac{49d}{2} = 1 - 2d$$

$$-\frac{49d}{2} = -2d - 90$$

$$\frac{49d}{2} = 2d + 90$$

$$49d = 2(2d + 90)$$

$$49d = 4d + 180$$

$$45d = 180$$

$$d = 4$$

Substituindo d na expressão mais simples $1 - 2d$ teremos $a_1 = -7$. A expressão pedida é

$$4 - (-7) = 11$$

Letra D.

1 Progressão Geométrica

1.1 Fundamentos

Questão 1

-
- Hipótese $\Rightarrow f = (x, y, z)$ é uma P.G
 - Tese $\Rightarrow (x + y + z)(x - y + z) = x^2 + y^2 + z^2$

Inicialmente, se f é P.G, então vale a relação

$$\frac{y}{x} = \frac{z}{y}$$

Isso implica $y^2 = z \cdot x$. Desenvolvendo a tese algebricamente, têm-se

$$(x + y + z)(x - y + z) \Rightarrow (x^2 - xy + xz) + (yx - y^2 + yz) + (zx - zy + z^2)$$

Anulando os termos possíveis, obtemos

$$x^2 + 2xz - y^2 + z^2$$

No entanto, $y^2 = zx$.

$$x^2 + 2y^2 - y^2 + z^2$$

O que converge para

$$x^2 - y^2 + z^2$$

Questão 2

Pendente

Questão 3

Construindo a P.G tal qual $a_1 = 2$, $a_2 = 6$ (é imediato que $q = 3$). Chegaremos ao décimo termo por

$$a_{10} = 2 \cdot 3^9$$

Ou seja, a expressão dada no enunciado em número é igual a

$$(2 \cdot 3^9)^{\frac{1}{8}} = 3 \cdot (2)^{\frac{1}{8}}$$

$$2^{\frac{1}{8}} \cdot 3^{\frac{9}{8}} = 3 \cdot (2^{\frac{1}{8}})$$

O que é absurdo, portanto a sentença é falsa.

Questão 4

A primeira sequência tem como razão:

$$q = \frac{a_2}{a_1}$$

A segunda sequência tem como razão (considerando que ela é uma P.G)

$$q' = \frac{\frac{1}{a_2}}{\frac{1}{a_1}} \Rightarrow \frac{a_1}{a_2}$$

Portanto, ambas são P.G de razão inversa ($q' = q^{-1}$)

Questão 5

A P.G tem razão $q = 2$ e seu termo $a_1 = 2^3$ (de acordo com a notação de somatório). A determinação do valor de n decorre de que a soma de todos os termos entre a_1 e a_n é igual a 4088, portanto.

$$\frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1} = 4088$$

$$2^3(2^n - 1) = 4088$$

$$2^{n+3} - 8 = 4088$$

$$2^{n+3} = 4096$$

$$2^{n+3} = 2^{12}$$

$$n = 9$$