

infimam numeri 10, quae unitati secundum modulum p^u congrua fit (Conf. sectio III, ubi ostendimus, e vel numero $(p - 1)p^{u-1}$ aequalem vel ipsius partem aliquotam esse), perspicieturque facile, etiam $10^e a$ fore numerum, in serie $10a, 100a, 1000a$ etc. primum, qui ipsi a secundum eundem modulum sit congruus. Iam quum per art. 312 mantissae fractionum $\frac{10a}{p^u}, \frac{100a}{p^{2u}}, \dots, \frac{10^e a}{p^{eu}}$ oriantur, demendo mantissae fractionis F figuram primam, duas ... e figuras primas resp., manifestum est, in hac mantissa post primas e figuras, neque prius, easdem iterum repeti. Has primas e figuras, e quibus infinites repetitis mantissa formata est, *periodum* huius mantissae siue fractionis F vocare possumus, patetque magnitudinem periodi, i. e. multitudinem figurarem e quibus constat, quae, est $= e$, a numeratore a omnino independentem esse, et per solum denominatorem determinari. Ita e. g. periodus fractionis $\frac{1}{11}$ est 09, fractionis $\frac{3}{7}$ periodus 428571 *).

315. Simulac igitur fractionis alicuius periodus habetur, mantissa ad figuras quotcunque produci poterit. Potro patet, si fuerit $b \equiv 10^a a \pmod{p^u}$, periodum fractionis $\frac{b}{p^u}$ oriri, si primae λ figurae periodi fractionis F (supponendo

*) Cel. Robertson periodi initium et finem duobus punctis figurae primae et ultimae superscriptis indicat (Theory of circulating fractions, Philos. Trans. 1764), quod hic non necessarium putamus.

$\lambda < e$ quod licet) reliquis $e - \lambda$ postscribantur, adeoque cum periodo fractionis F simul periodos omnium fractionum haberi, quarum numeratores ipsis $10a$, $100a$, $1000a$ etc. secundum denominatorem p^μ sint congrui. Ita e. g. quum $6 \equiv 3 \cdot 10^2 \pmod{7}$, periodus fractionis $\frac{6}{7}$ statim e periodo fractionis $\frac{3}{7}$ fit 857142.

Quoties itaque pro modulo p^μ numerus 10 est radix primitiua (artt. 57, 89), e periodo fractionis $\frac{1}{p^\mu}$ protinus deduci poterit periodus cuiusvis alius fractionis $\frac{m}{p^\mu}$ (cuius numerator m per p non diuisibilis), tot figuras ab illa a laeua resecando et ad dextram restituendo, quot unitates habet index ipsius m , numero 10 pro basi accepto. Hinc perspicuum est, quamobrem in hocce casu numerus 10 in tabula I semper pro basi acceptus sit (v. art. 72).

Quando vero 10 non est radix primitiua, e periodo fractionis $\frac{1}{p^\mu}$ earum tantummodo fractionum periodi exscindi possunt, quarum numeratores alicui potestati ipsius 10 secundum p^μ sunt congrui. Sit 10^e potestas infima ipsius 10 unitati secundum p^μ congrua, $(p - 1)p^{\mu-1} = ef$, atque talis radix primitiua r pro basi accepta, ut index numeri 10 fiat f (art. 71). In hoc itaque systemate numeratores fractionum, quarum periodi e periodo fractionis $\frac{1}{p^\mu}$ exscindo possunt, habebunt indices $f, 2f, 3f, \dots, ef - f$; simili modo

e periodo fractionis $\frac{r}{p^u}$ deduci possunt periodi fractionum, quarum numeratores $10r$, $100r$, $1000r$ etc. indicibus $f + 1$, $2f + 1$, $3f + 1$ etc. respondententes; e periodo fractionis cum numeratore rr (cuius index 2) deducuntur periodi fractionum cum numeratoribus quorum indices $f + 2$, $2f + 2$, $3f + 2$ etc.; generaliterque e periodo fractionis cum numeratore r^i deriuari poterunt periodi fractionum cum numeratoribus, quorum indices $f + i$, $2f + i$, $3f + i$ etc. Hinc facile colligitur, si tantummodo periodi fractionum cum numeratoribus $1, r, rr, r^3, \dots, r^{f-1}$ habeantur, omnes reliquas inde per solam transpositionem deduci posse adiumento regulae sequentis: Sit index numeratoris m fractionis propositae $\frac{m}{p^u}$, in systemate ubi r pro basi acceptus est, $= i$ (quem supponimus minorem quam $(p - 1)p^{u-1}$); fiat (diuidendo per f) $i = af + \epsilon$ ita vt a, ϵ sint integri positiui (siue etiam 0) atque $\epsilon < f$; quo facto orietur periodus fractionis $\frac{m}{p^u}$ e periodo fractionis cuius numerator r^ϵ (adeoque 1, quando $\epsilon = 0$), collocando huius a primas figuras post reliquas (adeoque hanc ipsam periodum retinendo, quando $a = 0$). Haec sufficienter declarabunt, cur in condenda tabula I normam in art. 72 explicatam sequuti simus.

§16. Secundam haec principia pro omnibus denominatoribus formae p^u intra 1000 tabulam periodorum necessariarum construximus, quam integram siue etiam vltcrius continuatam