

Quando $Q > a$, substituatur loco ipsius Q ipsius residuum minimum positium secundum modulum a^*). Hoc ad a eandem relationem habebit quam habet Q .

Porro resoluatur Q , siue numerus ipsius loco assumptus, in factores suos primos p, p', p'' etc., quibus adiungendus factor -1 , quando Q est negatiuus. Tum constat relationem ipsius Q ad a pendere a relationibus singulorum p, p', p'' etc. ad a . Scilicet si inter illos factores sunt $2m$ non-residua ipsius a erit QRa , si vero $2m + 1$, erit QNa . Facile autem perspicitur, si inter factores p, p', p'' etc., bini aut quaterni aut seni aut generaliter $2k$ aequales occurrant hos tuto eiici posse.

IV. Si inter factores p, p', p'' reperiuntur -1 et 2 , horum relatio ad a ex artt. 108, 112, 113, 114 inueniri potest. Reliquorum autem relatio ad a pendet a relatione ipsius a ad ipsos (*theor. fund.*, atque propp. art. 131). Sit p vnus ex ipsis, inuenieturque, (tractando numerus a, p eodem modo vt antea Q et a illis respectiue maiores) relationem ipsius a ad p aut per artt. 108—114 determinari posse (si scilicet residuum minimum ipsius a (mod. p) nullos factores primos impares habeat), aut in super a relatione ipsius p ad numeros quosdam primos ipso p minores pendere. Idem valet de reliquis factoribus p', p'' etc. Facile

*) *Residuum* in signific. art. 4. — Plerumque praestat residuum absolute minimum accipere.

iam perspicitur per continuationem huius operationes tandem ad numeros peruentum iri quorum relationes per propp. artt. 108—114 determinari possint. Per exemplum haec clariora fient.

Ex. Quaeritur relatio numeri $+ 453$ ad 1236 . Est $1236 = 4 \cdot 3 \cdot 103$; $+ 453 R_4$ per II. 2 (*A*); $+ 453 R_3$ per II. 1. Superest igitur vt relatio ipsius $+ 453$ ad 103 exploretur. Eadem autem erit quam habet $+ 41 (\equiv 453, \text{mod. } 103)$ ad 103 ; eadem ipsius $+ 103$ ad 41 (*theor. fund.*), siue ipsius $- 20$ ad 41 . At est $- 20 R_{41}$; namque $- 20 = 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5$; $- 1 R_{41}$, (art. 108); atque $+ 5 R_{41}$ ideo quod $41 \equiv 1$ adeoque ipsius 5 residuum est (*theor. fund.*). Hinc sequitur $+ 453 R_{103}$, hincque tandem $+ 453 R_{1236}$. Est autem reuera $453 \equiv 297^2 \pmod{1236}$.

147. Proposito numero quocunque *A*, formulae certae exhiberi possunt, sub quibus omnes numeri ad *A* primi quorum residuum est *A* continentur, siue omnes qui esse possunt *diuisores* numerorum formae $xx - A$ (designante *xx* quadratum indeterminatum) *). Sed breuitatis gratia ad eos tantum *diuisores* respiciemus, qui sunt impares atque ad *A* primi, quum ad hos casus reliqui facile reduci possint.

*) Huiusmodi numeros simpliciter *diuisores ipsius* $xx - A$ dicemus unde sponte patet quid sint *non-diuisores*.

Sit primo A aut numerus primus positivus formae $4n + 1$, aut negativus formae $4n - 1$. Tum secundum theorema fundamentale omnes numeri primi, qui, positivè sumti, sunt residua ipsius A , erunt divisores ipsius $xx - A$: omnes autem numeri primi (excepto numero 2 qui semper est divisor) qui ipsius A sunt non residua erunt non divisores ipsius $xx - A$. Sint omnia residua ipsius A ipso A minora (exclusa cifra), r, r', r'' etc. omnia non-residua vero n, n', n'' etc. Tum quivis numerus primus, in aliqua formarum $Ak + r, Ak + r', Ak + r''$ etc. contentus, erit divisor ipsius $xx - A$, quivis autem primus in aliqua formarum $Ak + n, Ak + n'$ etc. contentus non-divisor erit, designante k numerum integrum indeterminatum. Illas formas dicimus *formas divisorum ipsius $xx - A$* , has vero *formas non-divisorum*. Vtrorumque multitudo erit $\frac{1}{2}(A - 1)$. Porro si B est numerus compositus impar atque ARB , omnes factores primi ipsius B in aliqua formarum primorum continentur adeoque etiam B . Quare quivis numerus impar in forma non-divisorum contentus, erit non-divisor formae $xx - A$. Sed hoc theorema convertere non licet; nam si B est non-divisor compositus impar formae $xx - A$, inter factores primos ipsius B aliqui non-divisores erunt, quorum multitudo si est *par*, B nihilominus in aliqua forma divisorum reperietur, V. art. 99.

Ex. Hoc modo pro $A = -11$ formae divisorum ipsius $xx + 11$ inveniuntur hae: