

Ponamus Φ esse $(M; K)$, atque $e = MN$ ita ut f in Φ per substitutionem propriam M, K, o, N transeat. Porro designentur omnes transformationes propriae formae Φ in F indefinite per a, b, c, d . Tum manifesto f transibit in Φ per substitutionem propriam $Ma + Kc, Mb + Kd, Nc, Nd$, et hoc modo ex quavis transformatione propria formae Φ in F sequetur transformatio propria formae f in F . — Eodem modo tractandae sunt formae reliquae Φ', Φ'' etc., quarum singulae transformationes propriae in F transformationem propriam formae f in F praebebunt.

Vt appareat hanc solutionem ex omni parte completam esse, ostendendum erit

I. *Hoc modo omnes transformationes proprias possibiles formae f in F obtineri.* Sit transformatio quaecunque propria formae f in F haec $\alpha, \epsilon, \gamma, \delta$ atque ut in art. praec. II, n diuisor communis maximus numerorum γ, δ ; numeri m, g, h, k autem eodem modo ut illic determinati. Tunc forma $(m; k)$ erit inter formas Φ, Φ' etc., et $\frac{\gamma}{n} \cdot \frac{\alpha\gamma + \epsilon h - k}{m} + h, \frac{\delta}{n} \cdot \frac{\alpha\gamma + \epsilon h - k}{m} - g, \frac{\gamma}{n}, \frac{\delta}{n}$ aliqua ex transformationibus propriis huius formae in F ; ex hac vero per regulam modo traditam obtinetur transformatio $\alpha, \epsilon, \gamma, \delta$; haec omnia in art. praec. sunt demonstrata.

II. *Omnes transformationes hoc modo procedentes inter se diuersas esse, seu nullam bis obtineri.* Nullo quidem negotio perspicitur, plures transformationes diuersas eiusdem formae Φ ,

vel Φ' etc. in F eandem transformationem formae f in F producere non posse; quod vero etiam formae diuersae e. g. Φ et Φ' eandem transformationem suppeditare nequeant, ita demonstratur. Supponamus, transformationem propriam $\alpha, \epsilon, \gamma, \delta$ formae f in F obtineri tum ex transformatione propria a, b, c, d formae Φ in F , tum ex transformatione propria a', b', c', d' formae Φ' in F . Sit $\Phi = (M; K)$, $\Phi' = (M'; K')$, $e = MN = M'N'$. Habebuntur itaque aequationes $\alpha = Ma + Kc = M'a' + K'c' \dots [1]$, $\epsilon = Mb + Kd = M'b' + K'd' \dots [2]$, $\gamma = Nc = N'c' \dots [3]$, $\delta = Nd = N'd' \dots [4]$, $ad - bc = a'd' - b'c' = 1 \dots [5]$. Ex $a[4] - b[3]$ sequitur adiumento aequ. $[5]$, $N = N'(ad' - bc')$, quare N' metietur ipsum N ; similiter ex $a'[4] - b'[3]$ fit $N(a'd - b'c) = N'$, quare N metietur ipsum N' , unde, quia tum N tum N' supponuntur esse positiui, erit necessario $N = N'$, et $M = M'$, et hinc ex 3 et 4, $c = c'$, $d = d'$. Porro fit ex $a[2] - b[1]$, $K = M'(ab' - ba') + K'(ad' - bc') = M(ab' - ba') + K'$, hinc $K \equiv K' \pmod{M}$ quod fieri nequit nisi $K = K'$, quia tum K tum K' iacent inter limites 0 et $M - 1$. Quamobrem formae Φ , Φ' non sunt diuersae, contra hyp.

Ceterum patet, si D fuerit negatiuus vel positiuus quadratus, per methodum hanc omnes transformationes proprias formae f in F reuera inueniri posse; si vero D positiuus non-quadratus, formulae certae generales assignari poterunt in quibus omnes transformationes propriae (quarum multitudo infinita) contentae erunt.

Denique, si forma F improprie sub forma f contenta est, omnes transformationes impropriae illius in hanc per methodum traditam facile exhiberi poterunt. Scilicet si $\alpha, \epsilon, \gamma, \delta$ indefinite omnes transformationes proprias formae f in formam quae formae F opposita est, designare supponitur: omnes transf. impropriae formae f in F exhibebuntur per $\alpha, -\epsilon, \gamma, -\delta$.

Ex. Desiderantur omnes transformationes formae $(2, 5, 7)$ in $(275, 0 - 1)$, quae sub illa tum proprie tum improprie contenta est. Complexum formarum Ω pro hoc casu iam in art. praec. tradidimus; examine instituto inuenitur, tum $(5; 1)$ tum $(5; 4)$ formae $(275, 0, -1)$ proprie aequiuallere. Omnes transformationes propriae formae $(5; 1)$ i. e. $(50, 35, 19)$ in $(275, 0, -1)$ per theoriam nostram supra explicatam inueniuntur contineri sub formula generali $16t - 275u, -t + 16u, -15t + 275u, t - 15u$, vbi t, u designant indefinite omnes numeros integros aequationi $tt - 275uu = 1$ satisfaciētes; quare omnes transformationes propriae formae $(2, 5, 7)$ in $(275, 0, -1)$ hinc oriundae contentae erunt sub formula generali $65t - 1100u, -4t + 65u, -15t + 275u, t - 15u$. Simili modo omnes transformationes propriae formae $(5; 4)$ i. e. $(50, 65, 79)$ in $(275, 0, -1)$ continentur sub formula generali $14t + 275u, t + 14u, -15t - 275u, -t - 15u$, adeoque omnes transformationes propriae formae $(2, 5, 7)$ in $(275, 0, -1)$ hinc oriundae sub hac $10t + 275u, t + 10u, -15t - 275u, -t - 15u$. Hae duae formulae igitur omnes