

$4m - 1$, tale quadratum non datur, hoc modo demonstratum est ab ill. Eulero, *Comm. nou. Acad. Petrop.* T. XVIII. p. 112 ad annum 1773. Demonstrationem aliam iam multo ante dederat, *Comm. nou.* T. V. p. 5 qui prodiit a. 1760. In dissert. priori, *Comm. nou.* T. IV, p. 25, rem nondum perfecerat. Postea etiam ill. La Grange theorematism demonstrationem tradidit, *Nouveaux Mem. de l'Ac. de Berlin* A. 1775 p. 342. Aliam adhuc demonstrationem in sectione sequenti vbi proprie de hoc argumento agendum erit, dabimus.

65. Postquam omnes expressiones $\sqrt[n]{A}$ (mod. p) ad tales reducere docuimus, vbi n diuisor numeri $p - 1$, criteriumque nacti sumus vtrum valores reales admittat, necne, tales expressiones $\sqrt[n]{A}$ (mod. p) vbi n ipsius $p - 1$ est diuisor accuratius considerabimus. Primo ostendemus, quam relationem valores singuli expressionis inter se habeant, tum artificia quaedam trademus, quorum auxilio vnus valor expressionis saepenumero inueniri possit.

Primo, quando $A \equiv 1$, atque r aliquis ex n valoribus expressionis $\sqrt[n]{1}$ (mod. p), siue $r^n \equiv 1$ (mod. p), omnes etiam ipsius r potestates erunt valores istius expressionis; horum autem totidem erunt diuersi quot unitates habet exponens ad quem r pertinet (art. 48). Quodsi igitur r est valor ad exponentem n pertinens, potestates ipsius r hae r, r^2, r^3, \dots, r^n (vbi loco vltimae unitas substitui potest) omnes expressionis $\sqrt[n]{1}$ (mod. p) valores inuoluent. Qualia

autem subsidia exstent ad tales valores inueniendos qui ad exponentem n pertineant, in sect. VIII fusius explicabimus.

Secundo. Quando A vnitati est incongruus, vnusque expressionis $\sqrt[n]{A} \pmod{p}$ notus, qui sit z , reliqui hoc modo inde deducuntur. Sint valores expressionis $\sqrt[n]{1, r, r^2 \dots r^{n-1}}$ (vti modo ostendimus), eruntque omnes expr. $\sqrt[n]{A}$ valores hi: $z, zr, zr^2 \dots zr^{n-1}$; namque omnes hos congruentiae $x^n \equiv A$ satisfacere inde manifestum quod, posito quocunque eorum $\equiv zr^k$ potestas ipsius n^{ta} , $z^n r^{nk}$, propter $r^n \equiv 1$ et $z^n \equiv A$, vnitati fit congrua: omnes diuersos esse ex art. 23 facile intelligitur; plures autem valores quam hos quorum numerus est n , expressio $\sqrt[n]{A}$ habere nequit. Ita ex. gr. si alter expressionis $\sqrt[n]{A}$ valor est z , alter erit $-z$. Denique hinc concludendum omnes valores expr. $\sqrt[n]{A}$ inuenire non posse, nisi simul omnes valores expr. $\sqrt[n]{1}$ constant.

66. Secundum quod nobis proposueramus fuit, docere, in quo casu vnus expressionis $\sqrt[n]{A} \pmod{p}$ valor (vbi n supponitur esse diuisor ipsius $p-1$) directe inueniri possit. Hoc euenit quando aliquis valor potestati alicui ipsius A congruus euadit, qui casus quum haud raro occurrat, aliquantum huic rei immorari non superfluum erit. Sit talis valor, si quis datur z , siue $z \equiv A^k$ et $A \equiv z^n \pmod{p}$. Hinc colligitur $A \equiv A^{kn}$; quare si numerus k habetur, ita vt sit $A \equiv A^{kn}$, A^k erit valor quaesitus. At huic conditioni aequiualeat ista, vt sit $1 \equiv kn \pmod{t}$,

designante t exponentem ad quem pertinet A (art. 46, 48). Vt vero haec congruentia possibilis sit, requiritur, vt sit n ad t primus. Hoc in casu erit $k \equiv \frac{1}{n} \pmod{t}$; si vero t et n diuisorem communem habent, nullus valor x potestati ipsius A congruus esse potest.

67. Quum autem ad hanc solutionem ipsum t nouisse oporteat, videamus quomodo procedere possimus, si hunc numerum ignoremus. Primo facile intelligitur, t ipsum $\frac{p-1}{n}$ metiri debere, siquidem $\sqrt[p]{A} \pmod{p}$ valores reales habeat, vti hic semper supponimus. Sit enim quicumque valor y , eritque tum $y^{p-1} \equiv 1$, tum $y^n \equiv A \pmod{p}$; quare eleuando partes posterioris congruentiae ad potestatem $\frac{p-1}{n}$ tam, fiet $A^{\frac{p-1}{n}} \equiv 1$; adeoque $\frac{p-1}{n}$ per t diuisibilis (art. 48). Iam si $\frac{p-1}{n}$ ad n est primus, congruentia art. praec. $kn \equiv 1$ etiam secundum modulum $\frac{p-1}{n}$ solui poterit, manifestoque valor ipsius k congruentiae secundum modulum hunc satisfaciens eidem etiam secundum modulum t , qui ipsum $\frac{p-1}{n}$ metitur, satisfaciet, (art. 5). Tum igitur quod quaerebatur inuentum. Si vero $\frac{p-1}{n}$ ad n non est primus, omnes ipsius $\frac{p-1}{n}$ factores primi qui simul ipsum n metiuntur ex $\frac{p-1}{n}$ eiiciantur. Hinc nanciscemur numerum $\frac{p-1}{nq}$, ad n primum, designante q productum ex omnibus illis factoribus primis, quos eiecimus. Quodsi iam conditio ad quam in artic. praec. peruenimus vt t ad n sit primus locum habet, t etiam ad q erit primus adeoque etiam ipsum $\frac{p-1}{nq}$ metietur. Quare si congruen-